

Математический анализ-2

Лектор: проф. Подольский Владимир Евгеньевич

25 апреля 2025 г.



Конспект: Кирилл Яковлев, Егор Соколов, 108 группа

Telegram: [@fourkenz](https://www.t.me/fourkenz)

GitHub: [yakovlevki](https://github.com/yakovlevki)

Содержание

1	Неопределенный интеграл	4
1.1	Первообразная и неопределенный интеграл	4
1.2	Свойства неопределённого интеграла	4
1.3	Таблица неопределенных интегралов	5
1.4	Интегрирование рациональных функций	6
1.5	Метод Остроградского	8
2	Интеграл Римана	9
2.1	Интегрируемость по Риману	9
2.2	Суммы Дарбу. Критерий Дарбу интегрируемости по Риману . . .	10
2.3	Классы интегрируемых функций	13
2.4	Критерий Лебега интегрируемости по Риману	13
2.5	Свойства интеграла Римана	14
2.6	Первая теорема о среднем	18
2.7	Интеграл с переменным верхним пределом	18
2.8	Формула Ньютона-Лейбница	20
2.9	Замена переменной и интегрирование по частям	20
3	Спрямоаемые кривые и квадратуемые фигуры	22
3.1	Кривая в \mathbb{R}^n	22
3.2	Спрямоаемость гладкой кривой и формула ее длины	23
3.3	Квадратуемые фигуры	25
3.4	Первый и второй критерии квадратуемости	26
3.5	Квадратуемость простой спрямоаемой кривой и криволинейной трапеции	29
4	Интеграл Римана-Стилтьеса	30
4.1	Функции ограниченной вариации	30
4.2	Свойства функций ограниченной вариации	30
4.3	Липшицевы функции	32
4.4	Определение интеграла Римана-Стилтьеса	33
4.5	Свойства интеграла Римана-Стилтьеса	33
4.6	Существование интеграла Римана-Стилтьеса	36
4.7	Связь интеграла Римана и интеграла Римана-Стилтьеса	37
4.8	Теоремы о среднем	37

5	Несобственный интеграл	39
5.1	Определение несобственного интеграла	39
5.2	Критерий Коши сходимости несобственного интеграла	39
5.3	Свойства несобственного интеграла	40
5.4	Признаки сходимости несобственных интегралов	43
5.5	Главное значение интеграла в смысле Коши	45
6	Функции нескольких переменных	47
6.1	Основные определения	47
6.2	Секвенциальная компактность	49
6.3	Функции нескольких переменных и их предел	51
6.4	Непрерывные функции нескольких переменных	52
6.5	Дифференциальное исчисление функций многих переменных . . .	54

1 Неопределенный интеграл

1.1 Первообразная и неопределенный интеграл

Определение. Пусть $f(x)$ определена на (a, b) . Если существует $F(x)$ определённая на (a, b) такая, что $F(x) \in \mathcal{D}(a, b)$ и $F'(x) = f(x)$, то $F(x)$ называется первообразной функцией для $f(x)$.

Определение. Пусть $f(x)$ определена на (a, b) . Совокупность всех первообразных функций для $f(x)$ называется неопределённым интегралом $f(x)$ и обозначается

$$\int f(x)dx$$

Теорема. Пусть $F(x)$ является первообразной для $f(x)$ на (a, b) . Тогда

$$\int f(x)dx = \{F(x) + C\}, \quad C = \text{const}, \quad C \in \mathbb{R}$$

Доказательство.

$$(F(x) + C)' = f(x) + 0 = f(x)$$

Пусть $\varphi(x)$ - первообразная $f(x)$. Тогда:

$$(\varphi(x) - F(x))' = f(x) - f(x) = 0$$

т.е. по следствию из теоремы Лагранжа $\varphi(x) - F(x) = \text{const}$, ч.т.д. □

1.2 Свойства неопределённого интеграла

1. $\forall c \in \mathbb{R}$:

$$\int c \cdot f(x)dx = c \cdot \int f(x)dx$$

(При $c = 0$ множества получаются разными: первое - произвольная константа, а второе - ноль; в рассуждениях этот случай будет опускаться)

2.

$$\int (f(x) \pm g(x))dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$$

3. (Замена переменной)

Пусть $F(x)$ - первообразная для $f(x)$ на (a, b) .

Пусть $\varphi(t) \in \mathcal{D}(\alpha, \beta)$ и $\varphi((\alpha, \beta)) \subset (a, b)$ Тогда $F(\varphi(t))$ является первообразной для $F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$ на (α, β) .

$$\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt, \text{ где } x = \varphi(t)$$

4. (Интегрирование по частям) Пусть $u, v \in \mathcal{D}(a, b)$.

$$(u \cdot v)' = u \cdot v' + u' \cdot v$$

$$\int (uv)' dx = \int uv' dx + \int u' v dx$$

$$\int uv' dx = uv - \int u' v dx$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Замечание. Неопределённый интеграл - операция на дифференциалах:

$$\int dF(x) = F(x) + C$$

1.3 Таблица неопределённых интегралов

$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \alpha \neq -1$	$\int \frac{dx}{x} = \ln x + \begin{cases} C_1, & x > 0 \\ C_2, & x < 0 \end{cases}$
$\int \sin x dx = -\cos x + C$	$\int \cos x dx = \sin x + C$
$\int e^x dx = e^x + C$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$
$\int -\frac{1}{\sin^2 x} dx = \operatorname{ctg} x + C$	$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$	$\int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C$

$$\int \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + C$$

Замечание. Все равенства верны только на промежутках.

1.4 Интегрирование рациональных функций

Хотим научиться находить интеграл

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$$

где $P(x)$, $Q(x)$ - многочлены. Разложим $Q(x)$ на неприводимые многочлены:

$$Q(x) = (x - a_1)^{\alpha_1} \dots (x - a_n)^{\alpha_n} (x^2 + p_1x + q_1)^{\beta_1} \dots (x^2 + p_kx + q_k)^{\beta_k}$$

Теперь разложим дробь в сумму простейших:

$$\begin{aligned} \int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = & \int \left(\tilde{P} + \sum_{i=1}^{\alpha_1} \frac{\aleph_{1i}}{(x - a_1)^{\alpha_{1i}}} + \dots + \sum_{i=1}^{\alpha_n} \frac{\aleph_{ni}}{(x - a_n)^{\alpha_{ni}}} + \right. \\ & \left. + \sum_{j=1}^{\beta_1} \frac{\rho_{1j}x + \omega_{1j}}{(x^2 + p_1x + q_1)^{\beta_{1j}}} + \dots + \sum_{j=1}^{\beta_k} \frac{\rho_{kj}x + \omega_{kj}}{(x^2 + p_kx + q_k)^{\beta_{kj}}} \right) dx \end{aligned}$$

Осталось понять как интегрировать слагаемые вида

$$\int \frac{dx}{(x - a)^n} \quad \text{и} \quad \int \frac{\alpha x + \beta}{(x^2 + px + q)^k} dx$$

1.

$$\int \frac{dx}{(x - a)^n} = \begin{cases} \ln |x - a|, & n = 1 \\ \frac{(x - a)^{1-n}}{1 - n}, & n > 1 \end{cases}$$

2. Сначала преобразуем знаменатель:

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(q - \frac{p^2}{4}\right)$$

причем $q - \frac{p^2}{4} > 0$, поскольку у $x^2 + px + q$ нет вещественных корней.

Сделаем замену

$$t = x + \frac{p}{2} \Rightarrow x = t - \frac{p}{2}, \quad q_1^2 = q - \frac{p^2}{4}$$

$$\int \frac{\alpha x + \beta}{(x^2 + px + q)^k} dx = \int \frac{\alpha t - \frac{\alpha p}{2} + \beta}{(t^2 + q_1^2)^k} d(t - \frac{p}{2}) = \int \frac{\alpha_1 t + \beta_1}{(t^2 + q_1^2)^k} dt$$

где $\alpha_1 = \alpha$, $\beta_1 = \beta - \frac{\alpha p}{2}$. Далее осталось рассмотреть два интеграла:

$$\int \frac{t}{(t^2 + q_1^2)^k} dt \quad \text{и} \quad I_k = \int \frac{dt}{(t^2 + q_1^2)^k}$$

(i)

$$\begin{aligned} \int \frac{t}{(t^2 + q_1^2)^k} dt &= \frac{1}{2} \int \frac{dt^2}{(t^2 + q_1^2)^k} = \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d(t^2 + q_1^2)}{(t^2 + q_1^2)^k} = \begin{cases} \frac{1}{2} \ln(t^2 + q_1^2), & k = 1 \\ \frac{(t^2 + q_1^2)^{1-k}}{2(1-k)}, & k > 1 \end{cases} \end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned} I_k &= \int \frac{dt}{(t^2 + q^2)^k} = \frac{t}{(t^2 + q^2)^k} - \int t d\left(\frac{1}{t^2 + q^2}\right)^k = \\ &= \frac{t}{(t^2 + q^2)^k} + 2k \int \left(\frac{t^2 + q^2 - q^2}{(t^2 + q^2)^{k+1}}\right) dt = \\ &= \frac{t}{(t^2 + q^2)^k} + 2k I_k - 2k q^2 I_{k+1} \end{aligned}$$

$$I_{k+1} = \frac{1}{2k q^2} \cdot \frac{t}{(t^2 + q^2)^k} + \frac{2k-1}{2k q^2} I_k$$

Замечание.

$$\operatorname{tg}^2 z + 1 = \frac{\sin^2 z + \cos^2 z}{\cos^2 z} = \frac{1}{\cos^2 z}$$

$$\int \frac{dt}{(t^2 + q^2)^k} = \left| \begin{array}{l} t = q \operatorname{tg} z \\ dt = \frac{q}{\cos^2 z} dz \end{array} \right| = \int \frac{q dz}{\cos^2 z (q^2 \operatorname{tg}^2 z + q^2)^k} = \int \frac{\cos^{2k-2} z}{q^{2k-1}} dz$$

1.5 Метод Остроградского

$$\begin{aligned}
 \int \frac{P(x)}{Q(x)} dx &= \int \frac{P(x)}{\prod_{i=1}^n (x - a_i)^{\alpha_i} \cdot \prod_{j=1}^k (x^2 + b_j x + c_j)^{\beta_j}} dx = \\
 &= \frac{P_1(x)}{\prod_{i=1}^n (x - a_i)^{\alpha_i - 1} \cdot \prod_{j=1}^k (x^2 + b_j x + c_j)^{\beta_j - 1}} + \\
 &\quad + \int \frac{P_2(x)}{\prod_{i=1}^n (x - a_i) \cdot \prod_{j=1}^k (x^2 + b_j x + c_j)} dx
 \end{aligned}$$

2 Интеграл Римана

2.1 Интегрируемость по Риману

Определение. $\{x_i\}_{i=0}^n \subset [a, b]$ называется разбиением отрезка, если $a = x_0 < \dots < x_n = b$. Обозначается $T_{[a,b]}^+$. Если $b = x_0 > \dots > x_n = a$, то обозначают $T_{[a,b]}^-$.

Отрезки $[x_{i-1}, x_i]$ или $[x_i, x_{i-1}]$ называются отрезками разбиения, их обычно обозначают Δ_i .

Длина отрезка Δ_i обозначается $\Delta x_i := x_i - x_{i-1}$.

Длина наибольшего из отрезков называется диаметром разбиения

$$d(T) = \max |x_i - x_{i-1}| = \max \Delta x_i.$$

Определение. Пусть $T_{[a,b]}$ - разбиение отрезка $[a, b]$. Разметкой для $T_{[a,b]}$ называется множество точек $\{\xi_i\}_{i=1}^n$ такое, что $\forall i : \xi_i \in \Delta_i$.

Если $\{\xi_i\}_{i=1}^n$ является разметкой для $\{x_i\}_{i=0}^n$, то пара $(\{x_i\}_{i=0}^n, \{\xi_i\}_{i=1}^n)$ называется размеченным разбиением и обозначается $T(\xi)$.

Определение. Сумма

$$\sigma_{[a,b]} = \sum_{i=1}^N f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

называется интегральной суммой. Иногда ее обозначают $\sigma_T(\xi)$ или $\sigma(T_{[a,b]}(\xi))$

Определение. Пусть $f(x)$ определена на $[a, b]$. Рассмотрим $T_{[a,b]}(\xi)$. Если

$$\exists I \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall T(\xi) \subset \{T : d(T) < \delta\} : \left| \sum_{i=1}^N f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) - I \right| < \varepsilon$$

то говорят, что $f(x)$ интегрируема по Риману на $[a, b]$, а число I называют интегралом Римана на размеченных разбиениях на отрезке $[a, b]$. Интеграл Римана обозначают

$$I = \int_a^b f(x) dx \quad \text{или} \quad I = \int_b^a f(x) dx$$

для T^+ и T^- соответственно.

Замечание. Можно считать определение интеграла определением предела интегральных сумм и писать

$$\lim_{d \rightarrow 0} \left(\sum_{i=1}^N f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) \right) = I$$

где d - диаметр разбиения.

Утверждение.

$$\text{Если } \exists \int_a^b f(x) dx, \text{ то } \exists \int_b^a f(x) dx \text{ и } \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

Определение. Класс функций, интегрируемых на $[a, b]$ по Риману, обозначается $\mathcal{R}[a, b]$.

Теорема. Если $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$, то $f(x)$ - ограничена на $[a, b]$.

Доказательство. Предположим, что $\exists \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset [a, b]$, $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \tilde{x}$, что $|f(x_n)| > n$ и пусть

$$\exists \lim_{d \rightarrow 0} \left(\sum_{i=0}^N f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) \right) = I$$

Возьмем $\varepsilon = 1$. Тогда

$$\left| \sum_{i=0}^N f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) - I \right| < 1$$

Возмем Δ_k такой, что $\tilde{x} \in \Delta_k \Rightarrow f(x)$ - неограничена на Δ_k . Тогда, зафиксировав точки в остальных отрезках разбиения, получим

$$I - \sum_{i=1, i \neq k}^N f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) - 1 < f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) < I - \sum_{i=1, i \neq k}^N f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) + 1$$

противоречие с тем, что $f(x)$ принимает сколь угодно большие на Δ_k . \square

2.2 Суммы Дарбу. Критерий Дарбу интегрируемости по Риману

Далее рассматриваем разбиения T^+

Определение. Пусть T_1 и T_2 - разбиения отрезка $[a, b]$ такие, что $T_1 \subset T_2$. Тогда T_2 называется измельчением T_1 .

Определение. Пусть $f(x)$ ограничена на $[a, b]$, $\{x_i\}_{i=0}^n = T$ - разбиение $[a, b]$

$$m_i = \inf_{[x_i, x_{i+1}]} f(x), \quad M_i = \sup_{[x_i, x_{i+1}]} f(x)$$

$$\bar{S}_f(T) = \sum_{i=0}^{n-1} m_i(x_{i+1} - x_i), \quad \underline{S}_f(T) = \sum_{i=0}^{n-1} M_i(x_{i+1} - x_i)$$

Тогда $\bar{S}_f(T)$ называется нижней суммой Дарбу, а $\underline{S}_f(T)$ верхней суммой Дарбу.

Лемма 1. Пусть T_1 - измельчение T . Тогда

$$\overline{\overline{S}}(T) \leq \overline{\overline{S}}(T_1) \quad \text{и} \quad \underline{\underline{S}}(T) \geq \underline{\underline{S}}(T_1)$$

Доказательство. Докажем для нижней суммы. Рассмотрим случай, когда $T_1 = T \cup \{x'_j\}$, $x'_j \in [x_j, x_{j+1}]$. Тогда сократятся все отрезки кроме $[x_j, x_{j+1}]$:

$$\begin{aligned} \overline{\overline{S}}(T_1) - \overline{\overline{S}}(T) &= m_{1j}(x'_j - x_j) + m_{2j}(x_{j+1} - x'_j) - m_j(x_{j+1} - x_j) = \\ &= m_{1j}(x'_j - x_j) + m_{2j}(x_{j+1} - x'_j) - m_j(x'_j - x_j) - m_j(x_{j+1} - x'_j) \geq 0 \end{aligned}$$

значит, по индукции, это верно для любого измельчения. \square

Лемма 2.

$$\forall T_1, T_2 : \overline{\overline{S}}(T_1) \leq \underline{\underline{S}}(T_2)$$

Доказательство. Рассмотрим объединение любых двух разбиений T_1 и T_2 : $T = T_1 \cup T_2$. Тогда T является измельчением и T_1 и T_2 . Тогда по лемме 1 получаем:

$$\overline{\overline{S}}(T_1) \leq \overline{\overline{S}}(T) \quad \text{и} \quad \underline{\underline{S}}(T) \leq \underline{\underline{S}}(T_2) \Rightarrow \overline{\overline{S}}(T_1) \leq \underline{\underline{S}}(T_2)$$

\square

Лемма 3. $\forall T_{[a,b]} :$

$$\begin{aligned} \overline{\overline{S}}(T) &= \inf_{\{\xi_i\}} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) \\ \underline{\underline{S}}(T) &= \sup_{\{\xi_i\}} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) \end{aligned}$$

Доказательство. Докажем для верхней суммы, для нижней аналогично.

Докажем более общее утверждение - рассмотрим некоторое семейство множеств $\{X_i : X_i \subset \mathbb{R}\}_{i=1}^n$ и множество $\{a_i\}_{i=1}^n$ такие, что $\forall i$ X_i ограничено и $a_i \geq 0$.

Каждое X_i из принципа полноты Вейерштрасса имеет супремум, и при этом

$$\forall \varepsilon > 0, \forall i = \{1, \dots, n\} \exists x_i \in X_i : x_i > \sup X_i - \varepsilon$$

Домножив каждое из неравенств на число (i -е нер-во на a_i) и сложив, получим

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i > \sum_{i=1}^n a_i \sup X_i - \varepsilon \cdot \sum_{i=1}^n a_i$$

Отсюда в силу свойства супремума

$$\sup_{\{x_i\}} \sum_{i=1}^n a_i x_i \geq \sum_{i=1}^n a_i \sup X_i$$

но при этом

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i \leq \sum_{i=1}^n a_i \sup X_i$$

Значит,

$$\sup_{\{x_i\}} \sum_{i=1}^n a_i x_i = \sum_{i=1}^n a_i \sup X_i$$

При $X_i = f([x_{i-1}, x_i])$ (ограничены в силу интегрируемости f) и $a_i = x_i - x_{i-1}$ получим

$$\sup_{\{\xi_i\}} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n \sup_{\{\xi_i\}} f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) = \underline{\underline{S}}(T)$$

□

Теорема. (Критерий Дарбу интегрируемости по Риману)

$f(x) \in \mathcal{R}[a, b] \Leftrightarrow f$ - ограничена и

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0, \forall T_{[a,b]} : d(T) < \delta_\varepsilon : \underline{\underline{S}}_f(T) - \overline{\overline{S}}_f(T) < \varepsilon$$

Доказательство.

(\Rightarrow) :

$$\exists I = \int_a^b f(x) dx \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0, \forall T(\xi) : d(T) < \delta_\varepsilon :$$

$$I - \frac{\varepsilon}{3} < \sigma_f(T(\xi)) < I + \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\left| \overline{\overline{S}}_f(T) - I \right| \leq \frac{\varepsilon}{3}, \quad \left| \underline{\underline{S}}_f(T) - I \right| \leq \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{S}}(T) - \overline{\overline{S}}(T) < \varepsilon.$$

(\Leftarrow) :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0, \forall T : d(T) < \delta_\varepsilon : \underline{\underline{S}}(T) - \overline{\overline{S}}(T) < \varepsilon \quad (1)$$

из леммы 2 по аксиоме полноты:

$$\exists I \in \mathbb{R}, \forall T : \overline{\overline{S}}(T) \leq I \leq \underline{\underline{S}}(T) \quad (2)$$

из (1) следует, что I - единственно, а также известно, что

$$\forall T(\xi) : \overline{\overline{S}}(T) \leq \sigma_f(T(\xi)) \leq \underline{\underline{S}}(T) \quad (3)$$

значит из (2) и (3) получаем:

$$\left| \sigma_f(T(\xi)) - I \right| < \varepsilon$$

□

2.3 Классы интегрируемых функций

Теорема. Если $f(x) \in \mathcal{C}[a, b]$, то $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$

Доказательство. $f(x) \in \mathcal{C}[a, b] \Rightarrow f(x)$ - равномерно непрерывна на $[a, b]$, т.е

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0, \forall x_1, x_2 \in [a, b] : |x_1 - x_2| < \delta_\varepsilon : |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

Пусть $T : d(T) < \delta$. Тогда:

$$\begin{aligned} \underline{S}(T) - \overline{S}(T) &= \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) = \\ &= \sum_{i=1}^n (f(x_{i_{\max}}) - f(x_{i_{\min}}))(x_i - x_{i-1}) < \varepsilon(b - a) \end{aligned}$$

($x_{i_{\min}}$ и $x_{i_{\max}}$ существуют по второй теореме Вейерштрасса) □

Теорема. Пусть $f(x)$ - монотонна на $[a, b]$. Тогда $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$

Доказательство. Докажем для неубывающей. Если $f(x) = \text{const}$, то очевидно.

Пусть $d(T) < \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)}$

$$\begin{aligned} \underline{S}(T) - \overline{S}(T) &= \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1}))(x_i - x_{i-1}) < \\ &< \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \cdot \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)} = \\ &= \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)} \cdot (f(b) - f(a)) = \varepsilon \end{aligned}$$

Поскольку $f(x)$ неубывает на $[a, b]$, то минимум на этом отрезке достигается в $f(a)$, а максимум в $f(b)$. Значит, при выносе $\frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)}$ за скобку, сумма слагаемых вида $f(x_i) - f(x_{i-1})$ схлопнется в $f(b) - f(a)$. □

2.4 Критерий Лебега интегрируемости по Риману

Определение. Пусть $A \subset \mathbb{R}$, и если $\forall \varepsilon > 0 \exists \{(a_i, b_i)\}_{i=1}^\infty$ (или конечное) таких, что

$$A \subset \bigcup_i (a_i, b_i), \sup_n \sum_{i=1}^N |b_i - a_i| < \varepsilon$$

Тогда A называется множеством меры 0 по Лебегу. Обозначается $\mu(A) = 0$.

Теорема. (Свойства множеств с мерой 0 по Лебегу)

1. $B \subset A, \mu(A) = 0 \Rightarrow \mu(B) = 0$
2. $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}, \mu(A_i) = 0 \Rightarrow \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = 0$

Доказательство.

1. Очевидно
2. $\forall i \exists \{(a_{i_l}, b_{i_l})\}_{l=1}^{\infty} :$

$$A_i \subset \bigcup_{l=1}^{\infty} (a_{i_l}, b_{i_l}), \sum_{l=1}^{\infty} |b_{i_l} - a_{i_l}| < \frac{\varepsilon}{2^i}$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} \left(\bigcup_{l=1}^{\infty} (a_{i_l}, b_{i_l}) \right), \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{l=1}^{\infty} |b_{i_l} - a_{i_l}| \right) < \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^i} = \varepsilon$$

□

Теорема. (Критерий Лебега интегрируемости по Риману)

$f(x) \in \mathcal{R}[a, b] \Leftrightarrow f(x)$ ограничена и для множества P точек разрыва функции $f(x)$ выполнено $\mu(P) = 0$.

Доказательство. Без доказательства.

□

2.5 Свойства интеграла Римана

Теорема 1. (Интегрируемость на подотрезках)

Если $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$, $[c, d] \subset [a, b]$, то $f(x) \in \mathcal{R}[c, d]$.

Доказательство. Так как $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$, то $\forall T_{[a,b]}(\xi) : \sigma_f(T_{[a,b]}(\xi)) \rightarrow I$. Значит если $\{c, d\} \in T_{[a,b]}$, то $\sigma_f(T_{[a,b] \cup \{c,d\}}(\xi)) :$

$$\varepsilon > \underline{S}_{[a,b] \cup \{c,d\}} - \overline{S}_{[a,b] \cup \{c,d\}} = \sum_{k=1}^i (M_k - m_k)(x_k - x_{k-1}) + \sum_{k=i+1}^j (M_k - m_k)(x_k - x_{k-1}) +$$

$$+ \sum_{k=j+1}^N (M_k - m_k)(x_k - x_{k-1}) \geq \sum_{k=i+1}^j (M_k - m_k)(x_k - x_{k-1}) = \underline{S}_{[c,d]} - \overline{S}_{[c,d]}$$

□

Теорема 2. (Аддитивность)

Если $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$, $c \in [a, b]$, то

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Доказательство. Пусть $c \in T_{[a,b]}(\xi)$. Тогда

$$\sigma_f(T_{[a,b]}) = \sigma_f(T_{[a,c]}) + \sigma_f(T_{[c,b]})$$

$$\sigma_f(T_{[a,c]}) \rightarrow \int_a^c f(x) dx, \quad \sigma_f(T_{[c,b]}) \rightarrow \int_c^b f(x) dx$$

а также

$$\sigma_f(T_{[a,b]}) \rightarrow \int_a^b f(x) dx$$

Теперь пусть $c \notin T_{[a,b]}$. Рассмотрим $T'_{[a,b] \cup c} = T_{[a,b]} \cup \{c\}$

$$\sigma_f(T_{[a,b]}) - \sigma_f(T'_{[a,b] \cup c}) = f(\xi_j)(x_j - x_{j-1}) - f(\xi'_j)(c - x_{j-1}) - f(\xi''_j)(x_j - c) \rightarrow 0$$

□

Замечание. Если $f(x) \in \mathcal{R}[a, c]$, $b < c$, то

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Теорема 3. (Линейность)

Пусть $f(x), g(x) \in \mathcal{R}[a, b]$. Тогда $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \alpha f(x) + \beta g(x) \in \mathcal{R}[a, b]$

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \cdot \int_a^b f(x) dx + \beta \cdot \int_a^b g(x) dx$$

Доказательство.

$$\sigma_{\alpha f(x) + \beta g(x)}(T) = \alpha \sigma_f(T) + \beta \sigma_g(T)$$

□

Теорема 4. Пусть $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$, $f(x) \geq 0$. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

Доказательство.

$$f(x) \geq 0 \Rightarrow \sigma_f(T) \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

□

Следствие. Если $f(x), g(x) \in \mathcal{R}[a, b]$ и $f(x) \geq g(x)$ на $[a, b]$, то

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

Теорема 5. Пусть $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$, $f(x) \geq 0$, $\exists c \in [a, b]$, что $f(x)$ непрерывна в точке c и $f(c) > 0$. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx > 0$$

Доказательство. По теореме об отделимости

$\exists \delta > 0 : f(x) > \frac{f(c)}{2}$ в $(c - \delta, c + \delta)$:

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_{c-\delta}^{c+\delta} f(x) dx > \int_{c-\delta}^{c+\delta} \frac{f(c)}{2} dx = \frac{f(c)}{2} \cdot 2\delta = \delta f(c) > 0$$

□

Теорема 6. $f(x), g(x) \in \mathcal{R}[a, b]$. Тогда $f(x) \cdot g(x) \in \mathcal{R}[a, b]$

Доказательство. Пусть

$$M_1 = \sup_{[a,b]} |f(x)|, \quad M_2 = \sup_{[a,b]} |g(x)|$$

Ограничим значение $\underline{\underline{S}}_{f \cdot g} - \overline{\overline{S}}_{f \cdot g}$, ограничив разность точных граней на одном отрезке разбиения: (далее супремум рассматривается по всем $x', x'' \in [x_i, x_{i-1}]$)

$$\begin{aligned} M_i(f(x)g(x)) - m_i(f(x)g(x)) &= \sup(f(x')g(x') - f(x'')g(x'')) = \\ &= \sup(f(x')g(x') - f(x')g(x'') + f(x')g(x'') - f(x'')g(x'')) = \\ &= \sup(f(x')(g(x') - g(x'')) + g(x'')(f(x') - f(x''))) \leq \\ &\leq \sup |f(x)| \cdot \sup(g(x') - g(x'')) + \sup |g(x)| \cdot \sup(f(x') - f(x'')) \leq \\ &\leq M_1(M_{ig} - m_{ig}) + M_2(M_{if} - m_{if}) \end{aligned}$$

Отсюда, домножив неравенства на длины соответствующих отрезков и сложив, получим

$$\underline{\underline{S}}_{f \cdot g} - \overline{\overline{S}}_{f \cdot g} \leq M_1(\underline{\underline{S}}_g - \overline{\overline{S}}_g) + M_2(\underline{\underline{S}}_f - \overline{\overline{S}}_f)$$

Отсюда из интегрируемости f и g и критерия Дарбу $f(x)g(x) \in \mathcal{R}[a, b]$. □

Теорема 7. $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$ и $f(x) \geq \delta > 0$. Тогда $\frac{1}{f(x)} \in \mathcal{R}[a, b]$

Доказательство. $\forall x', x'' \in [a, b]$:

$$\left| \frac{1}{f(x')} - \frac{1}{f(x'')} \right| = \left| \frac{f(x'') - f(x')}{f(x')f(x'')} \right| \leq \frac{1}{\delta^2} \cdot |f(x'') - f(x')|$$

Дальнейшее доказательство аналогично предыдущему (на всякий случай приведём аналогичную выкладку, необходимую для доказательства)

$$\begin{aligned} M_i\left(\frac{1}{f(x)}\right) - m_i\left(\frac{1}{f(x)}\right) &= \sup\left(\frac{1}{f(x')} - \frac{1}{f(x'')}\right) \leq \\ &\leq \frac{1}{\delta^2} \sup |f(x'') - f(x')| = \frac{1}{\delta^2} (M_{if} - m_{if}) \end{aligned}$$

□

Следствие. Из пунктов 6 и 7 следует интегрируемость дроби $\frac{f(x)}{g(x)}$.

Теорема 8. $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$. Тогда $|f(x)| \in \mathcal{R}[a, b]$

Доказательство. $\forall x', x'' \in [a, b]$:

$$||f(x')| - |f(x'')|| \leq |f(x') - f(x'')|$$

Далее совпадает с предыдущим доказательством.

□

Замечание. Обратное утверждение неверно:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \subset [0, 1] \\ -1, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

$\Rightarrow |f(x)| \equiv 1$ на отрезке $[0, 1]$.

Теорема 9. $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$. Тогда

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Доказательство.

$$|\sigma_f| \leq \sigma_{|f|}$$

□

Замечание.

$$\int_a^b |f(x)| dx \leq \sup_{[a, b]} |f(x)| \cdot \int_a^b 1 dx$$

2.6 Первая теорема о среднем

Теорема. (Первая теорема о среднем)

Пусть $f(x), g(x) \in \mathcal{R}[a, b]$, $g(x) \geq 0$, $M = \sup f(x)$, $m = \inf f(x)$. Тогда $\exists \mu \in [m, M]$:

$$\int_a^b f(x) \cdot g(x) \, dx = \mu \cdot \int_a^b g(x) \, dx$$

Доказательство.

$$m \cdot \sigma_g(T) \leq \sigma_{f \cdot g}(T) \leq M \cdot \sigma_g(T)$$

Тогда

$$m \cdot \int_a^b g(x) \, dx \leq \int_a^b f(x) \cdot g(x) \, dx \leq M \cdot \int_a^b g(x) \, dx$$

Рассмотрим случаи:

1.

$$\int_a^b g(x) \, dx = 0 \Rightarrow \int_a^b f(x) \cdot g(x) \, dx = 0$$

В этом случае равенство верно для любого μ .

2.

$$\int_a^b g(x) \, dx \neq 0 \Rightarrow m \leq \frac{\int_a^b f(x) \cdot g(x) \, dx}{\int_a^b g(x) \, dx} \leq M$$

Значит, подойдет μ , равное значению этой дроби

□

2.7 Интеграл с переменным верхним пределом

Определение. Интегралом с переменным верхним пределом называется интеграл вида:

$$\int_a^x f(t) \, dt$$

Теорема. Пусть $f(t) \in \mathcal{R}[a, b]$. Тогда функция

$$\varphi(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

непрерывна на $[a, b]$.

Доказательство. $\forall x_0 \in [a, b]$ и $\Delta x \rightarrow 0$:

$$|\varphi(x_0 + \Delta x) - \varphi(x_0)| = \left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(t) dt \right| \leq M_{f([a, b])} \cdot |\Delta x| \rightarrow 0$$

□

Теорема. Пусть $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$ и f непрерывна в $x_0 \in [a, b]$. Тогда функция

$$\varphi(x) = \int_a^x f(t) dt$$

имеет производную в x_0 и $\varphi'(x_0) = f(x_0)$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} & \left| \frac{\varphi(x_0 + \Delta x) - \varphi(x_0)}{\Delta x} - f(x_0) \right| = \\ &= \left| \frac{1}{\Delta x} \cdot \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(x) dx - \frac{f(x_0)}{\Delta x} \cdot \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} 1 dx \right| = \\ &= \left| \frac{1}{\Delta x} \cdot \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} (f(x) - f(x_0)) dx \right| \leq \sup_{[x_0, x_0 + \Delta x]} |f(x) - f(x_0)| \cdot 1 \rightarrow 0. \end{aligned}$$

□

Следствие. Пусть $f(x) \in \mathcal{C}(a, b)$. Тогда $\forall c \in (a, b)$:

$$\exists \left(\int_c^x f(t) dt \right)' = f(x), \text{ то есть } \int_c^x f(t) dt - \text{ первообразная } f(x)$$

Доказательство. Очевидно.

□

Замечание. Интервал в формулировке следствия взят для применимости теоремы к неограниченным на интервале функциям (например $\operatorname{tg}(x)$ на $[0, \pi]$), для которых тем не менее применима предыдущая теорема по аналогичным рассуждениям.

2.8 Формула Ньютона-Лейбница

Теорема. (Формула Ньютона-Лейбница)

Пусть $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$, $f(x) \in \mathcal{C}([a, b] \setminus \{x_i\}_{i=1}^n)$.

$$\exists F(x) : F(x) \in \mathcal{D}([a, b] \setminus \{x_i\}_{i=1}^n), F'(x) = f(x), F(x) \in \mathcal{C}[a, b]$$

Тогда:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Доказательство. Пусть сначала $f(x) \in \mathcal{C}(a, b)$, $F'(x) = f(x)$ на (a, b) . Но интеграл

$$\int_a^x f(t) dt$$

тоже первообразная $f(x)$ на $(a, b) \Rightarrow \exists C :$

$$F(x) + C = \int_a^x f(t) dt$$

$\Rightarrow F(a) + C = 0$. Тогда

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(t) dt$$

Общий случай:

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^{n-1} (F(x_{i+1}) - F(x_i)) = \sum_{i=1}^{n-1} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(t) dt = \int_a^b f(t) dt$$

□

2.9 Замена переменной и интегрирование по частям

Теорема. Пусть $f(x) \in \mathcal{C}(a, b)$, $\varphi(t) \in \mathcal{C}^1(\alpha, \beta)$, $\varphi((\alpha, \beta)) \subset (a, b)$.

$\forall \alpha_0, \beta_0 \in (\alpha, \beta)$ и $a_0 = \varphi(\alpha_0)$, $b_0 = \varphi(\beta_0)$. Тогда

$$\int_{a_0}^{b_0} f(x) dx = \int_{\alpha_0}^{\beta_0} f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt$$

Доказательство. $f \in \mathcal{C}(a, b) \Rightarrow \exists F'(x) = f(x)$

$$\int_{a_0}^{b_0} f(x) \, dx = F(b_0) - F(a_0)$$

Но $(F(\varphi(t)))' = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$, а значит

$$\int_{\alpha_0}^{\beta_0} f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) \, dt = F(\varphi(\beta_0)) - F(\varphi(\alpha_0))$$

□

Теорема. (Интегрирование по частям)

Пусть $f(x), g(x) \in \mathcal{C}^1[a, b]$

$$\int_a^b f(x) \cdot g'(x) \, dx = f(x) \cdot g(x)|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) \, dx$$

Доказательство.

$$f(x) \cdot g(x)|_a^b = \int_a^b (f(x) \cdot g(x))' \, dx = \int_a^b f'(x)g(x) \, dx + \int_a^b f(x) \cdot g'(x) \, dx$$

□

3 Спрямяемые кривые и квадратуемые фигуры

3.1 Кривая в \mathbb{R}^n

Определение. Кривой в \mathbb{R}^n называется непрерывное отображение:

$$\bar{\gamma} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$$

Замечание.

$$\bar{\gamma} = \begin{pmatrix} \gamma_1(t) \\ \vdots \\ \gamma_n(t) \end{pmatrix}$$

Определение. Рассмотрим $\bar{\gamma} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Если $\exists t_1 \neq t_2 : \bar{\gamma}(t_1) = \bar{\gamma}(t_2)$, то $\bar{\gamma}(t_1)$ называется точкой самопересечения. Мощность подмножества $[a, b]$, точки которого переходят в $\bar{\gamma}(t_1)$ называется кратностью точки самопересечения. Если кривая не имеет точек самопересечения, то она называется простой.

Определение. Если $\bar{\gamma}(t)$ имеет единственную точку самопересечения $\bar{\gamma}(a) = \bar{\gamma}(b)$, то кривая называется простой замкнутой.

Определение. Множество точек $\{\bar{\gamma}(t_i)\}_{i=0}^N$ называется разбиением кривой, если $\{t_i\}_{i=0}^N$ является разбиением отрезка $[a, b]$. Обозначается $T_{\bar{\gamma}}$.

Определение. $L(T_{\bar{\gamma}})$ - множество отрезков $\{[\bar{\gamma}(t_{i-1}), \bar{\gamma}(t_i)]\}_{i=1}^N$ называется вписанной в $\bar{\gamma}(t)$ ломаной, а число $|L(T_{\bar{\gamma}})|$ - длиной ломаной.

Утверждение. Если $T'_{\bar{\gamma}}$ - измельчение $T_{\bar{\gamma}}$, то

$$|L(T_{\bar{\gamma}})| \leq |L(T'_{\bar{\gamma}})|$$

Доказательство. Очевидно. □

Определение. Если множество $\{|L(T_{\bar{\gamma}})|\}_{T_{\bar{\gamma}}}$ ограничено, то кривая $\bar{\gamma}(t)$ называется спрямяемой, а

$$\sup_{T_{\bar{\gamma}}} |L(T_{\bar{\gamma}})| = |\bar{\gamma}|$$

называется длиной кривой.

3.2 Спрямоимость гладкой кривой и формула ее длины

Теорема. Пусть

$$\bar{\gamma}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix} \in C^1[a, b]$$

Тогда $\bar{\gamma}(t)$ прямоима и

$$|\bar{\gamma}| = \int_a^b \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j'^2(t)} dt$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} |L(T_{\bar{\gamma}})| &= \sum_{i=1}^N \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_j(t_i) - x_j(t_{i-1}))^2} = (1) \\ &= \sum_{i=1}^N \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j'^2(\xi_{ij}) \cdot (t_i - t_{i-1})^2} = \\ &= \sum_{i=1}^N \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j'^2(\xi_{ij})} (t_i - t_{i-1}) \leq M \cdot \sqrt{n} \cdot (b - a) \end{aligned}$$

Переход (1) по формуле Лагранжа, а последняя оценка устроена так: каждое из x_j' - непрерывно на каждом отрезке разбиения, значит, по второй теореме Вейерштрасса, у нее есть максимум. Возьмем M - максимум из этих максимальных значений на отрезке разбиения, тогда

$$\sqrt{\sum_{j=1}^n x_j'^2} \leq M \cdot \sqrt{n}$$

остается вынести это за скобку и сумма длин отрезков разбиения схлопнется в $b - a$. $\Rightarrow \bar{\gamma}$ прямоима.

$$\begin{aligned}
& \left| |L(T_{\bar{\gamma}})| - \sigma \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j'^2} \right| = \\
& = \left| \sum_{i=1}^N \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j'^2(\xi_{ij})(t_i - t_{i-1})} - \sum_{i=1}^N \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j'^2(\nu_i)(t_i - t_{i-1})} \right| = \\
& = \left| \sum_{i=1}^N \left(\left(\sqrt{\sum_{j=1}^n x_j'^2(\xi_{ij})} - \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j'^2(\nu_i)} \right) (t_i - t_{i-1}) \right) \right| \leq \\
& \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^n |x_j'(\xi_{ij}) - x_j'(\nu_i)| \cdot (t_i - t_{i-1}) < \varepsilon \cdot n \cdot (b - a)
\end{aligned}$$

Последняя оценка сделана с применением леммы, которая доказана чуть ниже.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0, \quad d(T) < \delta_\varepsilon$$

$$\Rightarrow \left| |L(T_{\bar{\gamma}})| - \int_a^b \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j'^2(t)} dt \right| < 2\varepsilon n(b - a)$$

$\forall \varepsilon > 0 \exists L(T_{\bar{\gamma}}^*)$, что $|L(T_{\bar{\gamma}}^*)| > |\bar{\gamma}| - \varepsilon$ (свойство точной верхней грани).

Измельчаем $T_{\bar{\gamma}}^*$ до тех пор, пока $d(T_{\bar{\gamma}}^*) < \delta_\varepsilon$. □

Лемма.

$$\left| \sqrt{\sum_{i=1}^k a_i^2} - \sqrt{\sum_{i=1}^k b_i^2} \right| \leq \sum_{i=1}^k |a_i - b_i|$$

Доказательство.

$$\begin{aligned}
\left| \sqrt{\sum_{i=1}^k a_i^2} - \sqrt{\sum_{i=1}^k b_i^2} \right| &= \left| \frac{\sum_{i=1}^k ((a_i - b_i)(a_i + b_i))}{\sqrt{\sum_{i=1}^k a_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^k b_i^2}} \right| = \\
&= \left| \sum_{i=1}^k \left((a_i - b_i) \cdot \frac{(a_i + b_i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^k a_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^k b_i^2}} \right) \right| \leq (*) \\
&\leq \left| \sum_{i=1}^k 1 \cdot (a_i - b_i) \right| \leq \sum_{i=1}^k |a_i - b_i|
\end{aligned}$$

$$(*) : \quad a_i \leq \sqrt{\sum_{i=1}^k a_i^2}, \quad b_i \leq \sqrt{\sum_{i=1}^k b_i^2} \Rightarrow \frac{(a_i + b_i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^k a_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^k b_i^2}} \leq 1$$

□

3.3 Квадрируемые фигуры

Далее работаем в \mathbb{R}^2 .

Определение. Множество $\{(x, y) : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \varepsilon^2\} \subset \mathbb{R}^2$ называется ε -окрестностью точки (x_0, y_0) .

Определение. Множество $A \in \mathbb{R}^2$ называется ограниченным, если $\exists R > 0 : A \subset \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2\}$.

Определение. Ограниченное множество $A \subset \mathbb{R}^2$ называется фигурой.

Определение. Пусть $A = \{A_\alpha\}_\alpha$. Функция $\mu : A \rightarrow \mathbb{R}$ называется площадью, если

1. $\mu(A) \geq 0$
2. Если $\exists \mu(A_1), \mu(A_2)$ и $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, то $\exists \mu(A_1 \cup A_2) = \mu(A_1) + \mu(A_2)$.
3. Если $\exists \mu(A_1)$ и A_2 конгруэнтна A_1 , то $\exists \mu(A_2) = \mu(A_1)$.
4. Если $\exists \mu(A_1), \mu(A_2)$ и $A_1 \subset A_2$, то $\mu(A_1) \leq \mu(A_2)$.
5. Площадь прямоугольника со сторонами a и b равна ab .

Замечание. Существует площадь отрезка и площадь точки, и они равны нулю. По определению считаем, что $\mu(\emptyset) = 0$

Утверждение. Существует площадь треугольника, равная половине произведения основания на высоту.

Доказательство. Рассмотрим произвольный треугольник. Проведем в нем высоту, тогда он разобьется на два прямоугольных треугольника, которые можно достроить до прямоугольников. Тогда площадь искомого треугольника равна сумме половин площадей построенных прямоугольников. □

Определение. Фигура, полученная конечным объединением непересекающихся треугольников, называется многоугольником.

Теорема. Площадь многоугольной фигуры не зависит от разбиения на треугольники.

Доказательство. Без доказательства. □

Определение. Для любой фигуры A , замкнутая многоугольная фигура $P \supset A$ называется описанной. Открытая многоугольная фигура $Q \subset A$ называется вписанной.

Замечание. Далее, если фигура обозначена P , то считаем ее замкнутой описанной, а если Q то открытой вписанной.

Замечание. Для любой фигуры существует описанная (поскольку любая фигура ограничена) и вписанная (пустое множество).

Определение. Число $\mu^*(A) = \inf_{A \subset P} \mu(P)$ называется верхней площадью A .

Число $\mu_*(A) = \sup_{Q \subset A} \mu(Q)$ называется нижней площадью A .

Определение. Если $\mu^*(A) = \mu_*(A)$, то $\exists \mu(A) = \mu^*(A) = \mu_*(A)$. Такая фигура A называется квадратуемой.

3.4 Первый и второй критерии квадратуемости

Теорема. (Первый критерий квадратуемости)

Фигура A квадратуема $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists P_\varepsilon, Q_\varepsilon, \mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \varepsilon$

Доказательство.

$(\Rightarrow) : A$ - квадратуема $\Rightarrow \mu^*(A) = \mu_*(A)$, но

$$\forall \varepsilon > 0 \exists P_\varepsilon : \mu(P_\varepsilon) - \mu^*(A) < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists Q_\varepsilon : \mu_*(A) - \mu(Q_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\Rightarrow \mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \varepsilon$$

$(\Leftarrow) :$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists P_\varepsilon, Q_\varepsilon, \mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \varepsilon \Rightarrow \mu^*(A) - \mu_*(A) < \varepsilon \Rightarrow \mu^*(A) = \mu_*(A)$$

□

Теорема. (Второй критерий квадрируемости)

Фигура A квадрируема $\Leftrightarrow \mu(\partial A) = 0$.

Доказательство.

(\Rightarrow) : A - квадрируема \Rightarrow по первому критерию квадрируемости:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists P_\varepsilon, Q_\varepsilon : \mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \varepsilon$$

$\partial A \subset P \setminus Q$, Q - внутренние точки A , $\mathbb{R}^2 \setminus P$ - внешние точки A .

В частности, $\partial A \subset P_\varepsilon \setminus Q_\varepsilon \Rightarrow \mu^*(\partial A) < \varepsilon \Rightarrow \mu(\partial A) = 0$.

(\Leftarrow) : $\mu(\partial A) = 0 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists P_\varepsilon \supset \partial A, \mu(P_\varepsilon) < \varepsilon \Rightarrow \exists h > 0$,

$\partial A \subset \cup(\text{кв. сетка с шагом } h) = A_2 : \mu(A_2) < 72\varepsilon$ (по лемме ниже).

$A_1 = \cup(\text{квадраты сетки, целиком состоящие из внутренних точек } A)$

$\Rightarrow A \subset A_1 \cup A_2 \Rightarrow A_1 \cup A_2 = P, A_1 = Q, \mu(P) - \mu(Q) = \mu(A_2) < 72\varepsilon$

□


Лемма. Пусть P - многоугольная фигура, $B \subset P$ и $\mu(P) < \varepsilon \Rightarrow \exists h > 0$ такое, что $B \subset M$, $\mu(M) < 72\varepsilon$, где M - квадратная сетка со сторонами квадратов параллельными осям координат и шагом h .

Доказательство. Пусть $\mu(P) < \varepsilon$

1. P - многоугольная фигура $\Rightarrow P$ - это объединение треугольников $\Rightarrow P$ можно представить в виде объединения прямоугольных треугольников. Достроим прямоугольные треугольники до прямоугольников, их объединение обозначим M_1 . Тогда $P \subset M_1$ и $\mu(M_1) < 2\varepsilon$.
2. Теперь накроем M_1 объединением квадратов M_2 . Будем накрывать прямоугольник квадратами со стороной, равной меньшей из сторон прямоугольника, начиная от одной из меньших сторон, пока не заложим весь прямоугольник. Тогда либо прямоугольник накрылся, либо последний квадрат вылез за границу, а так как площадь прямоугольника не меньше квадрата с его меньшей стороной, то площадь увеличилась не более чем вдвое (на самом деле строго меньше, но нам это не особо нужно). Итак, $M_1 \subset M_2$ и $\mu(M_2) < 4\varepsilon$.



3. Теперь накроем M_2 объединением квадратов M_3 таким, что стороны квадратов из M_3 параллельны осям координат. Для этого впишем каждый квадрат в квадрат со сторонами, параллельными осям (проведем параллели через вершины квадрата), тогда квадрат дополняется до нужного нам четырьмя треугольниками, причём квадрат разбивается на 4 равных треугольника, дополняющих изначальные до прямоугольников, плюс квадратный кусочек в центре, которого не будет только в случае поворота на 45 градусов - опять же площадь увеличится не больше чем вдвое. Значит, $M_2 \subset M_3$ и $\mu(M_3) < 8\varepsilon$.



4. Теперь возьмем h , равное стороне наименьшего квадрата, и построим квадратную сетку M с шагом h . Рассмотрим квадрат L , возможны два случая:
- (i) Если внутри квадрата L ни один из квадратов сетки не лежит целиком $\Rightarrow L$ лежит внутри квадрата 2×2 , составленного из квадратов сетки. Поскольку площадь L не меньше площади квадрата сетки, то площадь увеличится не более чем вчетверо.
 - (ii) Если существуют квадраты сетки, лежащие внутри L , то их объединение образует большой квадрат, лежащий внутри L , а значит весь L покрывается девятью копиями этого квадрата.



В итоге получим, что $B \subset P \subset M_1 \subset M_2 \subset M_3 \subset M$, причем $\mu(M) < 72\varepsilon$.

□

3.5 Квадрируемость простой спрямляемой кривой и криволинейной трапеции

Теорема. Если $\bar{\gamma}(t)$ - простая спрямляемая кривая, то $\mu(\bar{\gamma}(t)) = 0$.

Доказательство. Делим $\bar{\gamma}(t)$ на n одинаковых по длине кусков. $\{\bar{\gamma}(t_k)\}_{k=1}^{n+1}$. $\bar{\gamma}(t) \subset \cup(\text{квадратов с центрами в } \bar{\gamma}(t_k) \text{ и стороной } |\frac{2\bar{\gamma}(t)}{n}|)$.

$$\mu(\cup(\text{кв.}...)) < \frac{4|\bar{\gamma}(t)|^2}{n^2} \cdot (n+1) \rightarrow 0$$

□

Теорема. Пусть $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$, $f(x) \geq 0$, тогда фигура A :

$$A = \{(x, y) : x \in [a, b], 0 \leq y \leq f(x)\}$$

квадрируема и

$$\mu(A) = \int_a^b f(x) dx$$

Доказательство.

$$f(x) \in \mathcal{R}[a, b] \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall T : d(T) < \delta : \underline{\underline{S}}(T) - \bar{\bar{S}}(T) < \varepsilon$$

Значит выполнено: $\mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \varepsilon$ и A - квадрируема по первому критерию квадрируемости. При этом

$$\mu^*(A) = \mu_*(A) = \mu(A) \rightarrow \int_a^b f(x) dx$$

□

4 Интеграл Римана-Стилтьеса

4.1 Функции ограниченной вариации

Определение. Пусть $f(x)$ определена на $[a, b]$, $T_{[a,b]}$ - разбиение отрезка $[a, b]$. Сумма вида

$$V(f, T) = \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})|$$

называется вариацией функции на данном разбиении T

Определение. Если $\exists M > 0$ такое, что $\forall T_{[a,b]} : V(f, T) \leq M$, то функция называется функцией ограниченной вариации на $[a, b]$, а величина

$$\sup_T V(f, T) = \overset{b}{\underset{a}{V}} f(x) = \text{var}_{[a,b]} f(x)$$

называется полной вариацией функции на отрезке $[a, b]$

4.2 Свойства функций ограниченной вариации

Теорема 1. Если $f \in \mathcal{V}[a, b]$, то f - ограничена на $[a, b]$.

Доказательство. Временно очев. □

Теорема 2. Пусть $T'_{[a,b]}$ - измельчение $T_{[a,b]}$. Тогда $V(f, T) \leq V(f, T')$

Доказательство. Временно очев (модуль суммы меньше или равен сумме модулей). □

Теорема 3. Если $f \in \mathcal{V}[a, b]$, то $\forall \alpha \in \mathbb{R}$:

$$\overset{b}{\underset{a}{V}}(\alpha \cdot f(x)) = |\alpha| \cdot \overset{b}{\underset{a}{V}} f(x)$$

Теорема 4. Если $f, g \in \mathcal{V}[a, b]$, то $f + g \in \mathcal{V}[a, b]$

Доказательство.

$$\overset{b}{\underset{a}{V}}(f(x) + g(x)) \leq \overset{b}{\underset{a}{V}} f(x) + \overset{b}{\underset{a}{V}} g(x)$$

Теорема 5. Если $f, g \in \mathcal{V}[a, b]$, то $f(x) \cdot g(x) \in \mathcal{V}[a, b]$

Доказательство.

$$\begin{aligned} |f(x_i)g(x_i) - f(x_{i-1})g(x_i) + f(x_{i-1})g(x_i) - f(x_{i-1})g(x_{i-1})| &\leq \\ &\leq M_1 \cdot |f(x_i) - f(x_{i-1})| + M_2 \cdot |g(x_i) - g(x_{i-1})| \end{aligned}$$

□

Теорема 6. Если $f, g \in \mathcal{V}[a, b]$, $g \geq \varepsilon > 0$, то $\frac{f}{g} \in \mathcal{V}[a, b]$

Теорема 7. Если $f(x)$ монотонна на $[a, b]$, то

$$\overset{b}{V}_a f(x) = f(b) \cdot f(a)$$

Теорема 8. (Аддитивность)

Если $c \in (a, b)$, $f \in \mathcal{V}[a, c]$ и $f \in \mathcal{V}[b, c]$, то $f \in \mathcal{V}[a, b]$ и

$$\overset{b}{V}_a f(x) = \overset{c}{V}_a f(x) + \overset{c}{V}_b f(x)$$

Доказательство. Рассмотрим

$$V(f, T_{[a,b]}) \leq V(f, T_{[a,b] \cup \{c\}}) = V(f, T_{[a,c]}) + V(f, T_{[c,b]})$$

значит

$$\overset{b}{V}_a f(x) \leq \overset{c}{V}_a f(x) + \overset{b}{V}_c f(x)$$

С другой стороны, рассмотрим

$$V(f, T_{[a,c]}) + V(f, T_{[c,b]}) = V(f, T_{a,b} \ni c)$$

отсюда получим

$$\overset{c}{V}_a f(x) + \overset{b}{V}_c f(x) = \sup V(f, T_{[a,b]} \ni c) \leq \overset{b}{V}_a f(x)$$

□

Теорема. Если $f(x) \in \mathcal{V}[a, b]$, то $\exists h(x), v(x)$ - монотонно неубывающие на $[a, b]$ такие, что $f(x) = v(x) - h(x)$.

Доказательство. Пусть

$$v(x) = \overset{x}{V}_a f(x)$$

Рассмотрим функцию $h(x) = v(x) - f(x)$. Пусть $x_1, x_2 \in [a, b]$, $x_2 > x_1$:

$$h(x_2) - h(x_1) = \overset{x_2}{V}_{x_1} f(x) - (f(x_2) - f(x_1)) \geq 0$$

так как

$$\overset{x_2}{V}_{x_1} \geq |f(x_2) - f(x_1)|$$

$\Rightarrow h(x)$ - неубывает.

□

4.3 Липшицевы функции

Определение. Функция $f(x)$, опеределенная на (a, b) , называется липшицевой, если $\exists M > 0$ такое, что $\forall x_1, x_2 \in [a, b]$:

$$|f(x_2) - f(x_1)| \leq M \cdot |x_2 - x_1|$$

Часто обозначают $f(x) \in \text{Lip}[a, b]$ или $f \in \text{Lip}_1[a, b]$

Теорема. Если $f(x) \in \text{Lip}_1[a, b]$, то $f \in \mathcal{V}[a, b]$

Доказательство.

$$V(f, T) = \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| \leq \sum_{i=1}^n |x_i - x_{i-1}| = M \cdot (b - a)$$

□

Теорема. Если $f(x) \in C^1[a, b]$, то $f(x) \in \mathcal{V}[a, b]$ и

$$\overset{b}{\underset{a}{V}} f(x) = \int_a^b |f'(x)| dx$$

Доказательство. Если $f \in C^1[a, b]$, то $f \in \text{Lip}_1[a, b]$, так как по формуле Лагранжа:

$$|f(x_2) - f(x_1)| = |f'(\xi)(x_2 - x_1)| \leq \max_{x \in [a, b]} |f'(x)| \cdot |x_2 - x_1|$$

$$\begin{aligned} V(f, T) &= \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| = \sum_{i=1}^n |f'(\xi)(x_i - x_{i-1})| = \\ &= \sum_{i=1}^n |f'(\xi)|(x_i - x_{i-1}) \rightarrow \int_a^b |f'(x)| dx \end{aligned}$$

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall T, d(T) < \delta:$

$$\left| V(f, T) - \int_a^b |f'(x)| dx \right| < \varepsilon$$

По определению точной верхней грани: $\forall \varepsilon > 0 \exists V(f, T_\varepsilon)$ такое, что

$$\overset{b}{\underset{a}{V}} f(x) - V(f, T_\varepsilon) < \varepsilon$$

измельчаем T_ε , значит T_ε^* с $d(T_\varepsilon^*) < \delta$:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) - \int_a^b |f'(x)| dx \right| &= \\ &= \left| \int_a^b f(x) - \int_a^b |f'(x)| dx + V(f, T_\varepsilon^*) - V(f, T_\varepsilon^*) \right| \leq \\ &\leq \left| \int_a^b f(x) - V(f, T_\varepsilon^*) \right| + \left| \int_a^b |f'(x)| dx - V(f, T_\varepsilon^*) \right| < 2\varepsilon \end{aligned}$$

□

4.4 Определение интеграла Римана-Стилтьеса

Определение. Пусть $f(x)$, $g(x)$ определены на $[a, b]$. $\forall T(\xi)$ сумма

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i)(g(x_i) - g(x_{i-1})) = \sigma_g(f, T)$$

называется интегральной суммой Римана-Стилтьеса.

Определение. Если существует предел

$$\lim_{d \rightarrow 0} \sigma_g(f, T(\xi)) = \int_a^b f(x) d(g(x))$$

то он называется интегралом Римана-Стилтьеса.

4.5 Свойства интеграла Римана-Стилтьеса

Теорема 1. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\int_a^b (\alpha \cdot f(x)) d(\beta \cdot g(x)) = \alpha \cdot \beta \int_a^b f(x) d(g(x))$$

Теорема 2. Если существуют интегралы

$$\int_a^b f_1(x) d(g(x)), \int_a^b f_2(x) d(g(x))$$

то существует интеграл

$$\int_a^b (f_1 + f_2) d(g(x)) = \int_a^b f_1(x) d(g(x)) + \int_a^b f_2(x) d(g(x))$$

Теорема 3. Если существуют интегралы

$$\int_a^b f(x) d(g_1(x)), \int_a^b f(x) d(g_2(x))$$

то существует интеграл

$$\int_a^b f(x) d(g_1(x) + g_2(x)) = \int_a^b f(x) d(g_1) + \int_a^b f(x) d(g_2)$$

Теорема 4. (Аддитивность)

Если существуют

$$\int_a^b f(x) d(g(x)), \int_a^c f(x) d(g(x)), \int_c^b f(x) d(g(x))$$

то

$$\int_a^b f(x) d(g(x)) = \int_a^c f(x) d(g(x)) + \int_c^b f(x) d(g(x))$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) d(g(x)) &= \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(g(x_i) - g(x_{i-1})) = \\ &= \lim_{d \rightarrow 0, c \in T} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(g(x_i) - g(x_{i-1})) = \\ &= \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^{n_1} f(\xi_i)(g(x_i) - g(x_{i-1})) + \\ &\quad + \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=n+1}^n f(\xi_i)(g(x_i) - g(x_{i-1})) = \\ &= \int_a^c f(x) d(g(x)) + \int_c^b f(x) d(g(x)) \end{aligned}$$

□

Замечание. Если существует интеграл

$$\int_a^b f(x) d(g(x))$$

то существуют интегралы

$$\int_a^c f(x) d(g(x)), \int_b^c f(x) d(g(x))$$

Замечание. Если существуют интегралы

$$\int_a^c f(x) d(g(x)), \int_c^b f(x) d(g(x))$$

то интеграл

$$\int_a^b f(x) d(g(x))$$

не обязательно существует.

Пример.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [-1, 0], \\ 1, & x \in (0, 1]. \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 0, & x \in [-1, 0), \\ 1, & x \in [0, 1]. \end{cases}$$

$$\int_{-1}^0 f(x) d(g(x)) = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(g(x_i) - g(x_{i-1})) = 0$$

$$\int_0^1 f(x) d(g(x)) = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(g(x_i) - g(x_{i-1})) = 0$$

$$\int_{-1}^1 f(x) d(g(x)) = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(g(x_i) - g(x_{i-1})) = \lim_{d \rightarrow 0} f(\xi_j)(g(x_j) - g(x_{j-1}))$$

При разной разметке будет получаться 1 или 0, значит, предела не существует.

Теорема 5. (Интегрирование по частям)

Если существуют интеграл

$$\int_a^b f(x) d(g(x))$$

то существует интеграл

$$\int_a^b g(x) d(f(x))$$

причем

$$\int_a^b f(x) d(g(x)) = f(x) \cdot g(x)|_a^b - \int_a^b g(x) d(f(x))$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n g(\xi_i)(f(x_i) - f(x_{i-1})) &= \\ &= g(\xi_1)(f(x_1) - f(a)) + g(\xi_2)(f(x_2) - f(x_1)) + \dots + \\ &\quad + g(\xi_{n-1})(f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})) + g(\xi_n)(f(b) - f(x_{n-1})) = \\ &= -g(\xi_1)f(a) - f(x_1)(g(\xi_2) - g(\xi_1)) - \dots - f(x_{n-1})(g(\xi_n) - g(\xi_{n-1})) + \\ &\quad + g(\xi_n)f(b) + f(b)g(b) - f(b)g(b) - f(a)g(a) + f(a)g(a) = \\ &= -f(a)(g(\xi_1) - g(a)) - \dots - f(b)(g(b) - g(\xi_n)) + f(b)g(b) - f(a)g(a) \end{aligned}$$

Устремим диаметр разбиения к нулю, и получим утверждение теоремы. \square

4.6 Существование интеграла Римана-Стилтьеса

В дальнейших рассуждениях будут использоваться обозначения

$$\underline{S}(T) = \sum_{i=1}^n M_i(g(x_i) - g(x_{i-1})), \quad \overline{\overline{S}}(T) = \sum_{i=1}^n m_i(g(x_i) - g(x_{i-1}))$$

Теорема. Если $f(x) \in \mathcal{C}[a, b]$, $g(x) \in \mathcal{V}[a, b]$, то существует интеграл

$$\int_a^b f(x) d(g(x))$$

Доказательство. Пусть $g(x)$ монотонно возрастает. $f(x) \in \mathcal{C}[a, b]$ значит $f(x)$ - равномерно непрерывна, на $[a, b] \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, d(T) < \delta : M_i - m_i < \varepsilon$ а значит

$$\underline{S}(T) - \overline{\overline{S}}(T) < \varepsilon \cdot (g(b) - g(a)) \Rightarrow \inf_T \underline{S}(T) = \sup_T \overline{\overline{S}}(T) = I$$

$$|\sigma_f(g, T) - I| < \varepsilon \cdot (g(b) - g(a))$$

значит существует предел

$$\lim_{d \rightarrow 0} \sigma_f(g, T) = I$$

\square

Замечание. В условиях теоремы существует интеграл

$$\int_a^b g(x) d(f(x))$$

по теореме об интегрировании по частям.

4.7 Связь интеграла Римана и интеграла Римана-Стилтьеса

Знаки (R) и (S) обозначают что рассматривается интеграл по Риману и Риману-Стилтьесу соответственно.

Теорема. Если $f(x) \in \mathcal{V}[a, b]$, $g(x) \in \mathcal{D}[a, b]$, $g'(x) \in \mathcal{R}[a, b]$, то

$$(S) \int_a^b f(x) d(g(x)) = (R) \int_a^b f(x) g'(x) dx$$

Доказательство. Оба интеграла существуют по условиям теоремы, значит достаточно будет доказать для какой-то выбраной разметки. По формуле Лагранжа:

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i)(g(x_i) - g(x_{i-1})) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g'(\zeta_i)(x_i - x_{i-1})$$

Теперь возьмем в качестве разметки интеграла Римана-Стилтьеса разметку ζ_i , и получаем равенство

$$\sum_{i=1}^n f(\zeta_i)(g(x_i) - g(x_{i-1})) = \sum_{i=1}^n f(\zeta_i)g'(\zeta_i)(x_i - x_{i-1})$$

□

4.8 Теоремы о среднем

Теорема. (Первая теорема о среднем)

Пусть $f(x) \in \mathcal{C}[a, b]$, $g(x)$ монотонно возрастает. Тогда $\exists c \in [a, b]$ такая, что

$$\int_a^b f(x) d(g(x)) = f(c)(g(b) - g(a))$$

Доказательство. Если $g(b) = g(a)$ то равенство верно. Пусть $g(b) > g(a)$, $m = \min_{[a,b]} f(x)$, $M = \max_{[a,b]} f(x)$

$$m \cdot (g(b) - g(a)) \leq \overline{\underline{S}}(T) \leq \int_a^b f(x) d(g(x)) \leq \underline{\underline{S}}(T) \leq M \cdot (g(b) - g(a))$$

отсюда

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x) d(g(x))}{g(b) - g(a)} \leq M$$

□

Теорема. (Вторая теорема о среднем)

Пусть $f(x) \in \mathcal{C}[a, b]$, $g(x)$ монотонно возрастает. Тогда $\exists c \in [a, b]$ такая, что

$$\int_a^b g(x) d(f(x)) = g(a) \cdot (f(c) - f(a)) + g(b) \cdot (f(b) - f(c))$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \int_a^b g(x) d(f(x)) &= g(b)f(b) - g(a)f(a) - f(c)(g(b) - g(a)) = \\ &= g(a)(f(c) - f(a)) + g(b)(f(b) - f(c)) \end{aligned}$$

□

Следствие. (Вторая теорема о среднем для интеграла Римана)

Пусть $f(x) \in \mathcal{C}[a, b]$, $g(x)$ монотонно возрастает. Тогда

$$(R) \int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \cdot \int_a^c f(x) dx + g(b) \cdot \int_c^b f(x) dx$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} (R) \int_a^b f(x)g(x) dx &= (S) \int_a^b g(x) d\left(\int_a^x f(t) dt\right) = \\ &= g(a) \cdot \int_a^c f(t) dt + g(b) \cdot \int_c^b f(t) dt \end{aligned}$$

□

5 Несобственный интеграл

5.1 Определение несобственного интеграла

Определение. Если $f(x) \in \mathcal{R}[a, a_1]$, $\forall a_1 \in [a, b)$, то

$$\lim_{a_1 \rightarrow b-0} \int_a^{a_1} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

называется несобственным интегралом первого рода. Если этот предел существует, то интеграл называется сходящимся, если не существует - расходящимся.

Определение. Если $f(x) \in \mathcal{R}[a, a_1]$, $\forall a_1 \in (a, +\infty)$, то

$$\lim_{a_1 \rightarrow +\infty} \int_a^{a_1} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

называется несобственным интегралом второго рода. Если этот предел существует, то интеграл называется сходящимся, если не существует - расходящимся.

Замечание. В дальнейшем будем обозначать несобственные интегралы

$$\int_a^{\omega} f(x) dx$$

где ω - число или знак $+\infty$ ($-\infty$).

Замечание. Если на отрезке интегрирования несобственного интеграла есть несколько особых точек, то интеграл сходится, если он сходится во всех своих особых точках. Такие интегралы также могут рассматриваться в дальнейших рассуждениях.

5.2 Критерий Коши сходимости несобственного интеграла

Теорема. Несобственный интеграл

$$\int_a^{\omega} f(x) dx$$

сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta \in [a, \omega), \forall x_1, x_2 \in [\delta, \omega) : \left| \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \right| < \varepsilon$$

Доказательство. Рассмотрим функцию

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

и запишем критерий Коши существования предела $f(x)$ при $x \rightarrow \omega$.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x_1, x_2 \in [\delta, \omega) : |F(x_2) - F(x_1)| < \varepsilon$$

значит

$$\left| \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \right| = \left| \int_a^{x_2} f(t) dt - \int_a^{x_1} f(t) dt \right| = |F(x_2) - F(x_1)| < \varepsilon$$

□

5.3 Свойства несобственного интеграла

Теорема 1. (Линейность)

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ если существуют интегралы

$$\int_a^\omega f(x) dx, \int_a^\omega g(x) dx$$

то существует интеграл

$$\int_a^\omega (\alpha f(x) + \beta g(x)) = \alpha \cdot \int_a^\omega f(x) dx + \beta \cdot \int_a^\omega g(x) dx$$

Теорема 2. (Интегрирование по частям)

Пусть $f(x), g(x) \in C^1[a, \omega]$. Если существуют два объекта из трех:

$$\int_a^\omega f(x)g'(x) dx, \int_a^\omega f'(x)g(x) dx, \lim_{x \rightarrow \omega} f(x)g(x)$$

то существует и третий и верна формула

$$\int_a^\omega f(x)g'(x) dx = f(x)g(x)|_a^\omega - \int_a^\omega f'(x)g(x) dx$$

Теорема 3. (Замена переменной)

Рассмотрим несобственный интеграл

$$\int_a^{\omega} f(x) dx$$

и пусть $\varphi(t) \in \mathcal{C}^1[\alpha, \beta)$, $a \leq \varphi(t) \leq \omega$, $\varphi(\alpha) = a$, $\lim_{t \rightarrow \beta} \varphi(t) = \omega$

$$\int_a^{\omega} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$$

Теорема 4. Пусть существуют несобственные интегралы

$$\int_a^{\omega} f(x) dx, \int_a^{\omega} g(x) dx$$

Если $f(x) \leq g(x)$, то

$$\int_a^{\omega} f(x) dx \leq \int_a^{\omega} g(x) dx$$

Теорема 5. Если $\forall a' \in [a, \omega)$ существует интеграл

$$\int_a^{a'} f(x) dx$$

а также существует несобственный интеграл

$$\int_a^{\omega} |f(x)| dx$$

то

$$\left| \int_a^{\omega} f(x) dx \right| \leq \int_a^{\omega} |f(x)| dx$$

Определение. Если существует интеграл

$$\int_a^{\omega} |f(x)| dx$$

то интеграл

$$\int_a^{\omega} f(x) dx$$

называется абсолютно сходящимся.

Утверждение. Если $\forall a' \in [a, \omega]$ существует интеграл

$$\int_a^{a'} f(x) \, dx$$

и интеграл

$$\int_a^{\omega} |f(x)| \, dx$$

сходится, то интеграл

$$\int_a^{\omega} f(x) \, dx$$

сходится

Доказательство. По критерию Коши и неравенству

$$\left| \int_{a_1}^{a_2} f(x) \, dx \right| \leq \int_{a_1}^{a_2} |f(x)| \, dx < \varepsilon$$

□

Определение. Сходящийся интеграл

$$\int_a^{\omega} f(x) \, dx$$

называется условно сходящимся, если интеграл

$$\int_a^{\omega} |f(x)| \, dx$$

расходится.

Пример. Рассмотрим функцию $f(x)$, которая задается последовательностью треугольников, у которых основание лежит на оси абсцисс, причем центрами оснований являются точки $1, 2, 3, \dots$, вершиной k -го треугольника является точка (k, k) , а также площади треугольников составляют бесконечно убывающую геометрическую прогрессию $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$. Построенная функция неограничена на $[0, +\infty)$, но интеграл от нее сходится.

$$\int_0^{+\infty} f(x) \, dx = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = 1$$



5.4 Признаки сходимости несобственных интегралов

Теорема. (Признак Вейерштрасса)

Пусть $0 \leq f(x) \leq g(x)$ на $[a, \omega)$

1. Если существует интеграл

$$\int_a^{\omega} g(x) \, dx$$

то существует интеграл

$$\int_a^{\omega} f(x) \, dx$$

2. Если не существует интеграла

$$\int_a^{\omega} f(x) \, dx$$

то не существует интеграла

$$\int_a^{\omega} g(x) \, dx$$

Доказательство. Рассмотрим функции

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt, \quad G(x) = \int_a^x g(t) \, dt$$

заметим, что они неубывающие, а также

$$f(x) \leq g(x) \Rightarrow F(x) \leq G(x)$$

1. Пусть $G(x) \rightarrow C \Rightarrow F(x) \leq C \Rightarrow$ по теореме Вейерштрасса существует предел $F(x)$.
2. Поскольку $F(x)$ неубывает и у нее не существует предела, то $F(x) \rightarrow +\infty$, но так как $F(x) \leq G(x)$, то и $G(x) \rightarrow +\infty$.

□

Теорема. Пусть $0 \leq f(x) \leq g(x)$ и существует предел

$$\lim_{x \rightarrow \omega} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

Тогда интегралы

$$\int_a^\omega f(x) dx, \int_a^\omega g(x) dx$$

сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. $\forall \varepsilon > 0 \exists A, \forall x \in [A, \omega)$:

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - 1 \right| < \varepsilon \Rightarrow 1 - \varepsilon < \frac{f(x)}{g(x)} < 1 + \varepsilon$$

значит

$$(1 - \varepsilon) \cdot g(x) < f(x) < (1 + \varepsilon) \cdot g(x)$$

далее воспользуемся признаком Вейерштрасса.

□

Теорема. (Признаки Абеля и Дирихле)

Пусть $f(x) \in \mathcal{C}[a, \omega)$, $g(x)$ монотонна на $[a, \omega)$, а также $|f(x)| \leq C$, $|g(x)| \leq C$. Тогда

(\mathcal{A}): Если существует интеграл

$$\int_a^\omega f(x) dx$$

то существует интеграл

$$\int_a^\omega f(x)g(x) dx$$

(\mathcal{D}): Если $g(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \omega$ и

$$\left| \int_a^{a'} f(x) dx \right| \leq C, \forall a' \in [a, \omega]$$

то существует интеграл

$$\int_a^\omega f(x)g(x) dx$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \left| \int_{x_1}^{x_2} f(x)g(x) dx \right| &= \left| g(x_1) \cdot \int_{x_1}^c f(x) dx + g(x_2) \cdot \int_c^{x_2} f(x) dx \right| \leq \\ &\leq |g(x_1)| \cdot \left| \int_{x_1}^c f(x) dx \right| + |g(x_2)| \cdot \left| \int_c^{x_2} f(x) dx \right| \leq \end{aligned}$$

$$(\mathcal{A}) : \leq C \cdot 2\varepsilon$$

$$(\mathcal{D}) : \leq \varepsilon \cdot 4C$$

□

Пример. Интеграл

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

сходится, но интеграл

$$\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx$$

расходится, так как

$$\frac{1}{2x} - \frac{\cos 2x}{2x} = \frac{1 - \cos 2x}{2x} = \frac{\sin^2 x}{x} \leq \frac{|\sin x|}{x}$$

5.5 Главное значение интеграла в смысле Коши

Определение. Пусть $f(x)$ определена на \mathbb{R} и $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$, $\forall a, b$. Величина

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x) dx = \text{v.p.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$$

называется главным значением интеграла в смысле Коши.

Замечание. Главное значение интеграла в смысле Коши не является неопределенным интегралом.

Теорема. Главное значение интеграла в смысле Коши существует, если сходится несобственный интеграл

$$\int_0^{+\infty} (f(x) + f(-x)) \, dx$$

Доказательство.

$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

Возьмем интеграл от $-A$ до A , второе слагаемое всегда ноль. □

Замечание. Аналогично определяется главное значение с особенностью в точке $c \in (a, b)$:

$$\text{v.p.} \int_a^b f(x) \, dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+0} \left(\int_a^{c-\varepsilon} f(x) \, dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x) \, dx \right)$$

6 Функции нескольких переменных

6.1 Основные определения

Обозначим

$$\mathbb{R}^n = \prod_{i=1}^n \mathbb{R}, \quad \|\bar{x}\| = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$
$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

Определение. Расстоянием между \bar{x} и \bar{y} называется функция $\rho(\bar{x}, \bar{y})$, для которой выполнено:

1. $\rho(\bar{x}, \bar{y}) \geq 0$
2. $\rho(\bar{x}, \bar{y}) = 0 \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{y}$
3. $\rho(\bar{x}, \bar{y}) = \rho(\bar{y}, \bar{x})$
4. $\rho(\bar{x}, \bar{y}) \leq \rho(\bar{x}, \bar{z}) + \rho(\bar{z}, \bar{y})$

В рамках нашего курса можно использовать обозначение $\rho(\bar{x}, \bar{y}) = \|\bar{x} - \bar{y}\|$

Определение. Окрестностью точки \bar{x}_0 или шаром с центром в точке \bar{x}_0 будем называть множества

$$B_\varepsilon(\bar{x}_0) = \{\bar{x} : \rho(\bar{x}, \bar{x}_0) < \varepsilon\}$$
$$\mathring{B}_\varepsilon(\bar{x}_0) = \{\bar{x} : 0 < \rho(\bar{x}, \bar{x}_0) < \varepsilon\}$$

Определение. Множество $A \subset \mathbb{R}^n$ называется ограниченным, если

$$\exists R > 0 : A \subset B_R(\bar{0})$$

Определение. Последовательность $\{\bar{x}_k\}_{k=1}^\infty$ называется сходящейся, если

$$\exists \bar{x}_0 : \forall \varepsilon > 0 \exists K \in \mathbb{N}, \forall k > K : \rho(\bar{x}_0, \bar{x}_k) < \varepsilon$$

В этом случае говорят, что существует предел

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \bar{x}_k = \bar{x}_0$$

Теорема.

$$\exists \lim_{k \rightarrow \infty} \bar{x}_k = \bar{x}_0 \Leftrightarrow \forall i = 1, \dots, n : \exists \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k_i} = x_{0_i}$$

Доказательство.

(\Rightarrow) :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K, \forall k > K : \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_{k_i} - x_{0_i})^2} < \varepsilon \Rightarrow \forall i : |x_{k_i} - x_{0_i}| < \varepsilon$$

(\Leftarrow) :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K_i, \forall k > K_i : |x_{k_i} - x_{0_i}| < \varepsilon$$

Пусть $K = \max_i K_i$. Тогда

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_{k_i} - x_{0_i})^2} < \varepsilon$$

□

Теорема. (Теорема Больцано-Вейерштрасса)

Если последовательность $\{\bar{x}_k\}_{k=1}^{\infty}$ ограничена, то у нее существует сходящаяся подпоследовательность $\{\bar{x}_{k_m}\}_{m=1}^{\infty}$

Доказательство.

$$\{x_{k_1}\} - \text{ограничена} \Rightarrow \exists \text{ сходящаяся подпоследовательность } \{x_{k_{1_1}}\}$$

$$\{x_{k_2}\} - \text{ограничена} \Rightarrow \exists \text{ сходящаяся подпоследовательность } \{x_{k_{2_2}}\}$$

\vdots

$$\{x_{k_n}\} - \text{ограничена} \Rightarrow \exists \text{ сходящаяся подпоследовательность } \{x_{k_{nn}}\}$$

□

Определение. Множество $\Pi_{[\bar{a}, \bar{b}]} = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$ называется параллелепипедом.

Теорема. Если последовательность вложенных параллелепипедов такая, что

$$\{\Pi_{[\bar{a}, \bar{b}]}\}_{k=1}^{\infty}, \forall k : \Pi_{[\bar{a}_{k+1}, \bar{b}_{k+1}]} \subset \Pi_{[\bar{a}_k, \bar{b}_k]}, \max_{1 \leq i \leq n} |b_{k_i} - a_{k_i}| \rightarrow 0$$

то существует единственная точка ξ , что $\forall k : \xi \in \Pi_{[\bar{a}_k, \bar{b}_k]}$.

Доказательство. Очев.

□

6.2 Секвенциальная компактность

Определение. Множество $A \subset \mathbb{R}^n$ называется секвенциальным компактом, если

$$\forall \{\bar{a}_k\}_{k=1}^{\infty} \subset A \quad \exists \{\bar{a}_{i_m}\}_{m=1}^{\infty} : \bar{a}_{i_m} \rightarrow \bar{a} \in A, \quad m \rightarrow \infty$$

Теорема. A - секвенциальный компакт $\Leftrightarrow A$ - замкнуто и ограничено.

Доказательство.

(\Rightarrow): Если A - неограничено, то $\exists \{\bar{a}\}_{i=1}^{\infty}, \|\bar{a}_i\| \rightarrow \infty \Rightarrow$ получаем противоречие. Тогда A - ограничено и по теореме Больцано-Вейерштрасса:

$$\forall \{\bar{a}_i\}_{i=1}^{\infty} \quad \exists \{\bar{a}_{i_m}\}_{m=1}^{\infty}, \quad \bar{a}_{i_m} \rightarrow \bar{a} \in A$$

значит A содержит все свои предельные точки, то есть A - замкнуто.

(\Leftarrow): Из ограниченности и замкнутости:

$$\forall \{\bar{a}_i\}_{i=1}^{\infty} \quad \exists \{\bar{a}_{i_m}\}_{m=1}^{\infty}, \quad \bar{a}_{i_m} \rightarrow \bar{a} \in A$$

□

Теорема. A - секвенциальный компакт тогда и только тогда, когда

$$\forall \{U_{\alpha}\} : A \subset \bigcup_{\alpha} U_{\alpha} \quad \exists \{U_{\alpha_i}\}_{i=1}^N : A \subset \bigcup_{i=1}^N U_{\alpha_i}$$

Доказательство.

(\Rightarrow): $\exists \prod_{i=1}^n [a_i, a_i + d] \supset A$, поделим каждое ребро пополам и получим 2^n кубиков.
(будет расписано подробнее)

(\Leftarrow): От противного: пусть $\exists \{\bar{a}_k\}_{k=1}^{\infty}$ - некоторая сходящаяся подпоследовательность. Тогда

$$\forall \bar{y} \in A \quad \exists B_{\varepsilon_y}(\bar{y}) : B_{\varepsilon_y}(\bar{y}) \cap \{\bar{x}_k\} - \text{конечно}$$

$$A \subset \bigcup_{y \in A} B_{\varepsilon_y}(\bar{y}), \quad \exists \bigcup_{i=1}^N B_{\varepsilon_{y_i}}(\bar{y}_i) \supset A$$

□

Определение. Пусть $A, B \subset \mathbb{R}^n$. Расстоянием между множествами A и B называется

$$\rho(A, B) = \inf_{\bar{a} \in A, \bar{b} \in B} \rho(\bar{a}, \bar{b})$$

Теорема. Пусть $A, B \subset \mathbb{R}^n$ - замкнутые и A - ограничено. Если $A \cap B = \emptyset$, то $\rho(A, B) > 0$.

Доказательство. От противного:

$$\rho(A, B) = 0 \Rightarrow \exists \{\bar{x}_k\} \subset A, \exists \{\bar{y}_k\} \subset B : \rho(\bar{x}_k, \bar{y}_k) \rightarrow 0$$

но $\{\bar{x}_k\}$ - ограничена $\Rightarrow \exists \bar{x}_{k_m} \rightarrow \bar{x}, m \rightarrow \infty$

$$\rho(\bar{x}, \bar{y}_{k_m}) \leq \rho(\bar{x}, \bar{x}_{k_m}) + \rho(\bar{x}_{k_m}, \bar{y}_{k_m}) < 2\varepsilon \Rightarrow \bar{y}_{k_m} \rightarrow \bar{x} \in B$$

□

Теорема. Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$ - замкнуто, $\bar{x} \notin A$. Тогда $\exists \bar{y} \in A : \rho(\bar{x}, \bar{y}) = \rho(\bar{x}, A)$.

Доказательство.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \bar{y}_\varepsilon \in A : \rho(\bar{x}, \bar{y}_\varepsilon) < \rho(\bar{x}, A) + \varepsilon$$

Возьмем

$$\forall m \in \mathbb{N} \exists \bar{y}_m : \rho(\bar{x}, \bar{y}_m) < \rho(\bar{x}, A) + \frac{1}{m} \Rightarrow \{\bar{y}_m\} - \text{ограничено}$$

Значит

$$\exists \{\bar{y}_{m_k}\}_{k=1}^\infty : \bar{y}_{m_k} \rightarrow \bar{y}, \rho(\bar{x}, \bar{y}_{m_k}) < \rho(\bar{x}, A) + \frac{1}{m_k}$$

после предельного перехода получим:

$$\rho(\bar{x}, \bar{y}) \leq \rho(\bar{x}, A), \rho(\bar{x}, \bar{y}) \geq \rho(\bar{x}, A) \Rightarrow \rho(\bar{x}, \bar{y}) = \rho(\bar{x}, A)$$

□

Определение. Множество $A \subset \mathbb{R}^n$ называется линейно связным, если любые две его точки можно соединить кривой, то есть

$$\forall x, y \in A \exists \bar{\gamma} : [0, 1] \rightarrow A : \bar{\gamma}(0) = x, \bar{\gamma}(1) = y$$

Теорема. Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$ - линейно связное, $B \subset \mathbb{R}^n$, $A \cap B \neq \emptyset$, $A \cap (\mathbb{R}^n \setminus B) \neq \emptyset$. Тогда $A \cap \partial B \neq \emptyset$.

Доказательство. Пусть $x_1 \in A \cap B$, $x_2 \in A \cap (\mathbb{R}^n \setminus B)$, $\bar{\gamma}(t) \subset A$, $t \in [0, 1]$, $\bar{\gamma}(0) = x_1$, $\bar{\gamma}(1) = x_2$. Пусть

$$\tau = \sup_{\bar{\gamma}(t) \in B} \{t\} \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists t_\varepsilon \in (\tau - \varepsilon, \tau), \bar{\gamma}(t_\varepsilon) \in B$$

Тогда при $t > \tau$ получим

$$\bar{\gamma}(t) \in \mathbb{R}^n \subset B \Rightarrow \bar{\gamma}(\tau) \in \partial B$$

□

Определение. Открытое линейно связное множество называется областью. Замыкание области называют замкнутой областью. Область часто будем обозначать Ω .

6.3 Функции нескольких переменных и их предел

Будут рассматриваться функции $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(\bar{x}) = f(x_1, \dots, x_n)$

Определение. Множество $\{\bar{x} : f(\bar{x}) = C, C = \text{const}\}$ называется множеством (линией) уровня C .

Определение. (Предел по Гейне)

Пусть $\forall \{\bar{x}_k\}_{k=1}^\infty \subset D(f)$, $\bar{x}_k \rightarrow \bar{x}_0$, $\bar{x}_k \neq \bar{x}_0$. Тогда существует предел

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(\bar{x}_k) = A$$

и A называется пределом функции f в точке \bar{x}_0 .

Определение. (Предел по Коши)

Если $\exists A \in \mathbb{R}$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall \bar{x} \in \mathring{B}_{\delta_\varepsilon}(\bar{x}_0) \cap D(f) : |f(\bar{x}) - A| < \varepsilon$$

то существует предел

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(\bar{x}) = A$$

Теорема. Эти определения эквивалентны

Доказательство. Без доказательства. □

Замечание. Свойства, доказанные для пределов в первом семестре, остаются верными для функций многих переменных и доказываются аналогично.

Определение. Пусть $\bar{x}_0 \in D'(f)$. Рассмотрим кривую $\bar{\gamma}(t)$, определенную в окрестности $B(t_0)$, $\bar{\gamma}(t_0) = \bar{x}_0$. Тогда если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall t \in \mathring{B}(t_0) : |f(\bar{\gamma}) - A| < \varepsilon$$

то существует предел

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0, \bar{x} \in \bar{\gamma}(t)} f(\bar{x}) = A$$

и он называется пределом $f(\bar{x})$ вдоль кривой $\bar{\gamma}$.

Определение. Если существует последовательность пределов

$$\lim_{x_{i_1} \rightarrow x_{0_1}} \left(\lim_{x_{i_2} \rightarrow x_{0_2}} \left(\dots \left(\lim_{x_{i_{n-1}} \rightarrow x_{0_{n-1}}} \left(\lim_{x_{i_n} \rightarrow x_{0_n}} f(x_1, \dots, x_n) \right) \right) \dots \right) \right) = A$$

то A называется повторным пределом.

Пример.

$$f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x}, & x, y \neq 0 \\ 0, & (x, y) = 0 \end{cases}$$

На всех осях нет повторного предела.

Теорема. Если существует предел

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(\bar{x})$$

и существует предел

$$g(x_{i_n}) = \lim_{x_{i_1} \rightarrow x_{0_1}} \left(\lim_{x_{i_2} \rightarrow x_{0_2}} \left(\dots \left(\lim_{x_{i_{n-1}} \rightarrow x_{0_{n-1}}} \right) \dots \right) \right)$$

то существует предел

$$\lim_{x_{i_n} \rightarrow x_{0_n}} g(x_{i_n}) = A$$

Доказательство.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall \bar{x} \in \overset{\circ}{B}_\delta(\bar{x}_0) : |f(\bar{x}) - A| < \varepsilon$$

Далее устремляем $x_{i_{n-1}} \rightarrow x_{0_{n-1}}, \dots, x_{i_1} \rightarrow x_{0_1}$ и после предельного перехода получаем:

$$|g(x_{i_n}) - A| \leq \varepsilon$$

□

6.4 Непрерывные функции нескольких переменных

Определение. Если $\bar{x}_0 \in D(f)$, $\bar{x}_0 \in D'(f)$ и существует предел

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(\bar{x}) = f(\bar{x}_0)$$

то $f(\bar{x})$ называется непрерывной в точке \bar{x}_0 .

Замечание. В изолированных точках считаем функцию непрерывной по определению.

Замечание. Локальные свойства непрерывных функций, доказанные в первом семестре, остаются верными для функций многих переменных и доказываются аналогично.

Теорема. Пусть $f(\bar{x})$ непрерывна в точке \bar{x}_0 . Отображение

$$\bar{x}(t) = (x_1(t_1, \dots, t_k), \dots, x_n(t_1, \dots, t_k))$$

непрерывно в точке \bar{t}_0 . Тогда $f(\bar{x}(\bar{t}))$ непрерывно в точке \bar{t}_0 .

Доказательство.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall \bar{x} \in B_\delta(\bar{x}_0) : |f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0)| < \varepsilon$$

$$\exists \delta_1 > 0 : \Pi_{(x_{0_1}-\delta, x_{0_1}+\delta)} \subset B_\delta(\bar{x}_0)$$

$$\exists \delta_2 > 0 : \forall i = 1, \dots, n : |x_i(\bar{t}) - x_{0_i}| < \delta_1, \text{ при } \rho(\bar{t}, \bar{t}_0) < \delta_2$$

значит

$$|f(\bar{x}(\bar{t})) - f(\bar{x}(\bar{t}_0))| < \varepsilon$$

□

Теорема. (Теорема Вейерштрасса)

Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$ - компакт, $f(\bar{x}) \in \mathcal{C}(A)$. Тогда $f(\bar{x})$ ограничена на A и достигает максимума и минимума.

Доказательство. Пусть $f(\bar{x})$ неограничена, тогда $\forall n \in \mathbb{N} : \exists \bar{x}_n \in A$.
 $|f(\bar{x}_n)| > n$, но существует сходящаяся подпоследовательность

$$\{\bar{x}_{n_k}\} : \bar{x}_{n_k} \rightarrow \bar{x} \in A$$

Но тогда

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(\bar{x}_{n_k}) = f(\bar{x})$$

значит функция ограничена. Далее пусть

$$\alpha = \sup_{\bar{x} \in A} f(\bar{x}) \Rightarrow \forall m \in \mathbb{N} \exists \bar{x}_m : f(\bar{x}_m) > \alpha - \frac{1}{m}$$

Существует сходящаяся подпоследовательность

$$\{\bar{x}_{m_k}\}_{k=1}^\infty : \bar{x}_{m_k} \rightarrow \bar{x}_0 \Rightarrow f(\bar{x}_0) \geq \alpha$$

$$\text{но } f(\bar{x}_0) \leq \alpha \Rightarrow \alpha = f(\bar{x}_0)$$

□

Теорема. Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$ - линейно связное множество, $f(\bar{x}) \in \mathcal{C}(A)$,

$$\forall \bar{x}_1, \bar{x}_2 \in A : f(\bar{x}_1) = \alpha, f(\bar{x}_2) = \beta, \alpha < \beta$$

Тогда

$$\forall \gamma \in (\alpha, \beta) \exists \bar{c} \in A : f(\bar{c}) = \gamma$$

Доказательство. Рассмотрим $\bar{\gamma}(t) \subset A$, $\bar{\gamma}(0) = \bar{x}_1$, $\bar{\gamma}(1) = \bar{x}_2$. Тогда по теореме о промежуточном значении $f(\bar{\gamma}(t))$ принимает при некотором $t' \in [0, 1]$ значение $f(\bar{\gamma}(t')) = \gamma$.

□

Определение. Пусть $f(\bar{x})$ определена на $A \subset \mathbb{R}^n$ и

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall \bar{x}_1, \bar{x}_2, \rho(\bar{x}_1, \bar{x}_2) < \delta : |f(\bar{x}_1) - f(\bar{x}_2)| < \varepsilon$$

тогда $f(\bar{x})$ называется равномерно непрерывной на A .

Теорема. (Теорема Кантора)

Пусть A - компакт, $f(\bar{x}) \in \mathcal{C}(A)$, то $f(\bar{x})$ равномерно непрерывна на A .

Доказательство. От противного

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0 \exists \bar{x}_1, \bar{x}_2, \rho(\bar{x}_1, \bar{x}_2) < \delta : |f(\bar{x}_1) - f(\bar{x}_2)| \geq \varepsilon_0$$

$$\forall m \in \mathbb{N} \exists \bar{x}_{1\frac{1}{m}}, \bar{x}_{2\frac{1}{m}}, \rho(\bar{x}_{1\frac{1}{m}}, \bar{x}_{2\frac{1}{m}}) < \frac{1}{m} : |f(\bar{x}_{1\frac{1}{m}}) - f(\bar{x}_{2\frac{1}{m}})| \geq \varepsilon_0$$

поскольку A компакт, то последовательность ограничена и существует сходящаяся подпоследовательность:

$$\{\bar{x}_{i\frac{1}{m_k}}\} : \bar{x}_{i\frac{1}{m_k}} \rightarrow \bar{x}_0$$

$$\rho(\bar{x}_0, \bar{x}_{2\frac{1}{m_k}}) \leq \rho(\bar{x}_0, \bar{x}_{1\frac{1}{m_k}}) + \rho(\bar{x}_{1\frac{1}{m_k}}, \bar{x}_{2\frac{1}{m_k}}) < \varepsilon + \frac{1}{m_k}$$

значит

$$\bar{x}_{2\frac{1}{m_k}} \rightarrow \bar{x}_0$$

поскольку $f(\bar{x}) \in \mathcal{C}(A)$, то

$$\lim f(\bar{x}_{1\frac{1}{m_k}}) = f(\bar{x}_0), \lim f(\bar{x}_{2\frac{1}{m_k}}) = f(\bar{x}_0)$$

противоречие. □

6.5 Дифференциальное исчисление функций многих переменных

Определение. Пусть $f(\bar{x})$ определена в $B(\bar{x}_0)$. Если существует предел

$$f'_{x_i}(\bar{x}_0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}_0) = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{f(x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0i} + \Delta x_i, \dots, x_{0n}) - f(\bar{x}_0)}{\Delta x_i}$$

то он называется частной производной функции по i -й переменной.

Определение. Если у функции $f(\bar{x}) \exists f'_{x_i}(\bar{x})$ в некоторой $B(\bar{x}_0)$ и существует $(f'_{x_i}(\bar{x}))'_{x_j}$, то она называется частной производной. Если $\bar{x}_i \neq \bar{x}_j$, то она называется смешанной производной, если $\bar{x}_i = \bar{x}_j$, то она называется повторной производной.

$$(f'_{x_i}(\bar{x}))'_{x_i} = f''_{x_i x_i}(\bar{x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}, (f'_{x_i}(\bar{x}))'_{x_j} = f''_{x_i x_j}(\bar{x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

Замечание. Аналогично определяется частная производная любого порядка.

Определение. Пусть $f(\bar{x})$ определена в $B(\bar{x}_0)$. Если существует набор $\{A_i\}_{i=1}^n$ такой, что

$$f(\bar{x} + \Delta\bar{x}) - f(\bar{x}) = \sum_{i=1}^n A_i \Delta x_i + \bar{o}(\rho(\bar{x}, \bar{x}_0))$$

то $f(\bar{x})$ называется дифференцируемой в точке \bar{x}_0 . Главная линейная часть приращения

$$df = \sum_{i=1}^n A_i \Delta x_i$$

называется первым дифференциалом функции $f(\bar{x})$.

Теорема. Если $f(\bar{x})$ дифференцируема в точке \bar{x}_0 , то $f(\bar{x})$ непрерывна в точке \bar{x}_0 .

Доказательство.

$$\begin{aligned} |f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0)| &= \left| \sum_{i=1}^n A_i \Delta x_i + \bar{o}(\rho) \right| \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n |A_i| \cdot |\Delta x_i| + |\bar{o}(\rho)| \leq \varepsilon \cdot \sum_{i=1}^n |A_i| + \varepsilon \end{aligned}$$

□

Теорема. Если $f(\bar{x})$ дифференцируема в точке \bar{x}_0 , то в точке \bar{x}_0 :

$$\forall i = 1, \dots, n \exists \frac{\partial f}{\partial x_i} = A_i$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{f(x_{01}, \dots, x_{0i} + \Delta x_i, \dots, x_{0n}) - f(\bar{x}_0)}{\Delta x_i} &= \\ &= \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{A_i \Delta x_i + \bar{o}(|\Delta x_i|)}{\Delta x_i} = A_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}_0) \end{aligned}$$

Если $f(\bar{x}) = x_i$, то $f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0) = \Delta x_i = df = dx_i$ отсюда

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}_0) dx_i$$

□

Теорема. (Достаточное условие дифференцируемости)

Пусть $\forall i = 1, \dots, n$ в некоторой $B(\bar{x}_0)$ существуют $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ и они непрерывны в $B(\bar{x}_0)$. Тогда $f(\bar{x})$ дифференцируема в точке \bar{x}_0 .

Доказательство. Докажем в \mathbb{R}^2 .

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) &= \\ &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = (1) \\ &= f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) \Delta x + f'_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y = (2) + (3) \\ &= f'_x(x_0, y_0) \Delta x + f'_y(x_0, y_0) \Delta y + \bar{o}(1) \Delta x + \bar{o}(1) \Delta y = (4) \\ &= f'_x(x_0, y_0) \Delta x + f'_y(x_0, y_0) \Delta y + \bar{o}(\rho) \end{aligned}$$

(1): По теореме Лагранжа

(2):

$$f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) = f'_x(x_0, y_0) + \bar{o}(1), \quad \rho \rightarrow 0$$

(3):

$$f'_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) = f'_y(x_0, y_0) + \bar{o}(1), \quad \rho \rightarrow 0$$

(4):

$$\frac{\bar{o}(1) \Delta x + \bar{o}(1) \Delta y}{\rho} = \bar{o}(1)$$

□

Замечание. Аналогичное доказательство можно проверить для \mathbb{R}^n .

Определение. Пусть $f(\bar{x})$ определена в $B(\bar{x}_0)$. Обозначим $y_0 = f(\bar{x}_0)$, плоскость

$$y - y_0 = \sum_{i=1}^n A_i \Delta x_i$$

называется касательной к графику $y = f(\bar{x})$ в точке \bar{x}_0 , если для любой прямой, проходящей через точки $(\bar{x}_0, f(\bar{x}_0))$ и $(\bar{x}, f(\bar{x}))$ ее угол с нормалью к плоскости стремится к $\frac{\pi}{2}$ при $\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0$.

Теорема. (Геометрический смысл дифференциала и уравнение касательной)

Если $f(\bar{x})$ дифференцируема в точке \bar{x}_0 , то

$$y - y_0 = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}_0)(x_i - x_{0i})$$

Доказательство. Пусть $X_i = x_{01} + (x_i - x_{0i})t$,
 $Y = f(\bar{x}_0) + (f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0))t$, $t \in [0, 1]$

$$\cos \alpha = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_i - x_{0i}) - (f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0))}{\sqrt{1 + \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2} \cdot \sqrt{(f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0))^2 + \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i0})^2}} \leq \frac{|\bar{o}(\rho)|}{c\rho} \rightarrow 0$$

Значит $\alpha \rightarrow \frac{\pi}{2}$. □

Теорема. (Дифференциал сложной функции и инвариантность формы первого дифференциала)

Пусть $f(\bar{x})$ дифференцируема в $\Omega \in \mathbb{R}^n$, $\bar{x}(t) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\bar{x}(t)$ дифференцируемы в $\Omega_1 \in \mathbb{R}^n$ и $\forall \bar{t} \in \Omega_1 : \bar{x}(\bar{t}) \in \Omega$. Тогда $f(\bar{t})$ дифференцируема в Ω .

Доказательство. $\forall \bar{x}_0 \in \Omega$:

$$f(\bar{x} + \Delta \bar{x}) - f(\bar{x}_0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_i - x_{0i}) + \bar{o} \left(\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - x_{0i})^2} \right)$$

$$\begin{aligned} f(\bar{x}(t + \Delta t)) - f(\bar{x}(\bar{t}_0)) &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_i(\bar{t}) - x_i(\bar{t}_0)) + \bar{o} \left(\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i(\bar{t}) - x_i(\bar{t}_0))^2} \right) = \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \left(\sum_{j=1}^k \frac{\partial x_i}{\partial t_j}(t_j - t_{0j}) + \bar{o}(\rho) \right) + \bar{o} \left(\sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^k \frac{\partial x_i}{\partial t_j}(t_j - t_{0j}) + \bar{o}(\rho) \right)^2} \right) = \\ &= \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial t_j}(t_j - t_{0j}) + \bar{o}(\rho) + \bar{o}(O(\rho)) = \sum_{j=1}^k \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial t_j}(t_j - t_{0j}) \right) + \bar{o}(\rho). \end{aligned}$$

□

Теорема. Пусть $f(\bar{x}) \in \mathcal{C}^2(\Omega)$. Тогда $\forall i, j$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

Доказательство. Пусть $\Delta f(x) = f(x + \Delta x) - f(x)$. Докажем в \mathbb{R}^2

$$\begin{aligned} \Delta_x(\Delta_y f(x, y)) &= \Delta_x(f(x, y + \Delta y) - f(x, y)) = \\ &= f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x + \Delta x, y) - f(x, y + \Delta y) + f(x, y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_y(\Delta_x f(x, y)) &= \Delta_y(f(x + \Delta x, y) - f(x, y)) = \\ &= f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y) - f(x + \Delta x, y) + f(x, y)\end{aligned}$$

Значит

$$\Delta_x(\Delta_y f(x, y)) = \Delta_y(\Delta_x f(x, y))$$

$$\begin{aligned}\Delta_x(\Delta_y f(x, y)) &= \Delta_x(f(x, y + \Delta y) - f(x, y)) = \\ &= \Delta_x(f'_y(x, y + \Delta y)\Delta y) = f''_{yx}(x + \theta_1\Delta x, y + \theta_2\Delta y)\Delta y\Delta x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_y(\Delta_x f(x, y)) &= \Delta_y(f(x + \Delta x, y) - f(x, y)) = \\ &= \Delta_y(f'_x(x + \Delta x, y)\Delta x) = f''_{xy}(x + \theta_3\Delta x, y + \theta_4\Delta y)\Delta x\Delta y\end{aligned}$$

Устремив $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \rightarrow 0$, получим

$$f''_{xy}(x, y) = f''_{yx}(x, y)$$

□

Определение. Пусть

$$\bar{l} = \begin{pmatrix} \cos \alpha_1 & \cos \alpha_2 & \dots & \cos \alpha_n \end{pmatrix}, \quad \sum_{i=1}^n \cos^2 \alpha_i = 1$$

Предел

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{l}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta t \cdot \cos \alpha_1, \dots, x_n + \Delta t \cdot \cos \alpha_n) - f(\bar{x})}{\Delta t}$$

называется производной по направлению \bar{l} .

Теорема. Если $f(\bar{x})$ дифференцируема в $B(\bar{x}_0)$, то

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{l}}(x_0) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \cos \alpha_i \right)$$

Доказательство.

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta t \cdot \cos \alpha_1, \dots, x_n + \Delta t \cdot \cos \alpha_n) - f(\bar{x})}{\Delta t} &= \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \Delta t \cdot \cos \alpha_i \right) + \bar{o} \left(\sqrt{\sum_{i=1}^n \Delta t^2 \cdot \cos^2 \alpha_i} \right)}{\Delta t} = \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \cos \alpha_i \right)\end{aligned}$$

□

Определение. Ковектор

$$\text{grad } f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \dots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

называется градиентом функции $f(\bar{x})$.

Теорема. Производная функции $f(\bar{x})$ по направлению $\text{grad } f$ имеет максимальное по модулю значение по сравнению со всеми остальными производными по направлению.

Доказательство. Для любого направления \bar{l} :

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial f}{\partial \bar{l}} \right| &= \left| \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \cos \alpha_i \right) \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2} \cdot 1 \\ \left| \frac{\partial f}{\partial(\text{grad } f)} \right| &= \left| \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \frac{\frac{\partial f}{\partial x_i}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2}} \right| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2} \end{aligned}$$

Отсюда

$$\left| \frac{\partial f}{\partial(\text{grad } f)} \right| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2} \geq \left| \frac{\partial f}{\partial \bar{l}} \right|$$

□

Определение. Пусть $f(\bar{x}) \in \mathcal{C}^2(\Omega)$.

$$\delta \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \delta x_j \right) \Delta x_i$$

Соответствующая квадратичная форма

$$d^2 f = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j$$

называется вторым дифференциалом функции f . Если $f \in \mathcal{C}^k(\Omega)$, то последовательно определяются дифференциалы до k порядка.

Теорема. (Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа)

Пусть $f(\bar{x}) \in \mathcal{C}^k(B(\bar{x}_0))$. Тогда $\forall \bar{x} \in B(\bar{x}_0) \exists \theta \in [0, 1]$ такое, что

$$f(\bar{x}) = \sum_{m=0}^{k-1} \frac{1}{m!} \cdot d^m f(\bar{x}_0) + \frac{1}{k!} \cdot d^k f(x_0 + \theta(\bar{x} - \bar{x}_0))$$

Доказательство. Пусть

$$X_1 = x_{01} + (x_1 - x_{01})t, \dots, X_n = x_{0n} + (x_n - x_{0n})t, \quad t \in [0, 1]$$

$$F(t) = f(X_1(t), \dots, X_n(t))$$

$$\begin{aligned} f(\bar{x}) = F(1) &= \sum_{m=0}^{k-1} \frac{1}{m!} \cdot F^{(m)}(0) \cdot (1 - 0) + \frac{1}{k!} \cdot F^{(k)}(\theta)(1 - 0) = \\ &= \sum_{m=0}^{k-1} \frac{1}{m!} \sum_{i_1, \dots, i_m=1}^n \frac{\partial^m f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_m}} \cdot \prod_{j=1}^m (x_{i_j} - x_{0i_j}) + \\ &\quad + \frac{1}{k!} \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^n \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}} (\bar{x}_0 + \theta(\bar{x} - \bar{x}_0)) \prod_{j=1}^k (x_{i_j} - x_{0i_j}) \end{aligned}$$

□

Лемма. ¹

$$F^{(m)}(0) = \sum_{i_1, \dots, i_m=1}^n \frac{\partial^m f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_m}} (\bar{x}_0) \cdot \prod_{j=1}^m (x_{i_j} - x_{0i_j}) \quad (1)$$

$$F^{(k)}(\theta) = \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^n \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}} ((\bar{x}_0) + \theta(\bar{x}_1 - \bar{x}_0)) \cdot \prod_{j=1}^k (x_{i_j} - x_{0i_j}) \quad (2)$$

Доказательство. Индукция по m . База при $m = 1$:

$$F'(t) = (f(X_1(t), \dots, X_n(t)))'_t = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial t} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} (\bar{x}_0 + t(\bar{x}_1 - \bar{x}_0)) (x_i - x_{0i})$$

Пусть для m верно. Тогда

$$\begin{aligned} F^{(m+1)}(t) &= (F^{(m)}(t))'_t = \\ &= \left(\sum_{i_1, \dots, i_m=1}^n \frac{\partial^m f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_m}} (\bar{x}_0 + t(\bar{x}_1 - \bar{x}_0)) \cdot \prod_{j=1}^m (x_{i_j} - x_{0i_j}) \right)'_t = \\ &= \sum_{i_1, \dots, i_m=1}^n \left(\frac{\partial^m f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_m}} (\bar{x}_0 + t(\bar{x}_1 - \bar{x}_0)) \right)'_t \cdot \prod_{j=1}^m (x_{i_j} - x_{0i_j}) = \\ &= \sum_{i_1, \dots, i_m=1}^n \left(\frac{\partial^{(m+1)} f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_m} \partial x_{i_{m+1}}} (\bar{x}_0 + t(\bar{x}_1 - \bar{x}_0)) \cdot (x_{i_{m+1}} - x_{0i_{m+1}}) \right) \cdot \prod_{j=1}^m (x_{i_j} - x_{0i_j}) = \\ &= \sum_{i_1, \dots, i_{m+1}=1}^n \left(\frac{\partial^{(m+1)} f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_m} \partial x_{i_{m+1}}} (\bar{x}_0 + t(\bar{x}_1 - \bar{x}_0)) \right) \cdot \prod_{j=1}^{m+1} (x_{i_j} - x_{0i_j}) \end{aligned}$$

Отсюда, подставив нужные точки, получаем утверждения леммы. □

¹На лекции считалось очевидным