

インフルエンザ・コロナワクチン 受診票

インフル・コロナ自費ID

受診日		年	月	日	今日の体温		度	分			
ふりがな							年	生年月日			
接種者氏名								年	月	日	
保護者署名	接種者が15歳以下の場合							6か月以上2歳(3歳未満)さい(か月)			
住所	〒						年齢	3歳以上			歳
電話番号	- - (※必ず連絡がとれる番号をご記入ください)										
希望のワクチン	皮下注射	0.25ml ☐ 生後6か月～2歳 ☐ 3歳以上 ※6か月～12歳(13歳未満)の方は2回接種(2～4週間あける)				経鼻ワクチン	0.2ml ☐ フルミスト 2歳～18歳 ※シーズン1回投与				
	筋肉注射	ファイザー ☐ 12歳以上 モデルナ ☐ 6か月～11歳 ☐ 12歳以上 Meijiseikaファルマ ☐ 18歳以上				第一三共 ☐ 5～11歳未満 ☐ 12歳以上	武田 ☐ 6歳以上				

裏面の禁忌事項・注意事項をよくお読みいただき、下記質問にチェックをお願いします。

- ① 過去に今回接種するワクチン接種で、重度のアレルギー反応やアナフィラキシーを起こしたことがある方
※ インフルエンザワクチンは製造に鶏卵を使用するため、重度の卵アレルギーの方は接種できません
- ② 明らかに発熱(通常37.5℃以上)がある方や体調の悪い方、重篤な急性疾患にかかっている方

ある	ない
☐ 禁忌	☐ 接種可
はい	いいえ
☐ 禁忌	☐ 接種可

女性の方は、妊娠・妊娠の可能性・授乳している方も接種可能です。不安な方は、産婦人科で確認をしてください

カルテ No.

経過および処置

【実施場所】	インフルエンザ ワクチン LOT NO.	コロナワクチン LOT NO.
新横浜整形外科リウマチ科	HAワクチン 皮下注射 0.25ml ☐	ファイザー(12歳以上) コミナティ筋注 0.3ml ☐
横浜市港区新横浜3丁目6-4	HAワクチン 皮下注射 0.5ml ☐	モデルナ(6か月～11歳)スパイクバックス筋注 0.25ml ☐
新横浜千歳観光ビル 1-4階	フルミスト点鼻薬	モデルナ(12歳以上)エムネクスバックス筋注 0.2ml ☐
医師名	鼻腔内噴霧 0.2ml ☐	Meijiseikaファルマ(18歳以上)コスタイベ筋注 0.5ml ☐
		第一三共(5-11歳) 0.2m/(12歳以上)ダイチロナ筋注 0.6ml ☐
		武田(6歳以上)ヌバキソビット筋注 0.5ml ☐

切り取り線

ファイザー ☐ 12歳以上 ☐ 18歳以上 ☐ 武田 ☐ 6歳以上

モデルナ ☐ 6か月～11歳 ☐ 第一三共 ☐ 5～11歳未満 ☐ 12歳以上

コロナワクチン

インフルエンザワクチン接種券
フルミスト
経鼻ワクチン

インフルエンザワクチン
6か月～2歳 3歳以上
皮下注射

接種記録
接種者氏名 年 月 日

インフル・コロナ自費ID
ふりがな
お名前



新横浜整形外科リウマチ科

【注意事項】

インフルエンザワクチン・コロナワクチンが接種出来ない方

- ① 発熱(37.5℃以上)や体調不良がある
- ② ワクチンの成分で重いアレルギーを起こしたことがある
※インフルエンザワクチンについて、重度の卵アレルギーがある方は、接種できません。
- ③ 過去の予防接種後に強い副反応があった
- ④ 心臓・腎臓・肝臓・血液・免疫などの病気がある
- ⑤ けいれんの既往がある
- ⑥ 抗凝固薬(血液を固まりにくくする薬)を服用している
- ⑦ その他、接種について心配なことがある
妊娠、その可能性がある方、授乳しているかたも接種可能です。不安な方は、産婦人科でご相談ください

【主な副反応】

呼吸困難、全身のじんましん、意識が遠のく、強い胸の痛みなどの症状が現れた場合は、速やかに医療機関へご相談ください。

＜インフルエンザワクチン＞

接種部位の赤み・腫れ・痛み

発熱、頭痛、悪寒、だるさ

まれに、アナフィラキシーなどの重いアレルギー反応

＜新型コロナワクチン＞

接種部位の痛み・腫れ

発熱、頭痛、疲労感

筋肉痛・関節痛、悪寒など

まれに、アナフィラキシー

mRNAワクチンでは、まれに心筋炎・心膜炎

【接種後】

接種後は15～30分程度、院内で体調の変化がないか確認してください。