

# 留数定理と Fourier 級数

**Theorem.**  $z \in \mathbb{C}$  とする. 有理関数  $R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$  が,  $\deg P \leq \deg Q - 2, Q(m) \neq 0 (m \in \mathbb{Z})$  をみたし,  $\xi$  を  $R(z)$  の極とすると

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} R(n)e^{int} = - \sum_{\xi} \operatorname{Res} \left( R(z) \cdot \frac{2\pi i}{e^{2\pi iz} - 1}; \xi \right) \quad (0 \leq t < 2\pi)$$

が成り立つ.

**Proof.** 積分路  $\Gamma_m (m \in \mathbb{N})$  を

$$\Gamma_m = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid |\operatorname{Re} z| = m + \frac{1}{2}, |\operatorname{Im} z| = m + \frac{1}{2} \right\}$$

とする.  $s(z) = \frac{2\pi i}{e^{2\pi iz} - 1}$  とすると,  $z = k \in \mathbb{Z}$  は 1 位の極で留数 1 をもつ. また,  $\Gamma_m$  が  $R$  の極をすべて含むようにとると, 留数定理より

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_m} R(z)s(z)e^{izt} dz = \sum_{n=-m}^m R(n)e^{int} + \sum_{\xi} \operatorname{Res} (R(z)s(z)e^{izt}; \xi)$$

が成り立つ. ここで

$$|R(z)| \leq \frac{C}{m^2}, |s(z)e^{izt}| \leq 2\pi e^{\pi} \quad (z \in \Gamma_m)$$

となるから,  $\Gamma_m$  の周長が  $4(2m+1)$  であることを踏まえると左辺の積分は  $m^{-1}$  の定数倍で上から評価され,  $m \rightarrow \infty$  のとき 0 に近づく. よって

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} R(n)e^{int} + \sum_{\xi} \operatorname{Res} (R(z)s(z)e^{izt}; \xi) = 0$$

となる.

以上により, 定理が示された. ■