

103-182

問題文

(処方)

ドネペジル塩酸塩錠 5mg 1回1錠 (1日1錠)
1日1回 朝食後 28日分

1. ドネペジル塩酸塩の増量
2. リバスチグミンの併用
3. ガランタミン臭化水素酸塩の併用
4. メマンチン塩酸塩の併用
5. メチルフェニデート塩酸塩の併用

解答

1, 4

解説

選択肢 1 は、正しい記述です。

ドネペジルは、まず副作用回避の目的で 3mg から投与しますが、その後 5mg に増加し、さらに 10mg まで増量できます。最近悪化している傾向が見られるため 妥当な方針といえます。

選択肢 2,3 ですが

リバスチグミンは、商品名イクセロンパッチのことです。ガランタミンは、レミニールのことです。共に、ドネペジルと同じ機序である AchE 阻害剤です。AchE阻害剤は、併用では用いられません。よって、選択肢 2,3 は誤りです。

選択肢 4 は、正しい記述です。

メマンチン（メマリー）は、NMDA 受容体遮断薬です。中等度から高度 アルツハイマー型認知症の適用をもつ薬剤です。ドネペジルと併用が可能です。

選択肢 5 ですが

メチルフェニデート（リタリン、コンサータ）は、ナルコレプシー（病的眠気）や注意欠陥／多動性障害（ADHD）に用いられる薬です。

以上より、正解は 1,4 です。

類題