

105-282

問題文

5コース目の投与中に、患者から、刺入部に耐え難い焼かれるような痛みを感じ、赤く腫れているとの訴えがあり、ドキシル[®]注の血管外漏出が疑われた。本剤の血管外漏出の対処法として、適切なのはどれか。2つ選べ。

1. 患部を温める。
2. すぐに留置針を抜く。
3. 患部を生理食塩液でフラッシュする。
4. デクスラゾキシサンを静脈内投与する。
5. 漏出部周囲から薬液や血液を吸引・除去する。

解答

問282：4, 5問283：4, 5

解説

問282

選択肢 1 ですが

卵由来の成分は含まれていません。ドキシルで注意しなければいけないのは「大豆」アレルギーです。大豆由来の成分が含まれています。よって、選択肢 1 は誤りです。

選択肢 2 ですが

能動的ターゲティングとは、抗体などを用いることで積極的に標的部位に薬物を送達させるような技術の総称です。リポソーム修飾によるターゲティングは「受動的」です。よって、選択肢 2 は誤りです。ちなみに、ステルス機能、すなわち、細網内皮系による捕捉を効率よく免れる という記述は妥当です。

選択肢 3 ですが

リポソーム製剤なので、食塩水による希釈は白濁、沈殿の恐れがあると考えられます。5% ブドウ糖注射液で希釈します。よって、選択肢 3 は誤りです。

選択肢 4,5 は妥当な記述です。

以上より、正解は 4,5 です。

問283

血管外漏出が疑われた際は、慌てず薬剤の滴下中止

→ 血液吸引、残存薬剤除去の後抜針

→壊死性抗癌剤や炎症性抗癌剤が漏出した場合、ステロイド及びリドカインを注射

→外用処置としては患部にステロイド軟膏を塗布し冷湿布

といった処置を行います。

以上より、正解は 4,5 です。