

# 101-160

## 問題文

消化器系に作用する薬物の副作用に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

1. ピレンゼピンは、アセチルコリンM<sub>2</sub> 受容体を選択的に遮断し、心悸亢進を引き起こす。
2. ミソプロストールは、プロスタノイドEP受容体を遮断し、子宮収縮を引き起こす。
3. メトクロプラミドは、ドパミンD<sub>2</sub> 受容体を遮断し、乳汁漏出を引き起こす。
4. プチルスコプラミンは、アセチルコリンM<sub>3</sub> 受容体を遮断し、口渴を引き起こす。
5. メペンゾラートは、アセチルコリンM<sub>3</sub> 受容体を遮断し、頻尿を引き起こす。

---

## 解答

3, 4

## 解説

選択肢 1 ですが

ピレンゼピンは、M<sub>1</sub> 受容体選択的遮断薬です。M<sub>2</sub> 受容体では、ありません。副作用はそれほど知られていない薬です。よって、選択肢 1 は誤りです。

選択肢 2 ですが

ミソプロストールは、PG (prostaglandin) の誘導体です。EP 受容体のアゴニストとして働きます。受容体を遮断するわけでは、ありません。子宮収縮を引き起こす、という点は正しい記述です。よって、選択肢 2 は誤りです。

選択肢 3,4 は、正しい選択肢です。

選択肢 5 ですが

メペンゾラートは、抗コリン薬です。抗コリン薬は、頻尿治療薬に用いられます。つまり、尿量抑制方向に作用します。頻尿を引き起こすわけでは、ありません。よって、選択肢 5 は誤りです。

以上より、正解は 3,4 です。