103-337

問題文

サリドマイドを服用する患者への説明として、適切なのはどれか。2つ選べ。

- 1. 紛失した場合は、処方医又は調剤した薬剤師に連絡してください。
- 2. 服用の必要がなくなった場合は、残った薬を速やかに破棄してください。
- 3. (男性の場合)服用中でも避妊する必要はありません。
- 4. (女性の場合)服用開始4週間前から服用終了4週間後まで必ず避妊してください。
- 5. 服用中でも授乳してかまいません。

解答

1, 4

解説

サリドマイドは、 いったん医薬品市場から撤退したのですが、 らい性結節性紅斑や多発性骨髄腫への 有効性が認められ、 厳格な安全管理のもとで の使用を条件に 現在も用いられています。

選択肢1は、正しい記述です。

安全管理手順によれば、 患者が紛失した場合、薬剤師等へ 報告することが定められて います。

選択肢 2 ですが

不要薬が発生した場合、 調剤元の医療機関へと返却します。 患者自身に破棄してもらうわけでは ありません。 よって、選択肢 2 は誤りです。

選択肢 3 ですが

サリドマイドは、精液移行性があります。 よって、選択肢 3 は誤りです。

選択肢 4 は、正しい記述です。

選択肢 5 ですが

乳汁中への移行が報告されており、 投与終了4週間まで授乳を避けます。 よって、選択肢5は誤りです。

以上より、正解は 1.4 です。