

# 103-337

## 問題文

サリドマイドを服用する患者への説明として、適切なのはどれか。2つ選べ。

1. 紛失した場合は、処方医又は調剤した薬剤師に連絡してください。
2. 服用の必要がなくなった場合は、残った薬を速やかに破棄してください。
3. (男性の場合)服用中에서도避妊する必要はありません。
4. (女性の場合)服用開始4週間前から服用終了4週間後まで必ず避妊してください。
5. 服用中에서도授乳してかまいません。

---

## 解答

1, 4

## 解説

サリドマイドは、いったん医薬品市場から撤退したのですが、らい性結節性紅斑や多発性骨髄腫への有効性が認められ、厳格な安全管理のもとでの使用を条件に現在も用いられています。

選択肢 1 は、正しい記述です。

安全管理手順によれば、患者が紛失した場合、薬剤師等へ報告することが定められています。

選択肢 2 ですが

不要薬が発生した場合、調剤元の医療機関へと返却します。患者自身に破棄してもらうわけでは ありません。 よって、選択肢 2 は誤りです。

選択肢 3 ですが

サリドマイドは、精液移行性があります。 よって、選択肢 3 は誤りです。

選択肢 4 は、正しい記述です。

選択肢 5 ですが

乳汁中への移行が報告されており、投与終了4週間まで授乳を避けます。 よって、選択肢 5 は誤りです。

以上より、正解は 1,4 です。