

# 102-270

## 問題文

3日前より尿が出にくいという症状が現れたため、泌尿器科を受診し、神経因性膀胱による排尿困難と診断された。本患者に適切でない薬剤はどれか。1つ選べ。

1. ウラビジル
2. タムスロシン塩酸塩
3. ナフトピジル
4. プラゾシン塩酸塩
5. ベタネコール塩化物

---

## 解答

問270 : 1, 5問271 : 5

## 解説

### 問270

レボドパは、ドパミンの前駆体です。BBB（Blood Brain Barrier：血液脳関門）非通過ですがアミノ酸トランスポーターによって脳内へ移行し代謝を受けてドパミンになり、中枢作用を示します。

ベンセラシドは、末梢におけるレボドパ代謝酵素の阻害薬です。

以上より、正解は 1,5 です。

### 問271

選択肢 1 ～ 4 は、全て  $\alpha$  遮断薬です。 $\alpha$  遮断で、膀胱括約筋が弛緩します。膀胱括約筋は収縮することで、尿が出ないようにします。つまり、蓄尿方向に作用します。従って弛緩すれば排尿方向に作用します。排尿困難に対して、適切な作用と考えられます。

選択肢 5 ですが

ベタネコールは、コリン作動薬です。パーキンソン病とは、ドパミン作動性神経とコリン作動性神経のバランスが崩れることで、筋固縮、振戦といった症状がおきる進行性の疾患です。

現在、症状が改善されているということから、バランスがちょうどよい状態と考えられます。ここでコリン作動薬を用いるとバランスが崩れるおそれがあります。よって、本患者には不適切であると考えられます。

以上より、正解は 5 です。