

104-113

問題文

1. デオキシウリジン5'-ーリン酸(dUMP)にS-アデノシルメチオニンからメチル基が供与されることで、デオキシチミジン5'-ーリン酸(dTMP)が生じる。
2. デオキシシチジン5'-三リン酸(dCTP)は、シチジン5'-二リン酸(CDP)のリボースの還元により生じるdCDPがリン酸化されて生成される。
3. 核酸分解により生じたりボース1-リン酸は、サルベージ経路により再利用される。
4. ピリミジンヌクレオチドの生合成に必要なカルバモイルリン酸は、尿素回路から供給される。
5. イノシン5'-ーリン酸(IMP)からのアデノシン5'-ーリン酸(AMP)の生成には、グアノシン5'-三リン酸(GTP)が利用される。

この問題は正しい選択肢が3つあるため、いずれか2つを選べば正解となりました。

解答

2, 3, 5

解説

※ 正解が 3 つあり、2 つ正解ならよい、とされた問題です。

選択肢 1 ですが

記述の反応におけるメチル基供与体は「5,10-メチレンテトラヒドロ葉酸」です。

(5,10-CH₂-THF と表されることがあります。THFが、テトラヒドロ葉酸です。葉酸が Folic acid です。)

選択肢 2 は妥当な記述です。

選択肢 3 は正解です。

選択肢 4 ですが

「ピリミジンヌクレオチド(環 1 つの方)」の生合成は、カルバモイルリン酸とアスパラギン酸を材料として、オロト酸が合成される反応から開始します。このカルバモイルリン酸は「グルタミン」を材料に作られます。尿素回路からの供給ではありません。ちなみに、尿素回路における律速段階が、カルバモイルリン酸合成の部分の反応です。よって、選択肢 4 は誤りです。

選択肢 5 は妥当な記述です。

以上より、正解は 2,3,5 です。

類題