

102-184

問題文

この患者の治療に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 痛風関節炎を繰り返す場合は血清尿酸値の目標を6.0mg/dL以下とする。
2. 血清クレアチニン値2.0mg/dL以上の腎機能障害を伴う場合はベンズプロマロンを選択する。
3. 尿路結石を合併する場合はベンズプロマロンを選択する。
4. 尿酸排泄促進薬を使用する場合は、尿アルカリ化薬を併用する。
5. 痛風関節炎の再発予防のため、少量の非ステロイド性抗炎症薬を継続投与する。

解答

1, 4

解説

選択肢 1 は、正しい記述です。

血清尿酸値 7.0 mg/dL 以上を高尿酸血症といいます。記述の通り、関節炎を繰り返す場合は目標を更に低く設定します。

選択肢 2,3 ですが

血清クレアチニン 2.0mg/dL 以上は、一般に中程度以上の腎不全と考えられます。本試験時点のガイドラインによれば、中程度以上の腎不全や尿路結石の既往、合併がある場合はアロプリノールを選択することが推奨されています。従って、選択肢 2,3 は誤りです。

選択肢 4 は、正しい記述です。

尿アルカリ薬を用いることで尿の酸性化を防ぎ、結石の生成を予防します。

選択肢 5 ですが

NSAID s ではなく、コルヒチンの予防投与が痛風関節炎の再発予防には用いられます。よって、選択肢 5 は誤りです。

以上より、正解は 1,4 です。