105-334

問題文

患者の状態を薬学的観点から判断するため、SOAP方式でこの患者の指導記録を作成した。その内容の組合せのうち、適切なのはどれか。1つ選べ。

	S	0	A	P
1	レスキュー薬服	モルヒネ錠 120 mg	モルヒネによる	ラメルテオンの
	用後、周りの景	モルヒネ液 20 mg	ラメルテオン代	減量又は中止を
	色がゆがむ	ラメルテオン錠8mg	謝阻害の可能性	提案する
2	レスキュー薬服	ラメルテオン錠8mg	腎機能低下によ	ラメルテオンの
	用後、周りの景	BUN 30 mg/dL、血清クレ	るラメルテオン	減量又は中止を
	色がゆがむ	アチニン値 1.5 mg/dL、浮	排泄遅延の可能	提案する
		腫 (2+)	性	
3	レスキュー薬服	モルヒネ錠 120 mg	肝機能低下によ	モルヒネ液の減
	用後、周りの景	モルヒネ液 20 mg	るモルヒネ代謝	量を提案する
	色がゆがむ	AST 35 IU/L, ALT 40 IU/L	遅延の可能性	
4	レスキュー薬服	モルヒネ錠 120 mg	腎機能低下によ	モルヒネ液の減
	用後、周りの景	モルヒネ液 20 mg	るモルヒネ代謝	量を提案する
	色がゆがむ	BUN 30 mg/dL、血清クレ	物排泄遅延の可	
		アチニン値 1.5 mg/dL、浮	能性	
		腫 (2+)		
5	レスキュー薬服	モルヒネ錠 120 mg	ラメルテオンに	モルヒネ液の減
	用後、周りの景	ラメルテオン錠8mg	よるモルヒネ代	量を提案する
	色がゆがむ		謝阻害の可能性	

解答

4

解説

疼痛時の薬を飲んだ後の副作用、BUN 高め、下肢の浮腫 から「腎機能低下に伴う、モルヒネ代謝物の影響」と考えられます。

すると O として記載すべきは「モルヒネについて、及び腎機能に関するデータ」です。「ラメルテオン」は不要なので、選択肢 1,2,5 は誤りです。

ちなみに、ラメルテオンは、メラトニン受容体に対して高い親和性を有するアゴニストで、睡眠覚醒サイクル を正常化して生理的な睡眠を誘導します。

また、肝機能についても不要と考えられるため、選択肢 3 は誤りです。

以上より、正解は4です。