100-86

問題文

ある薬剤を服用している患者から「足がむくむ」、「尿量が少なくなった」、「排尿時の尿の泡立ちが強い」 との訴えがあり、副作用を疑った。下記の中で最も可能性が高いのはどれか。1つ選べ。

- 1. 構紋筋融解症
- 2. 高血糖
- 3. 出血性膀胱炎
- 4. 腎性尿崩症
- 5. ネフローゼ症候群

解答

5

解説

足のむくみ、尿量の減少、尿の泡立ちが強い という症状は、ネフローゼ症候群の初期症状に 該当します。ちなみに他には、体がだるい、息苦しい、尿が赤い などの症状もネフローゼ症候群の初期症状 として知られています。

ある薬剤、ということですが、解熱鎮痛薬、抗リウマチ薬、抗生物質、インターフェロン製剤、降圧薬など多数の薬剤により引き起こされる場合があります。

以上より、正解は5です。

ちなみに、選択肢 1~4の代表的初期症状としては

横紋筋融解症

→筋肉痛、手足のしびれ、脱力、だるさ、赤褐色の尿 など。

高血糖

→多量の尿、口渇、体重減少、脱力感 など。

出血性膀胱炎

→尿が赤み帯びる、尿の回数が増える、排尿時に痛みがある など。

腎性尿崩症

→尿量の著しい増加、口渇、多飲 など となります。