PLANTASQR · REGISTRO DE ESPECIES

Fichas técnicas *del registro de especies*

Árboles y arbustos del Parque Principal de Chitagá
Norte de Santander, Colombia · 2.345 m s. n. m.

28	27	19
fichas	especies	familias

Octubre de 2026



Fichas técnicas del registro de especies

Las fichas técnicas facilitaron la recolección de la información de las especies representativas con presencia en el parque, seleccionadas por su valor ecológico, taxonómico y de conservación.

Cada ficha incluye el registro fotográfico de la especie en el parque —el ejemplar completo, la hoja y el tallo o rama—, que documenta tres características morfológicas clave observadas en campo: la forma general de la copa, la forma de la hoja y el tipo de tallo o corteza, acompañadas de una explicación detallada de dichos rasgos. Cuando se cuenta con ella, se agrega la fotografía del fruto (o del cono, en las coníferas).

CRITERIOS DE SELECCIÓN

- **Valor ecológico.** Especies que ofrecen refugio y alimento a la fauna, protegen el suelo y el agua o dominan la estructura del parque (setos, arbolado de sombra).
- **Valor taxonómico.** Representación de la diversidad del parque: 28 fichas, 27 especies y 19 familias botánicas, entre nativas andinas y ornamentales introducidas.
- **Valor de conservación.** Especies con alguna categoría de amenaza (palma de cera del Quindío, eugenia, araucaria, tuya) o con interés para la restauración del bosque andino (arrayán, cajeto, pino romerón).

CÓMO LEER UNA FICHA

1. **Porte y forma de la copa.** Fotografía del ejemplar completo: silueta de la copa, ramificación y manejo (libre, podado, en seto).
2. **Forma de la hoja.** Tipo (simple o compuesta), disposición en la rama, contorno, margen, ápice y venación.
3. **Tallo, rama y corteza.** Número de fustes, ramificación y textura de la corteza (lisa, fisurada, exfoliante, en placas, en tiras, anillada).
4. **Fruto o cono.** Forma, tamaño y color al madurar. Aparece en 26 de las 28 fichas.

Cada especie ocupa dos páginas. La primera es la **tabla de datos**: identificación (nombres, familia, nivel de confianza y descripción), características (tipo, altura, hojas, flores, frutos y tronco), hábitat, usos, estado de conservación, datos curiosos, cuidados, observaciones de identificación y especies similares. La segunda es el **registro fotográfico** con las fotos descritas arriba y, al pie, los árboles contados, los árboles y puntos ubicados en el mapa de la aplicación y la confianza de la identificación.

NOTAS

- Las **fotografías** del ejemplar, la hoja y el tallo provienen del registro de campo del proyecto. Algunas fotos de fruto provienen de Wikimedia Commons o iNaturalist, con licencia libre (CC BY o CC BY-SA); su autor, licencia y enlace aparecen bajo la foto.
- El estado de conservación es el de la **especie en su área de origen** (UICN), no su situación en Chitagá. «No evaluado» (NE) corresponde a las fichas marcadas como «no determinado».
- Los nombres científicos siguen las convenciones botánicas: género y epíteto en cursiva; «var.», «sp.» y «×» en redonda.
- En tres especies del catálogo inicial (palma de cera del Quindío, palma canaria y ciprés) los datos que no constaban en la ficha se completaron con fuentes bibliográficas, citadas al final del documento. Su nivel de confianza y sus observaciones de identificación se redactaron a partir de las fotografías de campo.
- Fuente de los datos: catálogo de PlantasQR en producción (fichas e individuos georreferenciados), consultado el 14 de octubre de 2026.

Índice de fichas

N.º	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	UICN	PÁG.
01	Aguacate	*Persea americana*	Lauraceae	LC	4
02	Araucaria excelsa	*Araucaria heterophylla*	Araucariaceae	VU	6
03	Arrayán	*Myrcia popayanensis*	Myrtaceae	LC	8
04	Arrayán guayabito	*Myrcia popayanensis* (Variedad / Forma de hoja redonda)	Myrtaceae	LC	10
05	Cajeto	*Citharexylum subflavescens*	Verbenaceae	LC	12
06	Cajeto de monte	*Rhamnus goudotiana*	Rhamnaceae	NE	14
07	Calistemo llorón	*Melaleuca viminalis*	Myrtaceae	LC	16
08	Capulí	*Prunus serotina* var. *capuli*	Rosaceae	LC	18
09	Chicalá	*Tecoma stans*	Bignoniaceae	LC	20
10	Ciprés	*Cupressus* sp. (probablemente C. lusitanica)	Cupressaceae	LC	22
11	Eugenia	*Syzygium paniculatum*	Myrtaceae	EN	24
12	Ficus benjamina	*Ficus benjamina*	Moraceae	LC	26
13	Fotinia	*Photinia* × *fraseri*	Rosaceae	NE	28
14	Fotinia glabra	*Photinia glabra*	Rosaceae	NE	30
15	Guanaminí	*Syzygium cumini*	Myrtaceae	LC	32
16	Liquidámbar	*Liquidambar styraciflua*	Altingiaceae	LC	34
17	Magnolio	*Magnolia grandiflora*	Magnoliaceae	LC	36
18	Níspero	*Eriobotrya japonica*	Rosaceae	LC	38
19	Palma canaria	*Phoenix canariensis*	Arecaceae	LC	40
20	Palma de cera del Quindío	*Ceroxylon quindiuense*	Arecaceae	VU	42
21	Pino pátula	*Pinus patula*	Pinaceae	LC	44
22	Pino romerón	*Retrophyllum rospigliosii*	Podocarpaceae	LC	46
23	Pitosporo	*Pittosporum undulatum*	Pittosporaceae	LC	48
24	Roble australiano	*Grevillea robusta*	Proteaceae	LC	50
25	San Joaquín variegado	*Hibiscus rosa-sinensis* (Variedad variegada / de hoja roja)	Malvaceae	NE	52
26	Siete cueros mutabilis	*Tibouchina mutabilis*	Melastomataceae	LC	54
27	Tuya	*Platycladus orientalis*	Cupressaceae	NT	56
28	Velero	*Senna spectabilis*	Fabaceae	LC	58

FICHA 01

DATOS DE LA ESPECIE

Aguacate

Persea americana

LC
Preocupación menor

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Aguacate
Nombres alternos	Árbol de Aguacate, Aguacatero, Palto
Nombre científico	*Persea americana*
Familia	Lauraceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Árbol frutal y ornamental de hoja perenne, muy conocido por la producción de sus frutos comestibles de alta demanda comercial. En etapas juveniles o cultivado en plazas urbanas, destaca como un arbusto o árbol mediano de copa densa y verde brillante, con brotes nuevos que brotan con llamativos tonos rojizos, cobrizos o marrón-anaranjados.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol
Altura aproximada	3 a 6 metros (ejemplar joven en entorno de parque; libre puede superar los 15 metros)
Hojas	Simples, alternas, agrupadas principalmente hacia el final de las ramas, de forma elíptica o lanceolada, con márgenes enteros y nervadura central clara. Tienen una consistencia cartácea a coriácea, haz verde oscuro brillante y brotes apicales jóvenes tiernos de color cobrizo o rojizo.
Flores	Pequeñas, de color verde-amarillento, agrupadas en panículas o racimos terminales que aparecen en los extremos de las ramas.
Frutos	Bayas grandes de forma ovalada, piriforme o globosa, con una piel que varía de verde a morado oscuro según la variedad, pulpa verdosa cremosa comestible y una semilla central globosa de gran tamaño.
Tronco o tallo	Tronco recto con corteza ligeramente rugosa o agrietada longitudinalmente de color grisáceo a marrón claro; ramifica a baja altura formando una copa redondeada y densa.
HÁBITAT	
Distribución	Nativo de Mesoamérica (México y Centroamérica), pero ampliamente cultivado e introducido en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo, siendo sumamente abundante en fincas, huertos y parques de Colombia.
Altitud	Se cultiva con éxito desde el nivel del mar hasta los 2,500 m s. n. m. dependiendo de la variedad (las variedades de la raza mexicana y sus híbridos toleran muy bien los microclimas de montaña baja y media de la provincia de Pamplona).
Clima	Prefiere climas templados a cálidos; los ejemplares jóvenes se benefician de estar protegidos contra las heladas directas y vientos muy secos de alta montaña.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Producción agrícola y frutal intensiva debido a su fruto comestible de alto valor nutricional y comercial. • Sombra y aporte ornamental en huertos caseros, fincas rurales y zonas verdes de parques públicos. • Atracción de insectos polinizadores (especialmente abejas) atraídos por la masiva apertura de sus panículas florales.
Estado de conservación	Preocupación menor (LC / Especie cultivada extensamente a nivel mundial)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• Los brotes jóvenes de este árbol presentan una coloración rojiza o cobriza debido a la presencia de antocianinas, unos pigmentos naturales que protegen los tejidos tiernos y la clorofila en desarrollo de la radiación solar directa. • Tiene un sistema de floración muy particular conocido como dicogamia sincrónica: las flores abren primero como femeninas, cierran por unas horas y vuelven a abrir al día siguiente como masculinas, lo que evita la autopolinización dentro de la misma flor.
Cuidados	Requiere una ubicación a pleno sol para un crecimiento óptimo. Exige suelos profundos, sueltos, con un alto contenido de materia orgánica y, de manera muy estricta, un excelente drenaje, ya que sus raíces son sumamente sensibles a la asfixia radicular y al ataque de hongos por encharcamiento.
Observaciones de identificación	El porte arbóreo globoso de follaje denso en la zona verde del parque (foto 1/2) y el detalle en primer plano de las hojas alternas, lanceoladas, con nervaduras laterales curvas y brotes tiernos apicales de color marrón-cobrizo con yemas florales en desarrollo (foto 2/2) confirman la morfología vegetativa típica de Persea americana.
Especies similares	• Citharexylum subflavescens (Cajeto - descartado por sus hojas dispuestas en cruz opuesta y textura áspera) • Magnolia grandiflora (Magnolio - de hojas considerablemente más rígidas, duras y con envés comúnmente pubescente-ferrugíneo) • Persea caerulea (Aguacatillo de monte - especie silvestre nativa de frutos mucho más pequeños y no comestibles)

FICHA 01

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Aguacate

Persea americana

LC
Preocupación menor

FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Lauraceae	árbol	3 a 6 metros	Nativo de Mesoamérica (México y Centroamérica)



1 Porte y forma de la copa

Redondeada y densa

Ramifica a baja altura y forma una copa redondeada y densa, de verde brillante, con brotes nuevos de tonos rojizos o cobrizos.



2 Forma de la hoja

Simple · alterna · elíptica · nervadura central clara · brotes cobrizos


Simples, alternas, agrupadas principalmente hacia el final de las ramas, de forma elíptica o lanceolada, con márgenes enteros y nervadura central clara. Tienen una consistencia cartácea a coriácea, haz verde oscuro brillante y brotes apicales jóvenes tiernos de color cobrizo o rojizo.



3 Tallo, rama y corteza

Recto · corteza agrietada longitudinalmente

Tronco recto con corteza ligeramente rugosa o agrietada longitudinalmente de color grisáceo a marrón claro; ramifica a baja altura formando una copa redondeada y densa.



4 Fruto

Bayas grandes de forma ovalada, piriforme o globosa, con una piel que varía de verde a morado oscuro según la variedad, pulpa verdosa cremosa comestible y una semilla central globosa de gran tamaño.

Foto: Denis kasozi · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ugandan_avocado_fruit_on_the_tree_4.jpg

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
2	2	2	alto

FICHA 02

DATOS DE LA ESPECIE

Araucaria excelsa

Araucaria heterophylla

VU
Vulnerable

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Araucaria excelsa
Nombres alternos	Pino de la isla de Norfolk, Pino de Norfolk, Araucaria
Nombre científico	*Araucaria heterophylla*
Familia	Araucariaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Conífera perennifolia de porte majestuoso y silueta simétrica y piramidal, muy común como árbol ornamental en plazas principales de pueblos andinos. Destaca por sus ramas horizontales dispuestas en pisos geométricos bien definidos y sus hojas en forma de escamas verdes que cubren densamente las ramillas.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol (conífera)
Altura aproximada	20 a 35 metros (en zonas de cultivo urbano)
Hojas	Dimórficas (cambian con la edad); en ramillas jóvenes son curvas, blandas y en forma de aguja delgada (como se aprecia en el primer plano), mientras que en las ramas maduras se vuelven cortas, gruesas y en forma de escama fuertemente imbricada.
Flores	No produce flores verdaderas. Como toda conífera, presenta estructuras reproductivas masculinas y femeninas en conos separados (estróbilos).
Frutos	Conos o piñas globosas globulares grandes (de 10 a 12 cm de diámetro) que tardan cerca de 18 meses en madurar, liberando semillas aladas al abrirse.
Tronco o tallo	Tronco notablemente recto, cilíndrico y vertical, con una corteza rugosa y escamosa de color marrón-grisáceo que desprende resina aromática y muestra las marcas de las ramas antiguas caídas.
HÁBITAT	
Distribución	Nativo de la Isla de Norfolk (un pequeño territorio australiano en el océano Pacífico), pero introducido con enorme éxito como árbol ornamental en parques urbanos de Colombia y el mundo.
Altitud	Se adapta muy bien desde el nivel del mar hasta los 2,600 m s. n. m., prosperando con salud en el clima andino de la provincia de Pamplona y Chitagá.
Clima	Prefiere climas templados a frescos y húmedos; es muy resistente a los vientos fuertes debido a la flexibilidad de sus ramas horizontales.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Altamente ornamental y paisajístico, usado de forma focal en el centro de plazas públicas y parques debido a su imponente altura y porte simétrico. • Históricamente apreciado en su lugar de origen para la fabricación de mástiles de barcos por la rectitud de su tronco. • Refugio y sitio de anidación para aves locales de mediano y gran porte.
Estado de conservación	Vulnerable (VU) en su hábitat natural silvestre de la Isla de Norfolk, pero sumamente abundante y cultivado globalmente a nivel comercial urbano.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• Aunque popularmente se le llama 'pino de Norfolk', no pertenece a la familia de los pinos verdaderos (Pinaceae), sino a un linaje mucho más antiguo de coníferas del hemisferio sur (Araucariaceae) que convivió con los dinosaurios. • Su crecimiento es tan regular que en ejemplares jóvenes es fácil calcular su edad aproximada contando los niveles o pisos horizontales de ramas que se extienden desde el tronco central.
Cuidados	Requiere una exposición a pleno sol desde sus etapas tempranas. Exige suelos profundos, sueltos y con excelente drenaje; tolera bien los suelos ligeramente ácidos y resiste de buena manera periodos moderados de sequía una vez establecido.
Observaciones de identificación	La inconfundible silueta piramidal con ramas dispuestas en pisos simétricos (foto 1/3), las ramillas flexibles cubiertas de pequeñas hojas curvadas en forma de punzón verde (foto 2/3) y el tronco grueso, vertical y escamoso de base blanqueada en el parque (foto 3/3) confirman la identidad de la especie Araucaria heterophylla.
Especies similares	• Araucaria columnaris (Araucaria de Cook - de silueta mucho más estrecha y tronco inclinado) • Araucaria bidwillii (Pino de las damas - de hojas notablemente más anchas y punzantes) • Cryptomeria japonica (Cedro japonés - de follaje similar pero ramificación irregular)

FICHA 02


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Araucaria excelsa

Araucaria heterophylla

VU
Vulnerable

FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Araucariaceae	árbol (conífera)	20 a 35 metros	Nativo de la Isla de Norfolk (un pequeño territorio australiano en el océano Pacífico)



1 Porte y forma de la copa

Piramidal en pisos

Silueta simétrica y piramidal, con las ramas horizontales dispuestas en pisos (verticilos) bien definidos alrededor de un eje único.



2 Forma de la hoja

Dimórficas · aguja curva (joven) · escama imbricada (madura)

Dimórficas (cambian con la edad); en ramillas jóvenes son curvas, blandas y en forma de aguja delgada (como se aprecia en el primer plano), mientras que en las ramas maduras se vuelven cortas, gruesas y en forma de escama fuertemente imbricada.



3 Tallo, rama y corteza

Recto · corteza rugosa y escamosa · resinoso

Tronco notablemente recto, cilíndrico y vertical, con una corteza rugosa y escamosa de color marrón-grisáceo que desprende resina aromática y muestra las marcas de las ramas antiguas caídas.



4 Cono

Conos o piñas globosas globulares grandes (de 10 a 12 cm de diámetro) que tardan cerca de 18 meses en madurar, liberando semillas aladas al abrirse.

Foto: Tree-species at Flickr · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Araucaria_heterophylla_cones.jpg

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
1	1	1	alto

FICHA 03

DATOS DE LA ESPECIE

Arrayán

Myrcia popayanensis

LC
Preocupación menor

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Arrayán
Nombres alternos	Arrayán blanco, Guaulo, Mirto, Palo de hierro
Nombre científico	*Myrcia popayanensis*
Familia	Myrtaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Árbol o arbusto nativo fundamental de los bosques andinos de Colombia, muy reconocido por su madera extremadamente dura, su ramificación densa y su atractivo follaje perenne de hojas pequeñas y brillantes. Es una especie clave en la restauración ecológica y protección de fuentes hídricas.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol / arbusto según poda
Altura aproximada	5 a 15 metros
Hojas	Simples, opuestas, elípticas a ovadas, pequeñas (generalmente de 2 a 5 cm de largo), con textura coriácea, de color verde oscuro brillante en el haz y con puntos translúcidos glandulares característicos de las mirtáceas al mirarse a contraluz.
Flores	Pequeñas, de color blanco o crema, dispuestas en panículas terminales o axilares, con numerosos estambres llamativos que desprenden un aroma suave.
Frutos	Bayas globosas y carnosas que pasan de verde a rojo y finalmente a negro purpúreo al madurar, muy apetecidas por la avifauna local.
Tronco o tallo	Tronco generalmente retorcido o ramificado desde baja altura, con una corteza lisa de color café claro, rojizo o grisáceo que se desprende en delgadas láminas papiláceas, a menudo cubierto de líquenes y musgo en zonas de niebla.
HÁBITAT	
Distribución	Nativo de la región andina de Sudamérica (principalmente Colombia, Ecuador y Venezuela). Muy abundante en las cordilleras colombianas.
Altitud	1,800 a 3,200 m s. n. m. (ampliamente adaptado a los climas fríos y templados de la provincia de Pamplona y las montañas de Chitagá).
Clima	Frío a templado húmedo, muy resistente a los vientos de montaña y adaptado a suelos ácidos con buen drenaje.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Protección y regulación hídrica en zonas de nacimiento de agua y márgenes de quebradas. • Atracción y alimentación de aves e insectos polinizadores nativos gracias a sus frutos y flores. • Históricamente utilizado en zonas rurales para postes de cercas y mangos de herramientas debido a la extrema resistencia de su madera. • Ornamental en parques y senderos ecológicos por su copa densa y estricta resistencia.
Estado de conservación	Preocupación menor (LC)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• Sus hojas, al ser estrujadas, desprenden un aroma característico y agradable debido a la presencia de aceites esenciales esenciales en sus glándulas foliares. • Es una especie de crecimiento lento pero sumamente longeva y resistente, capaz de soportar las heladas de la alta montaña andina.
Cuidados	Requiere una exposición a pleno sol o semisombra. Se propaga principalmente por semillas y prefiere suelos ricos en materia orgánica que retengan humedad pero que tengan un drenaje adecuado para evitar encharcamientos prolongados.
Observaciones de identificación	El collage de imágenes confirma las características diagnósticas del Arrayán: la corteza descascarada con líquenes (foto superior izquierda), el follaje tupido de hojas pequeñas, opuestas y elípticas con frutos verdes axilares (foto superior centro), y el porte de copa globosa y densa integrada al paisaje andino urbano y rural.
Especies similares	• Myrteola nummularia (Arrayancito / Polylepis pardo) • Eugenia myrtifolia (Eugenia de jardín) • Myrica pubescens (Laurel de cera - por el hábito pero con hojas alternas y aserradas)

FICHA 03

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Arrayán

Myrcia popayanensis

LC
Preocupación menor

FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Myrtaceae	árbol / arbusto según poda	5 a 15 metros	Nativo de la región andina de Sudamérica (principalmente Colombia, Ecuador y Venezuela)



1 Porte y forma de la copa

Globosa y densa

Copa globosa y densa, formada por una ramificación abundante desde baja altura; el follaje es perenne, de hojas pequeñas y brillantes.



2 Forma de la hoja

Simple · opuesta · elíptica a ovada · margen entero · puntos glandulares

Simples, opuestas, elípticas a ovadas, pequeñas (generalmente de 2 a 5 cm de largo), con textura coriácea, de color verde oscuro brillante en el haz y con puntos translúcidos glandulares característicos de las mirtáceas al mirarse a contraluz.



3 Tallo, rama y corteza

Corteza lisa exfoliante en láminas · fustes retorcidos

Tronco generalmente retorcido o ramificado desde baja altura, con una corteza lisa de color café claro, rojizo o grisáceo que se desprende en delgadas láminas papiláceas, a menudo cubierto de líquenes y musgo en zonas de niebla.

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
12	9	9	alto

FICHA 04

DATOS DE LA ESPECIE

Arrayán guayabito

Myrcia popayanensis (Variedad / Forma de hoja redonda)

LC
Preocupación menor

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Arrayán guayabito
Nombres alternos	Arrayán de hoja redonda, Guayabito de monte, Mirto andino
Nombre científico	*Myrcia popayanensis* (Variedad / Forma de hoja redonda)
Familia	Myrtaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Arbusto o árbol pequeño nativo de los ecosistemas de alta montaña y bosques andinos. Se distingue por su follaje sumamente tupido y compacto, compuesto por hojas pequeñas, notablemente redondeadas, coriáceas y brillantes, cuyos brotes tiernos presentan tonos cobrizos o rojizos muy vistosos.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol / arbusto según poda
Altura aproximada	1.5 a 4 metros (en ambientes urbanos o podados)
Hojas	Simples, opuestas, sésiles o con pecíolo muy corto, de forma orbicular a elíptica redondeada, con el ápice obtuso. Tienen una textura gruesa (coriácea), haz verde oscuro lustroso y brotes apicales de color marrón rojizo.
Flores	Diminutas, de color blanco, agrupadas en pequeñas inflorescencias axilares, provistas de numerosos estambres típicos de la familia Myrtaceae.
Frutos	Bayas globosas pequeñas que cambian de tonalidades verdes a rojas oscuras y finalmente a negro purpúreo cuando completan su maduración.
Tronco o tallo	Tallos delgados y leñosos de corteza lisa grisácea o ligeramente rojiza, muy ramificados desde la base, lo que le confiere un aspecto natural de bola o seto denso.
HÁBITAT	
Distribución	Nativo de la cordillera de los Andes en el norte de Sudamérica. Es un componente común de los bosques altoandinos y bordes de páramo en Colombia.
Altitud	2,000 a 3,200 m s. n. m. (plenamente adaptado a las condiciones ambientales de Chitagá y las zonas altas de la provincia de Pamplona).
Clima	Frío y húmedo, tolerando de excelente manera la neblina constante, los vientos fuertes de montaña y los descensos bruscos de temperatura.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Ornamental y paisajístico en parques urbanos y jardines institucionales debido a su facilidad para tolerar podas de formación (topiaria). • Restauración ecológica de microcuencas y laderas andinas degradadas. • Refugio y fuente de alimento constante para pequeñas aves e insectos polinizadores locales.
Estado de conservación	Preocupación menor (LC)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• A diferencia del arrayán común de hojas más alargadas, esta variedad de hojas orbiculares es muy buscada en la jardinería andina porque mantiene una estructura compacta ideal para delimitar senderos sin necesidad de mantenimiento constante. • Al frotar sus hojas redondeadas se libera un aroma dulce y resinoso muy característico, debido a las glándulas de aceites esenciales esenciales presentes en su superficie foliar.
Cuidados	Requiere una ubicación a pleno sol para favorecer la coloración cobriza de sus brotes nuevos. Prefiere suelos orgánicos, de tendencia ácida, húmedos pero con excelente drenaje para evitar la asfixia radicular.
Observaciones de identificación	Las tres imágenes corresponden al mismo tipo de planta en el parque; la foto 2/6 muestra en detalle la disposición opuesta, la forma marcadamente redondeada de las hojas y el color cobrizo de los brotes superiores, lo que ratifica que es un miembro de la familia Myrtaceae plenamente asociado al grupo de los arrayanes andinos.
Especies similares	• Eugenia myrtifolia (Eugenia de jardín - de hojas más alargadas y agudas) • Myrteola nummularia (Arrayancito de páramo - considerablemente más pequeño) • Vaccinium meridionale (Agraz silvestre - de hojas alternas y bordes aserrados)

FICHA 04

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Arrayán guayabito

Myrcia popayanensis (Variedad / Forma de hoja redonda)

LC
Preocupación menor

FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Myrtaceae	árbol / arbusto según poda	1.5 a 4 metros	Nativo de la cordillera de los Andes en el norte de Sudamérica



1 Porte y forma de la copa

En bola, muy tupida

Follaje sumamente tupido y compacto que, por la ramificación desde la base, toma un aspecto natural de bola o seto denso.



2 Forma de la hoja

Simple · opuesta · orbicular · ápice obtuso · casi sésil

Simples, opuestas, sésiles o con pecíolo muy corto, de forma orbicular a elíptica redondeada, con el ápice obtuso. Tienen una textura gruesa (coriácea), haz verde oscuro lustroso y brotes apicales de color marrón rojizo.



3 Tallo, rama y corteza

Tallos delgados ramificados desde la base

Tallos delgados y leñosos de corteza lisa grisácea o ligeramente rojiza, muy ramificados desde la base, lo que le confiere un aspecto natural de bola o seto denso.



4 Fruto

Bayas globosas pequeñas que cambian de tonalidades verdes a rojas oscuras y finalmente a negro purpúreo cuando completan su maduración.

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
5	4	4	alto

FICHA 05

DATOS DE LA ESPECIE

Cajeto

Citharexylum subflavescens

LC
Preocupación menor

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Cajeto
Nombres alternos	Quimulá, Garagay, Urapo, Palo guitarra, Cascarillo
Nombre científico	*Citharexylum subflavescens*
Familia	Verbenaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Árbol nativo de los bosques andinos colombianos, ampliamente apreciado en proyectos de restauración ecológica y paisajismo. Se caracteriza por su crecimiento rápido, su corteza amarillenta y escamosa que se desprende en tiras, y su copa densa que sirve de refugio y alimento para múltiples especies de aves silvestres.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol
Altura aproximada	15 a 20 metros
Hojas	Simples, opuestas, decusadas (dispuestas en cruz), de forma elíptica a oblonga, con márgenes enteros y una textura áspera o coriácea; el haz es verde oscuro lustroso y el envés suele tener una tonalidad más clara con vellosidades finas.
Flores	Pequeñas, fragantes, con corola tubular de color blanco o crema, dispuestas en racimos alargados y pendulares que atraen a gran cantidad de insectos polinizadores.
Frutos	Drupas globosas y carnosas que cambian de color verde a un rojo brillante y lustroso al madurar (tornándose negras al final), conteniendo semillas duras en su interior.
Tronco o tallo	Tronco cilíndrico, ramificado a mediana altura; su corteza externa es de un tono pardo-amarillento característico y tiene la tendencia a agrietarse y desprenderse en láminas longitudinales largas.
HÁBITAT	
Distribución	Especie nativa de la región andina de Suramérica, presente en las cordilleras de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Muy común en los bosques nublados de la cordillera Oriental.
Altitud	1,100 a 2,800 m s. n. m. (perfectamente adaptado a los valles y laderas montañosas de Chitagá y la provincia de Pamplona).
Clima	Templado a frío y húmedo; tolera bien la nubosidad constante y prefiere suelos con buena humedad.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Restauración ecológica y conservación de suelos, especialmente útil en la protección de nacimientos de agua y cuencas hidrográficas. • Alimento para la fauna local (avifauna) gracias a la abundante producción de sus drupas rojas. • Cercas vivas en entornos rurales y sombrío en sistemas agroforestales. • Artesanal, ya que su madera ligera y dócil ha sido utilizada tradicionalmente para la fabricación de instrumentos musicales (como guitarras) y cabos de herramientas.
Estado de conservación	Preocupación menor (LC)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• Su nombre científico 'Citharexylum' proviene del griego y significa literalmente 'madera de guitarra', debido al uso tradicional que los pobladores locales daban a su madera para construir instrumentos de cuerda. • Comparte el nombre común de 'Cajeto' o 'Nacedero' en algunas regiones con el *Trichanthera gigantea* (familia Acanthaceae), pero se diferencian claramente porque el *Citharexylum* desarrolla drupas decorativas de color rojo vivo que tardan varios meses en madurar.
Cuidados	Es una planta rústica y de fácil propagación mediante semillas orgánicas. Prospera a pleno sol o semisombra, requiere suelos con buen drenaje pero que retengan humedad, y responde excelentemente a podas sanitarias a inicios de la temporada lluviosa.
Observaciones de identificación	La morfología de la gran hoja fotografiada en primer plano (foto 2/2) —con su marcada nervadura central amarillenta, bordes enteros bien definidos, consistencia coriácea y silueta elíptica-lanceolada— coincide con las características foliares descritas para el género Citharexylum (Cajeto), descartando opciones ornamentales introducidas de hojas similares.
Especies similares	• Citharexylum montanum (Cajeto de monte) • Trichanthera gigantea (Nacedero / Madre de agua - solo por alcance de nombre común) • Persea americana (Árbol de Aguacate - por similitud en la textura foliar)

FICHA 05

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cajeto

Citharexylum subflavescens

LC
Preocupación menor

FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Verbenaceae	árbol	15 a 20 metros	Especie nativa de la región andina de Suramérica, presente en las cordilleras de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú



1 Porte y forma de la copa

Densa y redondeada

Copa densa, que sirve de refugio y alimento a muchas aves silvestres; el tronco cilíndrico ramifica a mediana altura.



2 Forma de la hoja

Simple · opuesta decusada · elíptica a oblonga · margen entero


Simples, opuestas, decusadas (dispuestas en cruz), de forma elíptica a oblonga, con márgenes enteros y una textura áspera o coriácea; el haz es verde oscuro lustroso y el envés suele tener una tonalidad más clara con vellosidades finas.



3 Tallo, rama y corteza

Corteza pardo-amarillenta en láminas longitudinales

Tronco cilíndrico, ramificado a mediana altura; su corteza externa es de un tono pardo-amarillento característico y tiene la tendencia a agrietarse y desprenderse en láminas longitudinales largas.



4 Fruto

Drupas globosas y carnosas que cambian de color verde a un rojo brillante y lustroso al madurar (tornándose negras al final), conteniendo semillas duras en su interior.

Foto: Nicolás Baresch Uribe · CC BY 4.0 · iNaturalist
https://www.inaturalist.org/observations/111262375

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
5	2	2	alto

FICHA 06

DATOS DE LA ESPECIE

Cajeto de monte

Rhamnus goudotiana

NE
No evaluado

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Cajeto de monte
Nombres alternos	Cajeto, Duraznillo, Espino de páramo
Nombre científico	*Rhamnus goudotiana*
Familia	Rhamnaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Árbol pequeño o arbusto nativo de los bosques altoandinos y bordes de páramo en Colombia. Posee un porte de copa más abierto, irregular y menos denso que el de los pitosporos. Destaca visualmente por el contraste de sus hojas adultas de color verde oscuro con sus brotes terminales y hojas nuevas, los cuales presentan una pubescencia fina de tonalidades café-doradas o rojizas muy llamativas. Sus hojas tienen nervaduras muy marcadas que le dan una textura rugosa.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol / arbusto según poda
Altura aproximada	3 a 8 metros
Hojas	Simples, alternas, de forma elíptica a ovada, con márgenes finamente aserrados o denticulados. La superficie superior o haz es de color verde oscuro con venación impresa muy notoria (rugosa), mientras que los brotes y hojas jóvenes lucen un color marrón-rojizo debido a una densa vellosidad dorada.
Flores	Muy pequeñas, de color verde-amarillento o blanquecino, dispuestas en grupos axilares poco vistosos pero atractivos para insectos polinizadores.
Frutos	Pequeñas drupas globosas que pasan de verde a tonos rojizos y finalmente negros al madurar por completo.
Tronco o tallo	Generalmente delgado, ramificado desde baja altura, con corteza grisácea a marrón claro y ramillas jóvenes cubiertas de un vello color castaño.
HÁBITAT	
Distribución	Especie nativa de Colombia, distribuida a lo largo de las cordilleras andinas. Es un componente natural de los bosques de niebla y los entornos subpáramos de la provincia de Pamplona.
Altitud	2,000 a 3,400 m s. n. m. (plenamente adaptado a los climas fríos andinos como el de Chitagá).
Clima	Frío de alta montaña, húmedo o de niebla.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Especie clave en proyectos de restauración ecológica y conservación de cuencas hidrográficas en zonas altas. • Protección y recuperación de suelos degradados o laderas andinas. • Sus frutos sirven de alimento para la avifauna nativa de los bosques altoandinos.
Estado de conservación	No evaluado formalmente (NE), pero protegida localmente dentro de los ecosistemas de bosque andino.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• En los pueblos andinos, el nombre 'cajeto' se comparte a veces con otras especies locales, pero este es el cajeto auténtico de los bosques nublados, caracterizado por su 'vello' dorado en los brotes nuevos. • Su presencia en los estratos bajos del bosque es un excelente indicador de la salud del ecosistema nativo andino.
Cuidados	Requiere de alta humedad ambiental y suelos ricos en materia orgánica. Tolera muy bien las bajas temperaturas y heladas ligeras típicas de las zonas de páramo.
Observaciones de identificación	Se confirma el taxón *Rhamnus goudotiana* a partir de los caracteres visuales expuestos. En la vista general (foto 1) se distingue el hábito arbustivo-arbóreo típico con ramaje extendido y brotes superiores de coloración ocre/rojiza. En el plano de detalle (foto 2) se aprecian perfectamente las hojas elípticas de consistencia subcoriácea, con el margen marcadamente dentado y la textura fuertemente rugosa por la venación hundida, junto a la pubescencia ferrugínea en los pecíolos y tallos jóvenes.
Especies similares	• Hesperomeles ferruginea (Mortiño / Cerro) • Myrsine coriacea (Cucharo) • Palicourea angustifolia (Cafecito de monte)

FICHA 06


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cajeto de monte

Rhamnus goudotiana

NE
No evaluado


FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Rhamnaceae	árbol / arbusto según poda	3 a 8 metros	Especie nativa de Colombia, distribuida a lo largo de las cordilleras andinas



1 Porte y forma de la copa

Abierta e irregular

Copa más abierta, irregular y menos densa que la de otros árboles del parque; destacan los brotes con vello café-dorado o rojizo.



2 Forma de la hoja

Simple · alterna · elíptica a ovada · aserrada · venación impresa


Simples, alternas, de forma elíptica a ovada, con márgenes finamente aserrados o denticulados. La superficie superior o haz es de color verde oscuro con venación impresa muy notoria (rugosa), mientras que los brotes y hojas jóvenes lucen un color marrón-rojizo debido a una densa vellosidad dorada.



3 Tallo, rama y corteza

Delgado · ramificado desde abajo · ramillas vellosas

Generalmente delgado, ramificado desde baja altura, con corteza grisácea a marrón claro y ramillas jóvenes cubiertas de un vello color castaño.



4 Fruto

Pequeñas drupas globosas que pasan de verde a tonos rojizos y finalmente negros al madurar por completo.

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
1	1	1	alto

FICHA 07

DATOS DE LA ESPECIE

Calistemo llorón

Melaleuca viminalis

LC
Preocupación menor

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Calistemo llorón
Nombres alternos	Limpiatubos, Escobillón rojo, Árbol del cepillo, Chupón
Nombre científico	*Melaleuca viminalis*
Familia	Myrtaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Árbol perennifolio de porte pequeño a mediano, sumamente ornamental y característico por sus largas ramas colgantes y flexibles que recuerdan la silueta de un sauce llorón. Su rasgo más vistoso son sus inflorescencias cilíndricas llenas de estambres de un color rojo brillante que asemejan escobillas o limpiatubos domésticos.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol
Altura aproximada	4 a 8 metros
Hojas	Simples, alternas, sésiles o con pecíolos muy cortos, de forma linear o lanceolada estrecha, de 3 a 7 cm de largo; son de color verde claro, tienen márgenes enteros y desprenden un suave aroma cítrico al ser estrujadas.
Flores	Agrupadas en densas espigas terminales o axilares de 5 a 10 cm de longitud, compuestas por numerosos estambres libres, largos y de color rojo encendido que rodean el eje de la ramilla.
Frutos	Cápsulas leñosas, duras y pequeñas en forma de copa, que se disponen de manera apretada a lo largo de los tallos y permanecen unidas a las ramas durante varios años albergando semillas diminutas.
Tronco o tallo	Tronco generalmente ramificado a baja altura en múltiples ejes (como se observa en la foto 3/3); presenta una corteza rugosa, fisurada y agrietada de color café grisáceo, frecuentemente cubierta por líquenes en ambientes montañosos húmedos.
HÁBITAT	
Distribución	Nativo de Australia (especialmente de los estados de Nueva Gales del Sur y Queensland), pero ampliamente introducido y aclimatado con fines ornamentales en los parques y plazas urbanas de Colombia.
Altitud	Se adapta con gran facilidad desde el nivel del mar hasta los 2,600 m s. n. m., prosperando con excelente salud en las condiciones climáticas de la provincia de Pamplona y Chitagá.
Clima	Prefiere climas templados a frescos; es muy resistente a periodos moderados de sequía una vez establecido y se beneficia de una humedad ambiental regular.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Altamente ornamental y paisajístico en parques públicos y zonas verdes amplias debido al singular impacto visual de sus ramas colgantes y flores rojas. • Atracción de fauna local, funcionando como un excelente imán para colibríes, abejas grandes y otros insectos polinizadores atraídos por el abundante néctar de sus estambres. • Sombra ligera de porte bajo apta para senderos peatonales y plazas públicas.
Estado de conservación	Preocupación menor (LC / Especie cultivada de forma extensiva a nivel mundial)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• Aunque durante mucho tiempo se clasificó bajo el nombre científico de *Callistemon viminalis*, estudios genéticos recientes agruparon a todo este grupo dentro del género *Melaleuca*. • A diferencia de la mayoría de árboles donde los frutos detienen el crecimiento de la rama, en el calistemo el eje de la ramilla continúa creciendo y produciendo hojas nuevas más allá de la zona donde quedaron fijadas las cápsulas secas de los años anteriores.
Cuidados	Exige una ubicación a pleno sol para asegurar una floración masiva y constante. Requiere suelos con buen drenaje, profundos y prefiere riegos moderados; tolera de excelente manera las podas de aclareo o de limpieza tras sus periodos fuertes de floración.
Observaciones de identificación	La estructura ramificada desde la base con corteza rugosa moteada por líquenes (foto 3/3), las ramas delgadas que caen verticalmente en cascada (foto 1/3) y las inconfundibles inflorescencias de color rojo brillante en forma de escobilla cilíndrica (foto 2/3) confirman con total exactitud la identidad de Melaleuca viminalis.
Especies similares	• Melaleuca citrina / Callistemon citrinus (Limpiatubos común - de porte más arbustivo y ramas rígidas, no colgantes) • Salix babylonica (Sauce llorón - de silueta similar pero descartado por completo por sus flores verdosas insignificantes) • Callistemon rigidus (Escobillón rígido - de follaje sumamente punzante y ramas erectas)

FICHA 07


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calistemo llorón

Melaleuca viminalis

LC
Preocupación menor

FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Myrtaceae	árbol	4 a 8 metros	Nativo de Australia (especialmente de los estados de Nueva Gales del Sur y Queensland)



1 Porte y forma de la copa

Llorona, de ramas colgantes

Porte pequeño a mediano, con ramas largas, flexibles y colgantes que recuerdan la silueta de un sauce llorón; sus flores rojas forman «escobillas» en las puntas.



2 Forma de la hoja

Simple · alterna · linear a lanceolada estrecha · aromática

Simples, alternas, sésiles o con pecíolos muy cortos, de forma linear o lanceolada estrecha, de 3 a 7 cm de largo; son de color verde claro, tienen márgenes enteros y desprenden un suave aroma cítrico al ser estrujadas.



3 Tallo, rama y corteza

Varios ejes · corteza rugosa y fisurada · líquenes

Tronco generalmente ramificado a baja altura en múltiples ejes (como se observa en la foto 3/3); presenta una corteza rugosa, fisurada y agrietada de color café grisáceo, frecuentemente cubierta por líquenes en ambientes montañosos húmedos.



4 Fruto

Cápsulas leñosas, duras y pequeñas en forma de copa, que se disponen de manera apretada a lo largo de los tallos y permanecen unidas a las ramas durante varios años albergando semillas diminutas.

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
2	2	2	alto

FICHA 08

DATOS DE LA ESPECIE

Capulí

Prunus serotina var. *capuli*

LC
Preocupación menor

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Capulí
Nombres alternos	Cerezo, Cerezo criollo, Cerezo de monte
Nombre científico	*Prunus serotina* var. *capuli*
Familia	Rosaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Árbol frutal y forestal de tamaño mediano a grande, muy común en zonas frías y templadas de los Andes colombianos. Destaca por sus brotes jóvenes con un distintivo matiz rojizo o cobrizo, sus hojas oblongo-lanceoladas de bordes ligeramente finamente aserrados con un tono verde brillante en el haz, y su corteza pardo-grisácea que se fisura en placas pequeñas a medida que madura.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol
Altura aproximada	8 a 15 metros
Hojas	Simples, alternas, oblongo-lanceoladas, de 6 a 14 cm de largo, con borde finamente aserrado, superficie lustrosa en el haz y ramillas flexibles colgantes. Los brotes nuevos presentan tonos rojizos/bronceados característicos.
Flores	Pequeñas, de color blanco, dispuestas en racimos alargados y colgantes de 10 a 15 cm.
Frutos	Drupas globosas de 1 a 2 cm de diámetro, de color rojo oscuro a morado casi negro al madurar, de sabor agridulce y comestibles.
Tronco o tallo	Tronco erguido, a menudo ramificado a media altura en varios fustes principales; corteza áspera, de color café grisáceo con fisuras y lenticelas visibles.
HÁBITAT	
Distribución	Nativo de Norteamérica y ampliamente naturalizado y cultivado en la cordillera de los Andes desde Venezuela hasta Bolivia (muy representativo en los municipios de Norte de Santander como Chitagá y Pamplona).
Altitud	1,800 a 3,100 m s. n. m. (encaja exactamente con la franja altitudinal de Chitagá).
Clima	Frío a templado de montaña.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Consumo de sus frutos frescos, en mermeladas, dulces y bebidas tradicionales. • Sombra y ornamentación en parques principales, plazas urbanas y linderos de fincas. • Atracción de avifauna silvestre (pájaros, mirlos y tucanetes). • Madera de buena densidad para leña, herramientas y carpintería local.
Estado de conservación	Preocupación menor (LC)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• Sus hojas y semillas contienen pequeños porcentajes de glucósidos cianogénicos que desprenden un aroma a almendras amargas al estrujarlas. • Es uno de los árboles frutales tradicionales más emblemáticos de los patios y plazas de los pueblos de la provincia de Pamplona y Chitagá.
Cuidados	Requiere exposición directa al sol para una buena floración y fructificación. Se adapta a variados tipos de suelo siempre que no se encharquen.
Observaciones de identificación	Las ramillas colgantes con hojas brillantes de borde finamente aserrado y los brotes nuevos rojizo-bronceados (visibles de cerca en la foto 2) son el sello característico del capulí/cerezo (*Prunus serotina var. capuli*). La estructura del tronco ramificado desde poca altura con corteza agrietada gris-castaña (foto 3) y la copa amplia en el entorno del parque (foto 1) reafirman la identificación.
Especies similares	• Prunus avium (Cerezo dulce) • Vallea stipularis (Raque / Choche) • Myrica pubescens (Lauro / Cera)

FICHA 08

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Capulí

Prunus serotina var. *capuli*

LC
Preocupación menor

FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Rosaceae	árbol	8 a 15 metros	Nativo de Norteamérica y ampliamente naturalizado y cultivado en la cordillera de los Andes desde Venezuela hasta Bolivia (muy representativo en los municipios de Norte de Santander como Chitagá y Pamplona)



1 Porte y forma de la copa

Amplia, de ramillas colgantes

Árbol mediano a grande con varios fustes desde media altura y ramillas flexibles algo colgantes; los brotes jóvenes tienen un matiz rojizo.



2 Forma de la hoja

Simple · alterna · oblongo-lanceolada · finamente aserrada

Simples, alternas, oblongo-lanceoladas, de 6 a 14 cm de largo, con borde finamente aserrado, superficie lustrosa en el haz y ramillas flexibles colgantes. Los brotes nuevos presentan tonos rojizos/bronceados característicos.



3 Tallo, rama y corteza

Corteza fisurada en placas · lenticelas visibles

Tronco erguido, a menudo ramificado a media altura en varios fustes principales; corteza áspera, de color café grisáceo con fisuras y lenticelas visibles.



4 Fruto

Drupas globosas de 1 a 2 cm de diámetro, de color rojo oscuro a morado casi negro al madurar, de sabor agridulce y comestibles.

Foto: John PC · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capul%C3%AD.JPG

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
1	1	1	alto

FICHA 09

DATOS DE LA ESPECIE

Chicalá

Tecoma stans

LC
Preocupación menor

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Chicalá
Nombres alternos	Fresno, Chirlobirlo, Guaran amarillo, Flor de San Pedro, Tronadora
Nombre científico	*Tecoma stans*
Familia	Bignoniaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Árbol o arbusto nativo de porte mediano a pequeño, muy común en parques, avenidas y zonas urbanas de Colombia. Destaca por sus vistosas racimos de flores acampanadas de color amarillo brillante y su follaje verde vivo con hojas compuestas de bordes aserrados.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol
Altura aproximada	4 a 10 metros
Hojas	Compuestas, imparipinnadas, con 5 a 13 folíolos lanceolados con margen marcadamente aserrado/dentado y ápice acuminado.
Flores	Grandes, en forma de campana o trompeta, de color amarillo intenso, agrupadas en racimos terminales vistosos.
Frutos	Cápsulas alargadas y cilíndricas (parecidas a vainas) de 10 a 20 cm de largo que se abren al madurar liberando semillas aladas.
Tronco o tallo	Tronco corto y ramificado desde baja altura, con corteza de color café claro a grisácea, ligeramente agrietada con la edad.
HÁBITAT	
Distribución	Nativo de América tropical y subtropical (desde el sur de EE. UU. hasta Argentina). Muy abundante en la región andina colombiana.
Altitud	0 a 2,800 m s. n. m. (muy adaptado al clima de valle y montaña como el de Chitagá y la provincia de Pamplona).
Clima	Templado a cálido, muy resistente a periodos de sequía una vez establecido.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Ornamental y paisajístico en plazas, parques urbanos y jardines por su constante floración. • Atracción de polinizadores (colibríes y abejas). • Uso medicinal tradicional en infusión de hojas para la diabetes y aflicciones digestivas.
Estado de conservación	Preocupación menor (LC)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• Es la flor nacional de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y una especie ornamental muy representativa en el diseño urbano de los pueblos andinos de Colombia. • Sus flores amarillas son una fuente importante de néctar para los colibríes locales durante gran parte del año.
Cuidados	Requiere pleno sol para florecer abundantemente. Se adapta a casi cualquier tipo de suelo bien drenado y tolera bien la poda de formación.
Observaciones de identificación	Las flores amarillas en trompeta (foto 2/3), las hojas compuestas de folíolos aserrados (foto 1/3) y la silueta en copa globosa decorando el parque (foto 3/3) permiten confirmar sin lugar a dudas la especie Tecoma stans (Chicalá / Fresno).
Especies similares	• Handroanthus chrysanthus (Guayacán amarillo) • Tecoma fulva (Chicalá anaranjado) • Tabebuia rosea (Guayacán rosado)

FICHA 09


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Chicalá

Tecoma stans

LC
Preocupación menor


FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Bignoniaceae	árbol	4 a 10 metros	Nativo de América tropical y subtropical (desde el sur de EE



1 Porte y forma de la copa

Redondeada, ramificada desde abajo


Porte pequeño a mediano, ramificado desde baja altura, con racimos de flores acampanadas amarillas sobre el follaje verde vivo.



2 Forma de la hoja

Compuesta · imparipinnada · 5–13 folíolos aserrados

Compuestas, imparipinnadas, con 5 a 13 folíolos lanceolados con margen marcadamente aserrado/dentado y ápice acuminado.



3 Tallo, rama y corteza

Corto · ramificado desde baja altura · algo agrietado

Tronco corto y ramificado desde baja altura, con corteza de color café claro a grisácea, ligeramente agrietada con la edad.



4 Fruto

Cápsulas alargadas y cilíndricas (parecidas a vainas) de 10 a 20 cm de largo que se abren al madurar liberando semillas aladas.

Foto: Ewen Cameron · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tecoma_stans_(L.)_Juss._ex_Humb.,_Bonpl.,_et_Kunth_(AM_AK354726-6).jpg

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
1	1	1	alto

FICHA 10

DATOS DE LA ESPECIE

Ciprés

Cupressus sp. (probablemente C. lusitanica)

LC
Preocupación menor

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Ciprés
Nombres alternos	Ciprés común, Ciprés mexicano, Pino, Pino ciprés, Pino común, Cedro blanco (México), Cedro de Goa
Nombre científico	*Cupressus* sp. (probablemente C. lusitanica)
Familia	Cupressaceae
Nivel de confianza	medio
Descripción	Conífera de follaje denso y fino. En el parque aparece tanto sin podar como trabajada en topiario.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol / arbusto según poda
Altura aproximada	1 – 15 m, según el nivel de poda de cada ejemplar
Hojas	Escamiformes, muy pequeñas, en ramillas aplanadas, verde intenso a verde amarillento
Flores	No tiene flores verdaderas: es una conífera monoica. Los estróbilos masculinos miden unos 5 mm, son numerosos, verde-amarillentos a rojizos y se forman en las puntas de las ramillas.
Frutos	Conos femeninos (gálbulas) casi esféricos, de 1 a 1,5 cm, con 6 a 8 escamas leñosas; verde-azulados y cerosos al principio, pardo oscuros y duros al madurar (unos 25 meses después de la polinización). Cada uno guarda de 75 a 120 semillas pardas de 3–4 mm.
Tronco o tallo	Tronco recto, acanalado en la base y de hasta 100–120 cm de diámetro en árboles libres. Corteza pardo-rojiza a pardo-grisácea, fibrosa y fisurada en tiras longitudinales, blanquecina por dentro. En el parque se mantiene bajo por la poda.
HÁBITAT	
Distribución	Nativa de las montañas de México y Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras). Introducida y muy plantada en las zonas altas de Colombia (Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y otras) para madera, cercas vivas, cortinas rompevientos y control de la erosión.
Altitud	Entre 1.200 y 3.000 m s. n. m. en su área natural; en Colombia se planta hasta unos 3.300 m.
Clima	Templado a frío de montaña, con temperaturas de 0 a 33 °C y lluvias de 1.500 a 2.500 mm al año. Tolera bien la sequía y los vientos.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Ornamental • Cercas vivas • Arte topiario • Madera aromática • Cortavientos
Estado de conservación	Preocupación menor (LC) según la UICN, por su amplia distribución y abundancia. En Colombia es una especie introducida, sin categoría de amenaza.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• Su nombre «lusitanica» (de Portugal) es un error histórico: hacia 1634 se llevaron árboles de México al convento de Buçaco (Portugal) y en 1768 se describió la especie a partir de ellos, creyéndola portuguesa. • Algunos botánicos la clasifican hoy en otro género, como Hesperocyparis lusitanica. • Del follaje, la corteza y los conos se extrae un aceite esencial usado en cosmética. • Su follaje denso y fino tolera podas fuertes, por eso se usa en topiaria, como el ejemplar del parque.
Cuidados	Pleno sol; suelos de textura media, profundos, bien drenados y de reacción neutra a ácida. Tolera la sequía una vez establecido. Admite podas de formación frecuentes (topiaria) gracias a su follaje denso y fino. Riego moderado y vigilancia de hongos en climas muy húmedos.
Observaciones de identificación	El ejemplar (foto 1) es una conífera de follaje muy denso podada en forma de campana; la hoja (foto 2) es escamiforme y diminuta, sobre ramillas finas, con estróbilos masculinos rojizos en las puntas; el tallo (foto 3) tiene corteza pardo-grisácea fisurada en tiras. Esto indica el género Cupressus. Se asigna a C. lusitanica por ser el ciprés más plantado en las zonas altas de Colombia, pero hace falta ver conos maduros para confirmarlo (1–1,5 cm y cerosos en C. lusitanica; 2,5–3,5 cm en C. macrocarpa).
Especies similares	• Cupressus macrocarpa (ciprés de Monterrey) — conos más grandes, de 2,5 a 3,5 cm, y follaje con olor a limón al estrujarlo. • Cupressus sempervirens (ciprés de Italia) — copa estrecha y columnar en sus formas cultivadas, y conos de 2 a 3 cm con 8 a 14 escamas. • Platycladus orientalis (tuya, presente en el parque) — ramillas aplanadas dispuestas en planos verticales, como abanicos, y conos con escamas en forma de gancho.

Los datos que no constaban en la ficha de la especie se completaron con fuentes bibliográficas; ver «Fuentes consultadas» al final del documento.

FICHA 10

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Ciprés

Cupressus sp. (probablemente C. lusitanica)

LC
Preocupación menor


FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Cupressaceae	árbol / arbusto según poda	1 – 15 m, según el nivel de poda de cada ejemplar	Introducida; muy naturalizada y cultivada en los Andes colombianos



1 Porte y forma de la copa

Cónica densa (natural o en topiario)


Conífera de follaje denso y fino, de contorno cónico cuando crece libre. En el parque aparece tanto sin podar como trabajada en topiario.



2 Forma de la hoja

Escamiformes · muy pequeñas · en ramillas aplanadas

Escamiformes, muy pequeñas, en ramillas aplanadas, verde intenso a verde amarillento



3 Tallo, rama y corteza

Corteza fibrosa en tiras longitudinales

Tronco recto, acanalado en la base y de hasta 100–120 cm de diámetro en árboles libres. Corteza pardo-rojiza a pardo-grisácea, fibrosa y fisurada en tiras longitudinales, blanquecina por dentro. En el parque se mantiene bajo por la poda.



4 Cono

Conos femeninos (gálbulas) casi esféricos, de 1 a 1,5 cm, con 6 a 8 escamas leñosas; verde-azulados y cerosos al principio, pardo oscuros y duros al madurar (unos 25 meses después de la polinización). Cada uno guarda de 75 a 120 semillas pardas de 3–4 mm.

Foto: Rohit Naniwadekar · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cupressus_lusitanica_06.jpg

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
11	11	11	medio

FICHA 11

DATOS DE LA ESPECIE

Eugenia

Syzygium paniculatum

EN
En peligro

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Eugenia
Nombres alternos	Eugenia de jardín, Mirtilo de Nueva Holanda
Nombre científico	*Syzygium paniculatum*
Familia	Myrtaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Arbusto o árbol pequeño de hoja perenne muy utilizado en el diseño paisajístico de parques urbanos por su follaje denso y compacto, ideal para la creación de setos geométricos y muros vivos. Destaca por el contraste estético entre sus hojas maduras de color verde brillante y sus brotes nuevos de tonos cobrizos o rojizos.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	arbusto
Altura aproximada	1.5 a 3 metros (en este tipo de poda de jardín; libre supera los 6 metros)
Hojas	Simples, opuestas, elípticas a lanceoladas, con una textura lisa, coriácea y brillante en el haz; las puntas de las ramas presentan brotes jóvenes de un característico color rojizo-bronceado.
Flores	Pequeñas, de color blanco o crema, agrupadas en racimos terminales con numerosos estambres finos que sobresalen de forma llamativa.
Frutos	Bayas carnosas de forma ovoide o globosa que adquieren un color rojo oscuro o púrpura brillante al completar su maduración.
Tronco o tallo	Tallos leñosos y delgados, altamente ramificados desde la base, con ramillas jóvenes lisas y de tonalidades marrón-rojizas.
HÁBITAT	
Distribución	Nativo de las selvas costeras de Australia, pero introducido de forma muy masiva en parques urbanos, plazas y separadores viales de Colombia.
Altitud	Se adapta con gran facilidad entre los 1,500 y 2,800 m s. n. m., prosperando con excelente salud en el clima andino de la provincia de Pamplona y Chitagá.
Clima	Prefiere ambientes frescos con buena exposición solar directa o semisombra ligera; tolera bien la humedad ambiental de la montaña.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Ornamental, siendo una de las especies más utilizadas para la formación de setos rectangulares, borduras densas y topiarias geométricas. • Barrera visual y rompevientos de porte bajo para delimitar espacios peatonales en plazas públicas. • Atracción de fauna benéfica como pequeñas aves e insectos polinizadores atraídos por sus flores y frutos.
Estado de conservación	En peligro (EN) en su entorno silvestre original debido a la pérdida de hábitat en Australia, pero sumamente abundante y cultivado globalmente a nivel hortícola.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• El ejemplar fotografiado forma parte del seto perimetral que decora la zona de la fuente, demostrando la alta capacidad que tiene esta planta para soportar podas constantes con tijeras de jardinería sin perder la densidad de sus hojas. • Sus frutos carnosos de color púrpura brillante son comestibles y atraen de manera constante a la avifauna local del parque durante las épocas de fructificación.
Cuidados	Requiere una ubicación con buena luz solar para favorecer que los brotes nuevos adquieran el tono cobrizo característico. Exige suelos fértiles con buen drenaje que eviten los encharcamientos prolongados y responde de forma excelente a fertilizaciones nitrogenadas después de cada poda de mantenimiento.
Observaciones de identificación	La textura densa del follaje podado en forma de bloque rectangular rodeando la fuente (foto 2/2) y el detalle en primer plano de las hojas opuestas, agudas y brillantes con pequeños brotes apicales cobrizos (foto 1/2) confirman que se trata de un seto conformado por la especie Syzygium paniculatum.
Especies similares	• Myrcia popayanensis (Arrayán común - de ramificación más rugosa y hojas de tono verde más opaco) • Photinia x fraseri (Fotinia - de hojas alternas con bordes marcadamente aserrados y brotes rojos mucho más intensos) • Buxus sempervirens (Bbox / Boj - de hojas mucho más pequeñas, redondeadas y de crecimiento considerablemente más lento)

FICHA 11

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Eugenia

Syzygium paniculatum

EN
En peligro


FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Myrtaceae	arbusto	1.5 a 3 metros	Nativo de las selvas costeras de Australia



1 Porte y forma de la copa

Seto geométrico (por poda)

Follaje denso y compacto, ideal para setos geométricos y muros vivos; en el parque forma el seto podado en bloque que rodea la fuente.



2 Forma de la hoja

Simple · opuesta · elíptica a lanceolada · brotes cobrizos


Simples, opuestas, elípticas a lanceoladas, con una textura lisa, coriácea y brillante en el haz; las puntas de las ramas presentan brotes jóvenes de un característico color rojizo-bronceado.



3 Tallo, rama y corteza

Tallos delgados muy ramificados desde la base

Tallos leñosos y delgados, altamente ramificados desde la base, con ramillas jóvenes lisas y de tonalidades marrón-rojizas.



4 Fruto

Bayas carnosas de forma ovoide o globosa que adquieren un color rojo oscuro o púrpura brillante al completar su maduración.

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
45	34	1	alto

FICHA 12

DATOS DE LA ESPECIE

Ficus benjamina

Ficus benjamina

LC
Preocupación menor

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Ficus benjamina
Nombres alternos	Ficus, Laurel de la India, Amate, Matapalo
Nombre científico	*Ficus benjamina*
Familia	Moraceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Árbol perennifolio muy popular en el paisajismo urbano de Colombia, reconocido por su copa globosa, densa y de aspecto llorón debido a sus ramas delgadas y péndulas. Posee un sistema de troncos múltiples entrelazados y ramificados desde baja altura que le confieren una estructura sumamente robusta.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol
Altura aproximada	4 a 10 metros (mantenido bajo poda constante en el parque; libre supera los 15 metros)
Hojas	Simples, alternas, de forma ovada a elíptica, lisas, coriáceas y brillantes en el haz; terminan en una punta delgada muy pronunciada (ápice acuminado). Al romperse o cortarse, secretan un látex lechoso blanco y pegajoso.
Flores	No son visibles. Sus flores son diminutas y se desarrollan en el interior de una estructura carnosa y cerrada llamada sicono.
Frutos	Siconos (falsos frutos o higos pequeños) globosos, sésiles, que cambian de color verde a amarillo o rojo purpúreo al madurar, siendo muy buscados por pequeños pájaros.
Tronco o tallo	Tronco ramificado en múltiples ejes paralelos y verticales de corteza lisa y grisácea, que a menudo desarrollan raíces aéreas que se fusionan con el tallo principal en climas húmedos.
HÁBITAT	
Distribución	Nativo del sur y sureste de Asia, así como de Australia, pero ampliamente introducido y cultivado en plazas públicas, parques y avenidas de toda Colombia.
Altitud	Se adapta muy bien desde el nivel del mar hasta los 2,600 m s. n. m., tolerando con éxito los microclimas de los valles andinos y la provincia de Pamplona.
Clima	Prefiere climas templados a cálidos y soleados; en zonas de montaña fría se beneficia de ubicaciones resguardadas frente a las heladas fuertes de invierno.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Ornamental y paisajístico en plazas y parques por su facilidad para tolerar podas arquitectónicas y su denso follaje permanente. • Provisión de sombra densa y fresca en senderos peatonales urbanos. • Refugio e importante fuente de alimento para aves e insectos locales debido a sus pequeños frutos.
Estado de conservación	Preocupación menor (LC / Especie cultivada masivamente a nivel mundial)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• Aunque su follaje superior es sumamente decorativo, su sistema de raíces es extremadamente agresivo y extendido, por lo que su siembra actual en entornos urbanos se restringe estrictamente a macetones o centros de grandes zonas verdes para evitar daños en andenes o tuberías. • El ápice alargado de sus hojas funciona como un canal de drenaje o 'punta de goteo', lo que facilita que el agua de lluvia ruede rápido y la hoja se seque, evitando la proliferación de hongos.
Cuidados	Requiere una exposición a pleno sol o semisombra. Exige suelos fértiles con muy buen drenaje y riegos moderados; tolera de manera excelente las podas de mantenimiento estructural para conservar su copa compacta y redondeada.
Observaciones de identificación	La copa globosa densamente ramificada (foto 1/3), la estructura multicaular con múltiples troncos paralelos cubiertos de musgo y líquenes (foto 2/3), y las hojas alternas, elípticas, brillantes con su característica punta alargada (foto 3/3) confirman inequívocamente la identidad de Ficus benjamina.
Especies similares	• Ficus microcarpa (Laurel de la India de hoja redonda - de hojas más cortas y obtusas) • Ficus nitida (Laurel de parques - de porte similar pero hojas de morfología apical diferente) • Ligustrum lucidum (Trueno - descartado por completo por poseer hojas opuestas y frutos en racimos terminales)

FICHA 12

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Ficus benjamina

Ficus benjamina

LC
Preocupación menor


FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Moraceae	árbol	4 a 10 metros	Nativo del sur y sureste de Asia, así como de Australia



1 Porte y forma de la copa

Globosa, densa y llorona

Copa globosa y densa, de aspecto llorón por sus ramas delgadas y péndulas, sostenida por varios troncos entrelazados que ramifican desde baja altura.



2 Forma de la hoja

Simple · alterna · ovada a elíptica · ápice acuminado · látex


Simples, alternas, de forma ovada a elíptica, lisas, coriáceas y brillantes en el haz; terminan en una punta delgada muy pronunciada (ápice acuminado). Al romperse o cortarse, secretan un látex lechoso blanco y pegajoso.



3 Tallo, rama y corteza

Varios ejes · corteza lisa grisácea · raíces aéreas

Tronco ramificado en múltiples ejes paralelos y verticales de corteza lisa y grisácea, que a menudo desarrollan raíces aéreas que se fusionan con el tallo principal en climas húmedos.



4 Fruto

Siconos (falsos frutos o higos pequeños) globosos, sésiles, que cambian de color verde a amarillo o rojo purpúreo al madurar, siendo muy buscados por pequeños pájaros.

Foto: Sten · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ficus-benjamina-fruits.JPG

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
2	2	2	alto

FICHA 13

DATOS DE LA ESPECIE

Fotinia

Photinia × fraseri

NE
No evaluado

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Fotinia
Nombres alternos	Duraznillo rojo, Fotinia de puntas rojas, Red Robin
Nombre científico	*Photinia* × *fraseri*
Familia	Rosaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Arbusto o árbol pequeño de hoja perenne muy popular en el paisajismo y la jardinería urbana. Es ampliamente reconocido por el contraste de sus brotes nuevos, que nacen con un color rojo brillante e intenso, y que luego maduran hacia un verde oscuro y brillante.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	arbusto
Altura aproximada	1.5 a 3 metros (en este tipo de poda de jardín; libre puede alcanzar los 5 metros)
Hojas	Simples, alternas, de forma elíptica o lanceolada, con una textura dura y coriácea; presentan bordes finamente aserrados y un llamativo color rojo encendido en los brotes nuevos que contrasta con el verde oscuro del follaje maduro.
Flores	Pequeñas, de color blanco o crema, agrupadas en densas inflorescencias terminales que aparecen a finales de la primavera.
Frutos	Pequeños pomos globosos de color rojo que se tornan oscuros al madurar, apetecidos por pequeñas aves.
Tronco o tallo	Tallos leñosos, ramificados desde la base para formar una barrera compacta, con corteza lisa de color grisáceo a marrón claro.
HÁBITAT	
Distribución	Es un híbrido hortícola de origen cultivado cuyos parentales provienen de Asia (China y Japón). Se encuentra ampliamente distribuido en zonas templadas y de montaña de Colombia.
Altitud	Se adapta perfectamente a climas templados y fríos (1,500 a 2,800 m s. n. m.), siendo muy común en los jardines y plazas de la provincia de Pamplona.
Clima	Prefiere climas frescos, tolera heladas ligeras y requiere una muy buena exposición solar para que los brotes nuevos intensifiquen su color rojo.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Ornamental, ideal para la formación de setos vivos, barreras visuales perimetrales o delimitación de senderos por su follaje bicolor. • Excelente tolerancia a la poda frecuente de formación para mantener estructuras geométricas compactas.
Estado de conservación	No evaluado (NE / Especie cultivada)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• Su nombre científico 'Photinia' proviene del griego 'photeinos', que significa brillante, haciendo alusión al aspecto lustroso de sus hojas. • El color rojo de las hojas nuevas actúa como un filtro solar natural que protege los tejidos jóvenes de la radiación ultravioleta antes de que desarrollen suficiente clorofila.
Cuidados	Requiere suelos fértiles, con buen drenaje y una exposición a pleno sol o semisombra ligera. La poda regular a finales del invierno es clave para estimular la salida de nuevos brotes rojos en la siguiente temporada.
Observaciones de identificación	La estructura del seto vivo podado en bloques que limita la zona del parque con el paisaje montañoso (foto 1/3) y el detalle en primer plano de las hojas de disposición alterna, bordes finamente aserrados y brotes nuevos de un rojo cobrizos brillante (fotos 2/3 y 3/3) corresponden de manera inequívoca a Photinia x fraseri.
Especies similares	• Syzygium paniculatum (Eugenia de jardín - descartada por poseer hojas estrictamente opuestas) • Abatia parviflora (Duraznillo andino - especie nativa de hojas opuestas y flores amarillas en espiga) • Acalypha wilkesiana (Gasa / Oreja de bronce - de hojas mucho más anchas y variegación perenne)

FICHA 13


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotinia

Photinia × fraseri

NE
No evaluado


FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Rosaceae	arbusto	1.5 a 3 metros	Es un híbrido hortícola de origen cultivado cuyos parentales provienen de Asia (China y Japón)



1 Porte y forma de la copa

Seto compacto (por poda)


En el parque se maneja como seto: los tallos ramificados desde la base forman una barrera compacta y continua. Sin poda es un arbusto o árbol pequeño.



2 Forma de la hoja

Simple · alterna · elíptica a lanceolada · margen aserrado · brotes rojos


Simples, alternas, de forma elíptica o lanceolada, con una textura dura y coriácea; presentan bordes finamente aserrados y un llamativo color rojo encendido en los brotes nuevos que contrasta con el verde oscuro del follaje maduro.



3 Tallo, rama y corteza

Tallos leñosos desde la base · corteza lisa

Tallos leñosos, ramificados desde la base para formar una barrera compacta, con corteza lisa de color grisáceo a marrón claro.



4 Fruto

Pequeños pomos globosos de color rojo que se tornan oscuros al madurar, apetecidos por pequeñas aves.

Foto: SAplants · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photinia_%C3%97_fraseri_cultivar_1DS-II_4-5367.jpg

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
117	118	3	alto

FICHA 14

DATOS DE LA ESPECIE

Fotinia glabra

Photinia glabra

NE
No evaluado

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Fotinia glabra
Nombres alternos	Fotinia, Fotinia de hojas rojas, Potosi
Nombre científico	*Photinia glabra*
Familia	Rosaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Arbusto grande o árbol pequeño perennifolio, muy apreciado en la jardinería ornamental urbana de la zona andina colombiana. Destaca principalmente por su follaje bicolor dinámico: los brotes nuevos y las hojas jóvenes emergen con un color rojo cobrizo o carmesí muy brillante que gradualmente madura hacia un verde oscuro lustroso, generando un constante contraste visual en la copa.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol / arbusto según poda
Altura aproximada	2 a 5 metros
Hojas	Simples, alternas, de forma elíptica u oblonga, con márgenes finamente aserrados. Las hojas jóvenes superiores son de un llamativo color rojo brillante y de textura lisa y cerosa (como se ve en la foto de detalle), mientras que las hojas inferiores más viejas son coriáceas y de color verde oscuro brillante.
Flores	Pequeñas, de color blanco o blanco-crema, con cinco pétalos, agrupadas en densas corimbas o panículas terminales anchas que florecen hacia el final de las épocas lluviosas.
Frutos	Pequeños pomos globosos de unos 5 a 8 mm de diámetro, parecidos a bayas, que pasan de verde a rojo y finalmente a un tono azul-negruzco al madurar.
Tronco o tallo	Tallo central erguido y ramificado densamente desde poca altura, ideal para podas topiarias (formas globosas o rectangulares); corteza lisa de color grisáceo a marrón claro.
HÁBITAT	
Distribución	Nativa de Asia oriental (Japón, China y Tailandia). Ampliamente introducida a nivel mundial como planta ornamental y muy frecuente en las zonas verdes, parques y antejardines de la provincia de Pamplona y el municipio de Chitagá.
Altitud	1,800 a 3,000 m s. n. m. (con excelente adaptación al clima andino de Chitagá).
Clima	Frío a templado de montaña, muy resistente a las heladas ligeras.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Uso ornamental destacado en parques públicos y plazas para crear manchas de color o puntos focales. • Formación de setos vivos, cercas densas y pantallas visuales debido a su follaje perenne y tupido. • Apta para la poda de formación estructural o topiaria (copas globosas perfectas).
Estado de conservación	No evaluado formalmente (NE), de uso exclusivamente cultivado en la región.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• El nombre genérico *Photinia* proviene de la palabra griega *photeinos*, que significa 'brillante' o 'reluciente', haciendo una clara referencia a la superficie sumamente lustrosa y encerada de sus hojas. • Cada vez que se realiza una poda en las puntas de las ramas, el arbusto estimula el crecimiento de nuevos brotes, lo que provoca una intensa 'oleada' de hojas rojas semanas después.
Cuidados	Es una planta rústica y adaptable. Prefiere suelos bien drenados y con buen aporte de materia orgánica. Requiere una exposición a pleno sol o media sombra ligera; entre más luz solar directa reciba, más intenso y brillante será el color rojo de sus hojas nuevas. Tolera muy bien las podas frecuentes de mantenimiento.
Observaciones de identificación	Se confirma el taxón *Photinia glabra* (Fotinia). En la vista general (foto 1) se aprecia un espécimen joven manejado con una poda de copa globosa o de sombrilla en medio del parque, destacando los brotes rojizos en la parte superior. En la vista de detalle (foto 2) se validan completamente sus hojas elípticas alternas, de margen finamente aserrado, con la llamativa coloración roja cobriza traslúcida y brillante típica de los brotes nuevos de este género.
Especies similares	• Photinia × fraseri (Fotinia Red Robin - híbrido de hojas nuevas rojas aún más intensas) • Syzygium paniculatum (Eugenia - de hojas opuestas y brotes rojizos más pequeños) • Prunus laurocerasus (Laurel cerezo)

FICHA 14

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotinia glabra

Photinia glabra

NE
No evaluado


FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Rosaceae	árbol / arbusto según poda	2 a 5 metros	Nativa de Asia oriental (Japón, China y Tailandia)



1 Porte y forma de la copa

Topiaria globosa

Ramificación densa desde poca altura, ideal para topiaria (formas globosas o rectangulares); el follaje es bicolor: rojo en los brotes y verde oscuro al madurar.



2 Forma de la hoja

Simple · alterna · elíptica a oblonga · aserrada · brotes rojos

Simples, alternas, de forma elíptica u oblonga, con márgenes finamente aserrados. Las hojas jóvenes superiores son de un llamativo color rojo brillante y de textura lisa y cerosa (como se ve en la foto de detalle), mientras que las hojas inferiores más viejas son coriáceas y de color verde oscuro brillante.



3 Tallo, rama y corteza

Erguido · ramificado desde poca altura · liso

Tallo central erguido y ramificado densamente desde poca altura, ideal para podas topiarias (formas globosas o rectangulares); corteza lisa de color grisáceo a marrón claro.



4 Fruto

Pequeños pomos globosos de unos 5 a 8 mm de diámetro, parecidos a bayas, que pasan de verde a rojo y finalmente a un tono azul-negruzco al madurar.

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
1	0	0	alto

FICHA 15

DATOS DE LA ESPECIE

Guanaminí

Syzygium cumini

LC
Preocupación menor

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Guanaminí
Nombres alternos	Eugenia de hoja grande, Guanaminí de jardín
Nombre científico	*Syzygium cumini*
Familia	Myrtaceae
Nivel de confianza	medio-alto
Descripción	Árbol pequeño o arbusto perennifolio robusto y muy ramificado, apreciado en el diseño paisajístico de parques andinos. Desarrolla un follaje denso y opaco con hojas firmes que presentan una nervadura central amarillenta muy marcada, y brotes nuevos de tonos rojizos ligeros.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol / arbusto según poda
Altura aproximada	3 a 6 metros (en entornos urbanos bajo manejo)
Hojas	Simples, opuestas, oblongas a elípticas, coriáceas y lisas; el haz es verde oscuro con una nervadura central recta y clara muy conspicua, mientras que los brotes apicales jóvenes nacen protegidos por estípulas cónicas de color marrón rojizo.
Flores	Pequeñas, de color blanco o verdoso, sésiles, agrupadas en inflorescencias que exponen múltiples estambres finos desprendiendo un olor tenue.
Frutos	Bayas oblongas o elipsoides que viran de color verde a violáceo oscuro o negro brillante al madurar, con pulpa jugosa.
Tronco o tallo	Tronco ramificado a muy baja altura en múltiples ejes ascendentes y torcidos, con corteza áspera de color gris claro a pardo con manchas blanquecinas por líquenes.
HÁBITAT	
Distribución	Nativo de la región tropical de Asia (India, Sri Lanka), pero ampliamente introducido y naturalizado con fines ornamentales en los parques urbanos de Colombia.
Altitud	Se adapta con éxito a climas templados y de montaña baja-media (1,200 a 2,400 m s. n. m.), prosperando en las plazas de la provincia de Pamplona.
Clima	Prefiere ambientes frescos con humedad relativa moderada, tolerando bien la exposición directa al sol y los vientos locales.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Ornamental y arquitectónico en plazas principales y zonas verdes por su copa densa que aporta volumen y estructura al paisaje. • Sombra de porte bajo en senderos peatonales y parques infantiles. • Atracción de polinizadores y pequeñas aves frugívoras locales durante su época de fructificación.
Estado de conservación	Preocupación menor (LC / Especie ampliamente cultivada)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• A diferencia de las eugenias comunes de jardín que tienen hojas pequeñas y delgadas, esta especie del género Syzygium desarrolla hojas notablemente más anchas y coriáceas, capaces de soportar climas más secos o vientos fuertes sin deshidratarse. • Pertenece a la misma gran familia botánica que el arrayán nativo, compartiendo la estructura de hojas dispuestas en pares perfectamente opuestos a lo largo de las ramillas leñosas.
Cuidados	Requiere suelos bien aireados con drenaje óptimo y buen aporte de materia orgánica. Responde de forma excelente a las podas de aclareo en las ramas internas para permitir el paso de la luz y mantener su copa limpia.
Observaciones de identificación	La estructura arbustiva multicaular (foto 1/3), la disposición de las hojas en pares opuestos con una nervadura central amarillenta muy recta y brotes jóvenes apicales cobrizos (foto 2/3), junto a las ramillas leñosas de nudos marcados (foto 3/3), son caracteres morfológicos típicos que definen a este miembro de las mirtáceas.
Especies similares	• Syzygium paniculatum (Eugenia de jardín - de hojas considerablemente más pequeñas y lanceoladas) • Citharexylum subflavescens (Cajeto - de hojas más alargadas y textura rugosa al tacto) • Ficus benjamina (Ficus ornamental - descartado por sus hojas alternas con látex blanco)

FICHA 15

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Guanaminí

Syzygium cumini

LC
Preocupación menor

FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Myrtaceae	árbol / arbusto según poda	3 a 6 metros	Nativo de la región tropical de Asia (India, Sri Lanka)



1 Porte y forma de la copa

Densa y muy ramificada


Árbol pequeño o arbusto robusto y muy ramificado, de follaje denso y opaco, con brotes nuevos de tonos rojizos.



2 Forma de la hoja

Simple · opuesta · oblonga a elíptica · nervadura central conspicua


Simples, opuestas, oblongas a elípticas, coriáceas y lisas; el haz es verde oscuro con una nervadura central recta y clara muy conspicua, mientras que los brotes apicales jóvenes nacen protegidos por estípulas cónicas de color marrón rojizo.



3 Tallo, rama y corteza

Varios ejes torcidos · corteza áspera con líquenes

Tronco ramificado a muy baja altura en múltiples ejes ascendentes y torcidos, con corteza áspera de color gris claro a pardo con manchas blanquecinas por líquenes.



4 Fruto

Bayas oblongas o elipsoides que viran de color verde a violáceo oscuro o negro brillante al madurar, con pulpa jugosa.

Foto: Vinayaraj · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syzygium_cumini_02.JPG

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
1	0	0	medio-alto

FICHA 16

DATOS DE LA ESPECIE

Liquidámbar

Liquidambar styraciflua

LC
Preocupación menor

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Liquidámbar
Nombres alternos	Estoraque, Árbol del ámbar, Ocozol
Nombre científico	*Liquidambar styraciflua*
Familia	Altingiaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Árbol caducifolio de porte elegante y crecimiento piramidal cuando es joven, muy utilizado como planta ornamental en parques y zonas urbanas de clima frío en Colombia. Es famoso por la forma estrellada de sus hojas lustrosas y, especialmente, por su vistosa coloración otoñal, donde el follaje pasa del verde brillante a tonos amarillos, naranjas, rojos y púrpuras intensos antes de caer.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol
Altura aproximada	10 a 20 metros (en entornos urbanos cultivados)
Hojas	Simples, alternas, palmeadas con 5 a 7 lóbulos apuntados en forma de estrella, con márgenes finamente aserrados. Son de un color verde biche o brillante muy vivo por el haz (como se observa en la fotografía de detalle) y desprenden un aroma agradable al estrujarlas.
Flores	Pequeñas e insignificantes, de color verde-amarillento, agrupadas en cabezuelas globosas que carecen de pétalos.
Frutos	Cápsulas leñosas y esféricas cubiertas de espinas blandas, de apariencia similar a una pequeña maza o 'bola con puntas' de unos 2 a 4 cm de diámetro, que cuelgan de un largo pedúnculo y permanecen en el árbol tras la caída de las hojas.
Tronco o tallo	Tronco erguido y cilíndrico; la corteza es de color gris-pardo, profundamente agrietada y con crestas corchosas muy características en las ramas jóvenes.
HÁBITAT	
Distribución	Nativo del este de Norteamérica, México y Centroamérica. Ampliamente introducido en la región andina colombiana debido a su alto valor paisajístico en plazas y alamedas.
Altitud	1,500 a 2,800 m s. n. m. (perfectamente adaptado a los suelos y clima de Chitagá).
Clima	Templado a frío de montaña.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Uso netamente ornamental y de sombrío en parques principales, separadores viales y proyectos de paisajismo urbano. • Su resina aromática (bálsamo de liquidámbar) se ha extraído históricamente para uso en perfumería y medicina tradicional. • Atracción de fauna menor, ya que las semillas de sus frutos colgantes sirven de alimento para diversas aves locales.
Estado de conservación	Preocupación menor (LC)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• El nombre científico deriva del latín *liquidus* (líquido) y del árabe *ambar* (sustancia aromática), haciendo referencia a la resina dulce y ambarina que brota al herir su corteza. • Es uno de los pocos árboles exóticos cultivados en Colombia que emula el cambio de color otoñal típico de las zonas templadas del norte del planeta.
Cuidados	Requiere suelos profundos, húmedos y preferiblemente ácidos, con buen drenaje. Prefiere exposición a pleno sol para desarrollar sus colores intensos. Posee raíces fuertes, por lo que debe plantarse en zonas abiertas alejado de construcciones o tuberías.
Observaciones de identificación	Se confirma el taxón *Liquidambar styraciflua* con total seguridad. En la vista general (foto 1) se aprecia un espécimen joven con su típica estructura cónica y ramificación organizada. En el plano de detalle (foto 2) se validan las hojas palmeadas de 5 lóbulos profundamente marcados, bordes aserrados y una coloración verde claro traslúcida que denota un brote vigoroso y saludable.
Especies similares	• Acer palmatum (Arce japonés - de menor porte) • Acer saccharum (Arce azucarero) • Platanus occidentalis (Plátano de sombra)

FICHA 16

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Liquidámbar

Liquidambar styraciflua

LC
Preocupación menor


FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Altingiaceae	árbol	10 a 20 metros	Nativo del este de Norteamérica, México y Centroamérica



1 Porte y forma de la copa

Piramidal de joven

Crecimiento piramidal cuando es joven. Es caducifolio: antes de caer, el follaje pasa del verde a amarillos, naranjas, rojos y púrpuras.



2 Forma de la hoja

Simple · alterna · palmeada en estrella (5–7 lóbulos) · aserrada

Simples, alternas, palmeadas con 5 a 7 lóbulos apuntados en forma de estrella, con márgenes finamente aserrados. Son de un color verde biche o brillante muy vivo por el haz (como se observa en la fotografía de detalle) y desprenden un aroma agradable al estrujarlas.



3 Tallo, rama y corteza

Erguido · corteza agrietada · crestas corchosas

Tronco erguido y cilíndrico; la corteza es de color gris-pardo, profundamente agrietada y con crestas corchosas muy características en las ramas jóvenes.



4 Fruto

Cápsulas leñosas y esféricas cubiertas de espinas blandas, de apariencia similar a una pequeña maza o 'bola con puntas' de unos 2 a 4 cm de diámetro, que cuelgan de un largo pedúnculo y permanecen en el árbol tras la caída de las hojas.

Foto: Dominicus Johannes Bergsma · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amberboom_(Liquidambar_styraciflua)._Detail._31-03-2020_(d.j.b.).jpg_03.jpg

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
1	1	1	alto

FICHA 17

DATOS DE LA ESPECIE

Magnolio

Magnolia grandiflora

LC
Preocupación menor

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Magnolio
Nombres alternos	Magnolia
Nombre científico	*Magnolia grandiflora*
Familia	Magnoliaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Árbol perennifolio nativo del sureste de Norteamérica, muy apreciado en el diseño paisajístico de plazas principales y parques andinos de Colombia. Destaca por su porte simétrico, su ramificación densa y, especialmente, por sus hojas grandes, coriáceas y muy brillantes que aportan una presencia elegante a los espacios urbanos.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol
Altura aproximada	8 a 15 metros (en cultivo urbano montañoso)
Hojas	Simples, alternas, de gran tamaño (10 a 20 cm de longitud), de forma elíptica u ovada con el margen entero y levemente ondulado; presentan una textura marcadamente coriácea (dura y rígida), con un haz verde oscuro muy brillante y un envés que frecuentemente tiene una tonalidad ferrugínea o parda.
Flores	Grandes, solitarias, de color blanco marfil o crema, en forma de copa, provistas de pétalos gruesos y carnosos con un penetrante aroma cítrico.
Frutos	Estructuras leñosas ovoides similares a una piña de pino de textura pubescente, de la cual asoman vistosas semillas de color rojo brillante al madurar.
Tronco o tallo	Tronco recto y cilíndrico con corteza lisa grisácea a marrón claro cuando es joven, que tiende a agrietarse en placas finas con los años.
HÁBITAT	
Distribución	Nativo del sureste de los Estados Unidos, pero ampliamente introducido y aclimatado en las zonas de cordillera y valles andinos de Colombia.
Altitud	Se cultiva con gran éxito entre los 1,500 y 2,800 m s. n. m., estando perfectamente adaptado a los entornos urbanos de la provincia de Pamplona y Chitagá.
Clima	Prefiere climas frescos de montaña con buena humedad y exposición regular a la radiación solar directa para su correcto desarrollo.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Altamente ornamental y arquitectónico en parques urbanos y jardines institucionales debido a la belleza permanente de su follaje. • Sombra permanente y densa ideal para zonas de descanso peatonales en plazas públicas. • Atracción de polinizadores nativos gracias al potente perfume desprendido por sus flores blancas.
Estado de conservación	Preocupación menor (LC / Especie cultivada globalmente)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• Este árbol pertenece al género *Magnolia*, el cual representa uno de los linajes de plantas con flores más primitivos del planeta, existiendo registros fósiles de estructuras idénticas de hace más de 20 millones de años. • La rigidez y el grosor ceroso de sus hojas actúan como una adaptación natural contra la pérdida de agua provocada por los vientos fríos y secos de las cordilleras.
Cuidados	Requiere suelos profundos, de tendencia ácida a neutra, ricos en materia orgánica y con excelente drenaje. Aunque tolera bien el clima frío, se beneficia de estar resguardado de heladas directas en sus etapas juveniles.
Observaciones de identificación	La disposición de las hojas alternas amontonadas en las puntas de las ramas (foto 1/2), su textura marcadamente coriácea con márgenes lisos enteros y nervadura central prominente, junto con el porte de copa globosa y ramificación despejada en la zona verde del parque (foto 2/2), corresponden precisamente a las características foliares de Magnolia grandiflora.
Especies similares	• Citharexylum subflavescens (Cajeto - descartado por sus hojas dispuestas en cruz opuesta y rugosidad al tacto) • Ficus elastica (Caucho ornamental - de hojas más grandes que secretan látex blanco al romperse) • Persea americana (Árbol de Aguacate - de hojas alternas pero de consistencia mucho más blanda)

FICHA 17

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Magnolio

Magnolia grandiflora

LC
Preocupación menor

FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Magnoliaceae	árbol	8 a 15 metros	Nativo del sureste de los Estados Unidos



1 Porte y forma de la copa

Simétrica y densa

Porte simétrico y ramificación densa; las hojas grandes, coriáceas y muy brillantes dan a la copa una presencia sólida todo el año.



2 Forma de la hoja

Simple · alterna · grande · elíptica · margen entero ondulado · coriácea

Simples, alternas, de gran tamaño (10 a 20 cm de longitud), de forma elíptica u ovada con el margen entero y levemente ondulado; presentan una textura marcadamente coriácea (dura y rígida), con un haz verde oscuro muy brillante y un envés que frecuentemente tiene una tonalidad ferrugínea o parda.



3 Tallo, rama y corteza

Recto · corteza lisa que se agrieta en placas finas

Tronco recto y cilíndrico con corteza lisa grisácea a marrón claro cuando es joven, que tiende a agrietarse en placas finas con los años.



4 Fruto

Estructuras leñosas ovoides similares a una piña de pino de textura pubescente, de la cual asoman vistosas semillas de color rojo brillante al madurar.

Foto: Meneerke bloem · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnolia_grandiflora_fruit_RHu_002.JPG

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
1	1	1	alto

FICHA 18

DATOS DE LA ESPECIE

Níspero

Eriobotrya japonica

LC
Preocupación menor

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Níspero
Nombres alternos	Níspero del Japón, Nesperón
Nombre científico	*Eriobotrya japonica*
Familia	Rosaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Árbol frutal y ornamental perennifolio de porte pequeño a mediano, ampliamente cultivado en jardines urbanos y plazas andinas de Colombia. Es muy llamativo por sus hojas grandes, duras y marcadamente corrugadas, las cuales presentan un reverso cubierto por una densa capa de vellosidades de color pardo-dorado o cobrizo.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol
Altura aproximada	4 a 8 metros
Hojas	Simples, alternas, coriáceas, de gran tamaño (15-25 cm de largo), de forma elíptica u oblonga con márgenes ligeramente dentados; el haz es verde oscuro brillante con nervaduras muy hundidas, y el envés tiene una pubescencia densa (tomento) de color café claro o cobrizo.
Flores	Pequeñas, de color blanco o crema, agrupadas en panículas terminales densas y vellosas que desprenden un aroma dulce y agradable.
Frutos	Pomos ovalados o globosos de piel amarilla o anaranjada al madurar, con pulpa carnosa, agridulce y comestible que resguarda de 1 a 4 semillas grandes y brillantes de color café.
Tronco o tallo	Tronco corto con corteza grisácea y lisa, ramificado a baja altura en múltiples ejes que forman una copa redondeada y densa; las ramillas jóvenes están cubiertas por un vello lanoso.
HÁBITAT	
Distribución	Nativo del sudeste de China y Japón, pero introducido y perfectamente adaptado a las regiones templadas y frías de la cordillera de los Andes colombianos.
Altitud	1,200 a 2,600 m s. n. m., prosperando con gran éxito en el clima de montaña de Chitagá y la provincia de Pamplona.
Clima	Prefiere climas frescos de montaña; aunque tolera bien las bajas temperaturas, requiere buena radiación solar para asegurar una óptima maduración de sus frutos.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Producción frutal gracias a sus frutos comestibles ricos en azúcares, vitaminas y minerales. • Ornamental y paisajístico en parques urbanos y jardines por el contraste bicolor de su follaje y su copa densa. • Sombra permanente de porte bajo idónea para plazas públicas y senderos peatonales.
Estado de conservación	Preocupación menor (LC / Especie ampliamente cultivada globalmente)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• A diferencia de la gran mayoría de los árboles frutales comerciales, el níspero del Japón florece a finales del otoño o principios del invierno, y sus frutos maduran a finales del invierno o principios de la primavera. • El denso vello lanoso que recubre el envés de sus hojas y sus brotes nuevos actúa como un escudo natural que protege los tejidos de los vientos helados de la montaña y evita la pérdida excesiva de humedad.
Cuidados	Requiere una exposición a pleno sol o semisombra ligera. Exige suelos profundos, bien drenados y ricos en materia orgánica; responde muy bien a podas sanitarias y de aclareo tras finalizar la cosecha de frutos para mantener la copa compacta.
Observaciones de identificación	El marcado contraste entre el haz verde oscuro y el envés pubescente de color café-cobrizo con nervaduras paralelas muy prominentes (foto 1/3), la disposición de las hojas en los extremos de las ramas vellosas (foto 2/3), y el porte de copa baja y redondeada en la zona verde del parque (foto 3/3) corresponden de manera inequívoca al Níspero del Japón.
Especies similares	• Magnolia grandiflora (Magnolio - descartado por sus hojas de borde completamente liso y flores gigantes) • Ficus nota (Higuera nativa - de hojas alternas pero de consistencia diferente y sin tomento cobrizo denso) • Vismia baccifera (Carate / Punta de lanza - de hojas opuestas que secretan látex anaranjado)

FICHA 18

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Níspero

Eriobotrya japonica

LC
Preocupación menor

FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Rosaceae	árbol	4 a 8 metros	Nativo del sudeste de China y Japón



1 Porte y forma de la copa

Redondeada y densa

Ramifica a baja altura en varios ejes que forman una copa redondeada y densa; las hojas grandes y corrugadas, con envés cobrizo, la hacen muy reconocible.



2 Forma de la hoja

Simple · alterna · elíptica a oblonga · dentada · nervaduras hundidas


Simples, alternas, coriáceas, de gran tamaño (15-25 cm de largo), de forma elíptica u oblonga con márgenes ligeramente dentados; el haz es verde oscuro brillante con nervaduras muy hundidas, y el envés tiene una pubescencia densa (tomento) de color café claro o cobrizo.



3 Tallo, rama y corteza

Corto · corteza lisa grisácea · varios ejes

Tronco corto con corteza grisácea y lisa, ramificado a baja altura en múltiples ejes que forman una copa redondeada y densa; las ramillas jóvenes están cubiertas por un vello lanoso.



4 Fruto

Pomos ovalados o globosos de piel amarilla o anaranjada al madurar, con pulpa carnosa, agridulce y comestible que resguarda de 1 a 4 semillas grandes y brillantes de color café.

Foto: Zeynel Cebeci · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eriobotrya_japonica_-_Yenid%C3%BCnya.JPG

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
1	1	1	alto

FICHA 19

DATOS DE LA ESPECIE

Palma canaria

Phoenix canariensis

LC
Preocupación menor

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Palma canaria
Nombres alternos	Palma datilera, Palmera canaria, Palma de Canarias, Palma fénix, Palma de dátil de las Canarias
Nombre científico	*Phoenix canariensis*
Familia	Arecaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Palma de tronco grueso, marcado con las bases romboidales de hojas caídas (patrón de escamas), y corona densa y amplia.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	palma
Altura aproximada	10 – 15 m
Hojas	Frondas pinnadas grandes (hasta 4–5 m), con numerosos foliolos rígidos a ambos lados del raquis
Flores	Muy pequeñas, de color crema, agrupadas en inflorescencias ramificadas que nacen entre las hojas, protegidas por una espata. Es dioica: las palmas femeninas forman racimos abiertos de hasta 2 m y las masculinas racimos en forma de escoba. La polinización es por el viento.
Frutos	Dátiles pequeños, ovoides, de unos 2 cm de largo y 1 cm de diámetro, de color amarillo a anaranjado al madurar, con una sola semilla grande. La pulpa es comestible, pero poco apreciada; se usa como alimento para el ganado y la dispersan las aves.
Tronco o tallo	Tronco único, sin hijuelos, robusto y de 50 a 120 cm de diámetro, de color gris a marrón, cubierto por las cicatrices romboidales de las bases de las hojas caídas. Normalmente mide de 10 a 20 m de altura y en la base puede tener raíces aéreas.
HÁBITAT	
Distribución	Nativa de las Islas Canarias (España), donde forma palmerales en barrancos y laderas con agua subterránea temporal. Se cultiva como ornamental en todo el mundo; en Colombia está registrada en Antioquia, Bogotá, Boyacá y Cundinamarca.
Altitud	En Colombia se cultiva entre 1.500 y 2.600 m s. n. m.
Clima	Mediterráneo y subtropical; tolera bien la sequía y heladas ligeras (hasta unos −10 °C en ejemplares adultos). Prefiere pleno sol.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Ornamental • Punto de referencia paisajística en plazas
Estado de conservación	Preocupación menor (LC) según la UICN. En Canarias es una especie protegida, amenazada por la hibridación con la palmera datilera, el picudo rojo y los incendios.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• Es el símbolo vegetal de las Islas Canarias por la Ley 7/1991. • Puede mantener entre 75 y 125 hojas vivas al mismo tiempo, cada una de 4 a 6 m de largo; se registró un ejemplar con 443 hojas verdes. • En La Gomera se extrae la savia para preparar miel de palma (guarapo). • Es muy longeva: los ejemplares más altos pueden superar los 200 años. • Aunque a veces se le llama «palma datilera», la verdadera palmera datilera es Phoenix dactylifera.
Cuidados	Pleno sol y suelos bien drenados (se adapta a casi cualquier tipo). Riego moderado, menor en época fría, porque el exceso de agua pudre las raíces. Crece despacio, hasta unos 60 cm por año. Se poda solo la hoja seca de la base, desinfectando las herramientas entre una palma y otra para no transmitir la fusariosis (Fusarium oxysporum f. sp. canariensis). Vigilar el picudo de las palmas (Rhynchophorus palmarum en América y R. ferrugineus en otras regiones), que ataca la yema apical.
Observaciones de identificación	La foto del ejemplar (foto 1) muestra una palma de tronco único, muy grueso y recto, con una corona densa y casi esférica de numerosas hojas pinnadas arqueadas de color verde intenso; la foto del tallo (foto 3) muestra las cicatrices romboidales de las bases de las hojas caídas, y la de la hoja (foto 2) los foliolos rígidos y puntiagudos a ambos lados del raquis. La ausencia de hijuelos en la base y el tronco grueso la distinguen de la palmera datilera (Phoenix dactylifera).
Especies similares	• Phoenix dactylifera (palmera datilera) — produce hijuelos en la base y a lo largo del tronco; hojas rígidas, ascendentes y de color verde grisáceo (glaucas). • Phoenix sylvestris (palmera de la India) — también de tronco solitario, pero más delgado (hasta unos 45 cm de diámetro), con hojas gris-azuladas y más numerosas.

Los datos que no constaban en la ficha de la especie se completaron con fuentes bibliográficas; ver «Fuentes consultadas» al final del documento.

FICHA 19

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Palma canaria

Phoenix canariensis

LC
Preocupación menor


FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Arecaceae	palma	10 – 15 m	Nativa de las Islas Canarias; introducida como ornamental en Colombia



1 Porte y forma de la copa

Corona densa y amplia

Corona densa y amplia de frondas grandes y arqueadas, que forman un penacho casi esférico sobre el tronco.



2 Forma de la hoja

Compuesta · pinnada · foliolos rígidos

Frondas pinnadas grandes (hasta 4–5 m), con numerosos foliolos rígidos a ambos lados del raquis



3 Tallo, rama y corteza

Tronco grueso · bases foliares romboidales

Tronco único, sin hijuelos, robusto y de 50 a 120 cm de diámetro, de color gris a marrón, cubierto por las cicatrices romboidales de las bases de las hojas caídas. Normalmente mide de 10 a 20 m de altura y en la base puede tener raíces aéreas.



4 Fruto

Dátiles pequeños, ovoides, de unos 2 cm de largo y 1 cm de diámetro, de color amarillo a anaranjado al madurar, con una sola semilla grande. La pulpa es comestible, pero poco apreciada; se usa como alimento para el ganado y la dispersan las aves.

Foto: Zeynel Cebeci · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canary_Island_date_palm_-_Phoenix_canariensis_01.jpg

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
—	1	1	alto

FICHA 20

DATOS DE LA ESPECIE

Palma de cera del Quindío

Ceroxylon quindiuense

VU
Vulnerable

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Palma de cera del Quindío
Nombres alternos	Palma de cera, Palma de ramo, Chonta
Nombre científico	*Ceroxylon quindiuense*
Familia	Arecaceae
Nivel de confianza	medio-alto
Descripción	Palmera nacional de Colombia. Tronco esbelto, blanco grisáceo, con anillos horizontales marcados; copa pequeña respecto a la altura total.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	palma
Altura aproximada	Puede superar los 30 m
Hojas	Pinnadas, de 3 a 5 m, hojuelas linear-lanceoladas verde oscuro en el haz y blanco ceroso en el envés
Flores	Pequeñas y blanquecinas, agrupadas en inflorescencias interfoliares muy ramificadas, de hasta unos 2 m, sostenidas por un pedúnculo largo. Es una especie dioica: hay palmas con flores masculinas (estaminadas) y palmas con flores femeninas (pistiladas). Cada flor abre durante 2 a 3 días.
Frutos	Drupas globosas y lisas de 1,6 a 2 cm de diámetro, verdes y luego rojo-anaranjadas al madurar, con una sola semilla. Una infructescencia lleva en promedio unos 4.465 frutos, que maduran de 7 a 13 meses después de la floración.
Tronco o tallo	Estípite único, recto y cilíndrico, de hasta unos 36 cm de diámetro, liso y cubierto de una capa de cera blanquecina; las cicatrices de las hojas caídas forman anillos oscuros a lo largo del tronco. Puede superar los 45 m de altura y excepcionalmente los 60 m.
HÁBITAT	
Distribución	Andes de Colombia y Perú. En Colombia crece en bosques húmedos de montaña de las cordilleras, con las poblaciones más grandes en la Cordillera Central (Quindío, Tolima, Risaralda, Antioquia), y está registrada en 14 departamentos. Se cultiva como ornamental en parques y avenidas.
Altitud	Entre 2.000 y 3.100 m s. n. m. en su hábitat natural; registros en Colombia desde 1.550 m.
Clima	Frío y húmedo de montaña, con neblina frecuente. En la Cordillera Central las lluvias son bimodales: el periodo más lluvioso va de junio a noviembre y el más seco de febrero a marzo.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Ornamental • Símbolo nacional • Obtención histórica de cera para velas • Hojas usadas en semana santa
Estado de conservación	Vulnerable (VU) en la Lista Roja de la UICN (evaluación de 1998, sin actualizar) y En Peligro (EN) en el Libro Rojo de Plantas de Colombia. La amenazan la transformación de su hábitat por la ganadería y la agricultura y, históricamente, la extracción de hojas para el Domingo de Ramos.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• Es el árbol nacional de Colombia por la Ley 61 de 1985. • Es la palma más alta del mundo y la monocotiledónea de mayor altura registrada: puede alcanzar 60 m. • Su nombre viene de la cera del tronco, que en el siglo XIX se raspaba para fabricar velas. • Crece muy despacio (una hoja nueva cada 69 días) y puede tardar unos 70 años en llegar a la madurez. Sus frutos alimentan a tucanes, mirlas y al loro orejiamarillo, especie amenazada.
Cuidados	Se propaga solo por semilla, que tarda de 9 a 14 meses en germinar. De joven crece mejor con sombra parcial y humedad constante; adulta tolera pleno sol. Necesita suelos profundos, húmedos y bien drenados y clima frío de montaña. Es especie protegida: no se deben cortar sus hojas para ramos.
Observaciones de identificación	El ejemplar (foto 1) es una palma solitaria muy alta, de estípite delgado, cilíndrico y no engrosado, con copa pequeña de hojas pinnadas; el tallo (foto 3) es blanquecino y ceroso, con anillos oscuros de las hojas caídas. Esto confirma el género Ceroxylon y descarta a C. ventricosum; la talla y su uso en los Andes colombianos apuntan a C. quindiuense. Para confirmarla, revisar las pinnas y los frutos maduros.
Especies similares	• Ceroxylon ventricosum — estípite engrosado (ventricoso) en la parte media, también cubierto de cera blanca. • Ceroxylon vogelianum — palma más pequeña (3–17 m), con las pinnas dispuestas de forma irregular en varios planos. • Ceroxylon alpinum — de 90 a 110 pinnas por lado, ordenadas en un solo plano, con la punta del raquis torcida que las deja en posición vertical.

Los datos que no constaban en la ficha de la especie se completaron con fuentes bibliográficas; ver «Fuentes consultadas» al final del documento.

FICHA 20

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Palma de cera del Quindío

Ceroxylon quindiuense

VU
Vulnerable

FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Arecaceae	palma	Puede superar los 30 m	Nativa de los Andes colombianos



1 Porte y forma de la copa

Penacho terminal pequeño

Copa pequeña en proporción a la altura total: un penacho terminal de hojas pinnadas arqueadas en lo alto del estípite. Es la palma nacional de Colombia.



2 Forma de la hoja

Compuesta · pinnada · hojuelas linear-lanceoladas · envés blanco ceroso

Pinnadas, de 3 a 5 m, hojuelas linear-lanceoladas verde oscuro en el haz y blanco ceroso en el envés



3 Tallo, rama y corteza

Estípite esbelto · liso · anillado

Estípite único, recto y cilíndrico, de hasta unos 36 cm de diámetro, liso y cubierto de una capa de cera blanquecina; las cicatrices de las hojas caídas forman anillos oscuros a lo largo del tronco. Puede superar los 45 m de altura y excepcionalmente los 60 m.

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
10	10	10	medio-alto

FICHA 21

DATOS DE LA ESPECIE

Pino pátula

Pinus patula

LC
Preocupación menor

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Pino pátula
Nombres alternos	Pino pátula (poda sombrilla), Pino llorón, Pino candelabro, Pino triste, Pino mexicano
Nombre científico	*Pinus patula*
Familia	Pinaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Conífera de gran porte introducida en Colombia, caracterizada por sus acículas largas y péndulas que le confieren un aspecto llorón o triste. El ejemplar fotografiado ha sido manejado mediante podas de formación arquitectónica (topiaria) para darle una silueta compacta en forma de hongo o sombrilla.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol (conífera)
Altura aproximada	3 a 5 metros (mantenido bajo por poda; sin manejo supera los 30 metros)
Hojas	Acículas largas (de 15 a 30 cm de longitud), delgadas, agrupadas en fascículos generalmente de 3 a 5, marcadamente péndulas, colgantes y de un color verde claro brillante.
Flores	No produce flores verdaderas. Posee estructuras reproductivas en forma de estróbilos o conos unisexuales en el mismo árbol.
Frutos	Conos leñosos (piñas) de forma ovada-cónica, asimétricos, de 7 a 12 cm de largo, agrupados en verticilos que permanecen cerrados en las ramas durante años antes de liberar las semillas aladas.
Tronco o tallo	Tronco recto y cilíndrico; en este ejemplar es corto debido a la altura de la poda. Su corteza es escamosa, agrietada, de color café rojizo a grisácea en la madurez.
HÁBITAT	
Distribución	Nativo de las zonas montañosas de México, pero ampliamente introducido y plantado en Colombia con fines de reforestación comercial y paisajismo urbano.
Altitud	Se adapta excelentemente bien entre los 1,800 y 3,200 m s. n. m., prosperando con gran vigor en el clima de la provincia de Pamplona y Chitagá.
Clima	Frío a templado húmedo, muy tolerante a las nieblas constantes y resistente a las heladas ligeras de la alta montaña.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Ornamental y paisajístico en plazas principales, parques y áreas verdes urbanas gracias al atractivo estético que ofrece su follaje péndulo bajo poda ornamental. • Comercial y forestal en plantaciones de gran escala para la obtención de madera y pulpa de papel. • Protección de laderas contra la erosión eólica en zonas andinas despejadas.
Estado de conservación	Preocupación menor (LC / Especie ampliamente cultivada globalmente)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• Su follaje tiene la particularidad de recolectar la humedad de la neblina andina; las gotas de agua corren a lo largo de las largas acículas colgantes cayendo directamente sobre su zona de raíces. • Aunque es una especie de crecimiento sumamente rápido y muy decorativa bajo poda estricta, en ecosistemas silvestres de alta montaña su dispersión sin control puede desplazar la vegetación nativa debido al sombreado denso y la acumulación de hojarasca ácida.
Cuidados	Requiere una ubicación a pleno sol para mantener un follaje denso y vigoroso. Exige suelos de tendencia ácida, sueltos y con muy buen drenaje; resiste bien los vientos fríos andinos y necesita podas de mantenimiento regulares para conservar la geometría de sombrilla.
Observaciones de identificación	La llamativa silueta podada en forma de hongo o domo perfecto integrado al diseño del parque (foto 1/2) y el detalle en primer plano de las acículas muy largas, delgadas y completamente péndulas que caen en cascada (foto 2/2) son rasgos morfológicos inequívocos de la especie Pinus patula.
Especies similares	• Pinus radiata (Pino monterrey - de acículas más cortas y rígidas, no péndulas) • Pinus oocarpa (Pino de ocote - de hojas erectas y rígidas) • Retrophyllum rospigliosii (Pino romerón - descartado por completo por la forma de sus hojas aplanadas)

FICHA 21

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Pino pátula

Pinus patula

LC
Preocupación menor

FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Pinaceae	árbol (conífera)	3 a 5 metros	Nativo de las zonas montañosas de México



1 Porte y forma de la copa

En sombrilla (por poda topiaria)

Sin manejo es una conífera de gran porte y aspecto llorón. El ejemplar del parque está podado (topiaria) con silueta compacta de hongo o sombrilla.



2 Forma de la hoja

Acículas largas (15–30 cm) · fascículos de 3 a 5 · péndulas

Acículas largas (de 15 a 30 cm de longitud), delgadas, agrupadas en fascículos generalmente de 3 a 5, marcadamente péndulas, colgantes y de un color verde claro brillante.



3 Tallo, rama y corteza

Recto · corteza escamosa y agrietada

Tronco recto y cilíndrico; en este ejemplar es corto debido a la altura de la poda. Su corteza es escamosa, agrietada, de color café rojizo a grisácea en la madurez.



4 Cono

Conos leñosos (piñas) de forma ovada-cónica, asimétricos, de 7 a 12 cm de largo, agrupados en verticilos que permanecen cerrados en las ramas durante años antes de liberar las semillas aladas.

Foto: Dick Culbert · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinus_patula,_UC_Berkeley_Botanical_Gardens_2.jpg

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
1	1	1	alto

FICHA 22

DATOS DE LA ESPECIE

Pino romerón

Retrophyllum rospigliosii

LC
Preocupación menor

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Pino romerón
Nombres alternos	Pino colombiano, Pino de pasto, Pino chaquiro, Romerón, Hayuelo
Nombre científico	*Retrophyllum rospigliosii*
Familia	Podocarpaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Conífera nativa de los Andes de porte mediano a grande, muy valorada en el paisajismo urbano y rural de Colombia. Destaca por su copa densa, globosa y de un color verde oscuro brillante, sostenida por un tronco robusto que ramifica a baja altura en entornos despejados.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol (conífera)
Altura aproximada	15 a 30 metros
Hojas	Simples, aplanadas, dispuestas de forma opuesta y dísticas (en un solo plano), asemejándose a pequeñas ramitas de romero con un tono verde profundo.
Flores	No produce flores verdaderas. Al ser una conífera, presenta estructuras reproductivas en forma de estróbilos o conos axilares.
Frutos	No produce frutos verdaderos. Desarrolla semillas cubiertas por una estructura carnosa ovalada (epimacio) de color verde que se torna rojiza o purpúrea al madurar.
Tronco o tallo	Tronco recto y cilíndrico con corteza de color café grisáceo que se desprende en láminas alargadas con el paso del tiempo.
HÁBITAT	
Distribución	Nativo de la región andina de Suramérica (Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú). Es un árbol emblemático de los bosques de niebla colombianos.
Altitud	1,500 a 3,200 m s. n. m. (altamente adaptado a zonas montañosas como la provincia de Pamplona y Chitagá).
Clima	Frío a templado húmedo, con alta nubosidad y requerimiento de suelos bien drenados.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Ornamental y paisajístico en parques, plazas públicas y amplias avenidas por su imponente follaje. • Protección de cuencas hidrográficas y restauración de bosques nativos andinos. • Históricamente utilizado en ebanistería fina por la excelente calidad de su madera (práctica hoy regulada).
Estado de conservación	Preocupación menor (LC) globalmente, aunque protegido a nivel local en varias reservas colombianas debido a la deforestación histórica.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• Es una de las pocas coníferas verdaderamente nativas de Colombia, conviviendo activamente en ecosistemas andinos junto a los robles y los frailejones en zonas de transición. • A diferencia de los pinos introducidos (como el pino pátula), el pino romerón no acidifica los suelos y promueve la retención de agua y el retorno de la fauna local.
Cuidados	Requiere suelos profundos, húmedos pero con buen drenaje, y una exposición de semisombra en sus etapas juveniles, tolerando el pleno sol al madurar. Es muy resistente a los vientos fríos de montaña.
Observaciones de identificación	La silueta robusta de copa globosa y densa, el follaje característico de verde oscuro ramificado y su ubicación ornamental en un espacio público andino (frente a la arquitectura tradicional y el local de SuperGIROS) permiten asociar este ejemplar a la especie Retrophyllum rospigliosii.
Especies similares	• Podocarpus oleifolius (Pino chaqueño / Chaquiro) • Prumnopitys montana (Pino hayuelo) • Retrophyllum piresii (Pino amazónico)

FICHA 22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Pino romerón

Retrophyllum rospigliosii

LC
Preocupación menor


FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Podocarpaceae	árbol (conífera)	15 a 30 metros	Nativo de la región andina de Suramérica (Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú)



1 Porte y forma de la copa

Globosa, densa, verde oscuro


Copa densa y globosa, de verde oscuro brillante, sobre un tronco robusto que ramifica a baja altura cuando crece en espacios abiertos.



2 Forma de la hoja

Simples · aplanadas · opuestas y dísticas

Simples, aplanadas, dispuestas de forma opuesta y dísticas (en un solo plano), asemejándose a pequeñas ramitas de romero con un tono verde profundo.



3 Tallo, rama y corteza

Recto · corteza en láminas alargadas

Tronco recto y cilíndrico con corteza de color café grisáceo que se desprende en láminas alargadas con el paso del tiempo.



4 Semilla

No produce frutos verdaderos. Desarrolla semillas cubiertas por una estructura carnosa ovalada (epimacio) de color verde que se torna rojiza o purpúrea al madurar.

Foto: Paúl Gonzáles · CC BY 4.0 · iNaturalist
https://www.inaturalist.org/observations/299379449

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
1	1	1	alto

FICHA 23

DATOS DE LA ESPECIE

Pitosporo

Pittosporum undulatum

LC
Preocupación menor

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Pitosporo
Nombres alternos	Pitosporo de hojas onduladas, Pitosporo dulce, Naranjo de la China, Pitosporo victoriano, Laurel de Australia
Nombre científico	*Pittosporum undulatum*
Familia	Pittosporaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Árbol o arbusto grande de hoja perenne muy utilizado como planta ornamental y de sombra en parques, plazas e hileras urbanas de la zona andina de Colombia. Posee una copa frondosa, ramificada y redonda que genera una sombra tupida. Sus hojas son lustrosas, de bordes suavemente ondulados y acuminadas en la punta. Sus flores son pequeñas, de color blanco-crema y muy aromáticas, seguidas de frutos esféricos de color verde que tornan a un naranja vistoso al madurar.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol
Altura aproximada	6 a 12 metros
Hojas	Simples, alternas o agrupadas en falsos verticilos al final de las ramillas, de forma oblanceolada a elíptica, de 6 a 15 cm de largo, con bordes marcadamente ondulados y superficie brillante.
Flores	Pequeñas, acampanadas, de 1 a 1.5 cm, de color blanco a crema, dispuestas en pequeñas umbelas terminales. Tienen un aroma dulzón muy intenso, similar al azahar.
Frutos	Cápsulas ovoides o globosas de aproximadamente 1 a 1.5 cm, que inician de color verde (como se observa en la fotografía) y maduran a un color anaranjado brillante, abriéndose en dos valvas para exponer semillas pegajosas.
Tronco o tallo	Tronco erguido, habitualmente dividido desde baja o media altura en varios fustes principales; corteza lisa a ligeramente fisurada de color gris claro a castaño.
HÁBITAT	
Distribución	Nativo del este de Australia, ampliamente cultivado e introducido en zonas frías y templadas de Colombia y la región andina (muy frecuente en parques de la provincia de Pamplona y Chitagá).
Altitud	1,800 a 3,000 m s. n. m. (plenamente adaptado a la altitud de Chitagá).
Clima	Frío a templado de montaña.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Árbol ornamental y de sombrío en parques principales, alamedas y jardines. • Formación de cercas vivas y barreras contra el viento. • Sus flores fragantes son fuente atractiva para abejas y polinizadores.
Estado de conservación	Preocupación menor (LC)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• El nombre genérico *Pittosporum* proviene del griego *pitta* (pez/resina) y *spora* (semilla), haciendo referencia a la capa de resina viscosa y pegajosa que recubre sus semillas. • Sus flores desprenden una fragancia intensa especialmente al atardecer y durante la noche.
Cuidados	Planta sumamente resistente y rústica. Prefiere exposición a pleno sol o media sombra y tolera bien las podas de formación y los vientos de montaña.
Observaciones de identificación	Con la precisión del nombre popular 'pitosporo' usado localmente en el municipio, se confirma *Pittosporum undulatum*. En la vista cercana (foto 1) se distinguen claramente las hojas elípticas con bordes ondulados distintivos agrupadas al final de los brotes y los frutos globosos inmaduros verdosos pedunculados saliendo de los ápices, mientras que en la vista general (foto 2) se aprecia la copa tupida, ramificada y globosa característica de los pitosporos adultos plantados en plazas urbanas.
Especies similares	• Pittosporum tobira (Pitosporo del Japón) • Daphnopsis caracasana (Lobero / Majagua) • Myrsine guianensis (Cucharo)

FICHA 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Pitosporo

Pittosporum undulatum

LC
Preocupación menor


FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Pittosporaceae	árbol	6 a 12 metros	Nativo del este de Australia



1 Porte y forma de la copa

Redonda y frondosa


Copa frondosa, ramificada y redonda que da una sombra tupida; por eso se usa mucho como árbol de sombra en plazas.



2 Forma de la hoja

Simple · en falsos verticilos · oblanceolada · margen ondulado


Simples, alternas o agrupadas en falsos verticilos al final de las ramillas, de forma oblanceolada a elíptica, de 6 a 15 cm de largo, con bordes marcadamente ondulados y superficie brillante.



3 Tallo, rama y corteza

Varios fustes · corteza lisa a algo fisurada

Tronco erguido, habitualmente dividido desde baja o media altura en varios fustes principales; corteza lisa a ligeramente fisurada de color gris claro a castaño.



4 Fruto

Cápsulas ovoides o globosas de aproximadamente 1 a 1.5 cm, que inician de color verde (como se observa en la fotografía) y maduran a un color anaranjado brillante, abriéndose en dos valvas para exponer semillas pegajosas.

Foto: Rexness · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pittosporum_undulatum_berries_(4579817225).jpg

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
1	1	1	alto

FICHA 24

DATOS DE LA ESPECIE

Roble australiano

Grevillea robusta

LC
Preocupación menor

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Roble australiano
Nombres alternos	Roble de Australia, Grevilia, Árbol de fuego, Pino de oro, Roble sedoso
Nombre científico	*Grevillea robusta*
Familia	Proteaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Árbol perennifolio de gran porte y crecimiento rápido, originario de Australia y ampliamente introducido en el paisaje urbano andino de Colombia. Destaca por su silueta esbelta, inicialmente piramidal, y por sus hojas profundamente divididas que recuerdan a las de los helechos, coronando plazas con un follaje ligero y elegante.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol
Altura aproximada	15 a 25 metros (en cultivo urbano montañoso)
Hojas	Simples pero profundamente laciniadas o pinnatífidas (divididas en lóbulos alargados y estrechos), de 15 a 30 cm de largo; presentan un haz de color verde oscuro brillante y un envés pubescente de tonalidad gris-plateada o blancuzca.
Flores	Muy vistosas y ricas en néctar; se agrupan en densos racimos unilaterales (con forma de peine) de color amarillo dorado o anaranjado brillante que contrastan fuertemente con el follaje a finales de la primavera.
Frutos	Cápsulas leñosas aplanadas (folículos) de color café al madurar, arqueadas y provistas de una punta curva persistente, que resguardan en su interior dos semillas aladas.
Tronco o tallo	Tronco recto, robusto y cilíndrico, con una corteza rugosa, fisurada y reticulada de color grisáceo a marrón claro.
HÁBITAT	
Distribución	Nativo de la franja costera oriental de Australia, pero introducido a nivel mundial en regiones tropicales y subtropicales. Muy común en avenidas y parques principales del interior de Colombia.
Altitud	Se adapta excelentemente bien en zonas altas andinas entre los 1,000 y 2,800 m s. n. m., acoplándose al clima montañoso de la provincia de Pamplona y Chitagá.
Clima	Templado a frío húmedo, resistente a periodos moderados de sequía una vez establecido, aunque sus ramas son algo quebradizas ante vientos montañosos extremos.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Ornamental y paisajístico en plazas públicas, parques urbanos y campus universitarios debido a su porte majestuoso y llamativa floración dorada. • Sombra perenne en sistemas agroforestales (tradicionalmente usado para sombrío de cultivos de café y té). • Atracción de fauna local, sirviendo como una fuente invaluable de alimento para abejas melíferas y aves insectívoras/frugívoras gracias a su abundante néctar. • Madera, utilizada en ebanistería fina e instrumentos musicales gracias a su resistencia a la pudrición y su veteado sedoso.
Estado de conservación	Preocupación menor (LC) globalmente debido a su masiva domesticación urbana, aunque se considera escaso en sus reductos boscosos nativos de origen.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• Aunque popularmente se le asocie el término 'pino de oro' por sus flores o 'roble sedoso' por el aspecto de su madera labrada, no guarda parentesco botánico con los pinos auténticos ni con los robles nativos americanos. • El contacto directo con su savia o el aserrín de su madera puede causar dermatitis o irritaciones alérgicas en la piel de personas sensibles debido a compuestos químicos de defensa de la planta.
Cuidados	Requiere una exposición directa a pleno sol y prefiere suelos profundos, ligeros y con un óptimo drenaje para evitar encharcamientos. Se recomienda realizar podas de limpieza estructural en ejemplares jóvenes de parques peatonales para retirar ramas bajas quebradizas antes de las épocas de ventiscas.
Observaciones de identificación	El primer plano del follaje profundamente dividido en segmentos alargados y colgantes similares a frondas de helecho (foto 1/2), junto con el porte erguido de tronco recto y corteza reticulada grisácea en la zona central del parque (foto 2/2), descartan coníferas u otros árboles de hojas enteras y confirman la morfología clásica de Grevillea robusta.
Especies similares	• Grevillea baileyana (Roble blanco australiano - de hojas menos divididas y flores blancas) • Jacaranda mimosifolia (Gualanday / Jacarandá - de follaje finamente compuesto similar pero con espectaculares flores moradas) • Delonix regia (Flamboyán / Árbol de fuego verdadero - de hojas compuestas y flores rojas, restringido a climas mucho más cálidos)

FICHA 24

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Roble australiano

Grevillea robusta

LC
Preocupación menor


FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Proteaceae	árbol	15 a 25 metros	Nativo de la franja costera oriental de Australia



1 Porte y forma de la copa

Esbelta, piramidal de joven


Silueta esbelta, piramidal cuando es joven; el follaje dividido, parecido al de un helecho, le da a la copa un aspecto ligero.



2 Forma de la hoja

Simple · profundamente pinnatífida · envés gris-plateado


Simples pero profundamente laciniadas o pinnatífidas (divididas en lóbulos alargados y estrechos), de 15 a 30 cm de largo; presentan un haz de color verde oscuro brillante y un envés pubescente de tonalidad gris-plateada o blancuzca.



3 Tallo, rama y corteza

Recto y robusto · corteza fisurada en red

Tronco recto, robusto y cilíndrico, con una corteza rugosa, fisurada y reticulada de color grisáceo a marrón claro.



4 Fruto

Cápsulas leñosas aplanadas (folículos) de color café al madurar, arqueadas y provistas de una punta curva persistente, que resguardan en su interior dos semillas aladas.

Foto: RickP · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grevillea_robusta_unripe_seed_pods_01.jpg

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
2	2	2	alto

FICHA 25

DATOS DE LA ESPECIE

San Joaquín variegado

Hibiscus rosa-sinensis (Variedad variegada / de hoja roja)

NE
No evaluado

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	San Joaquín variegado
Nombres alternos	Resucitado, Hibisco, Flor de tinto, Papapo
Nombre científico	*Hibiscus rosa-sinensis* (Variedad variegada / de hoja roja)
Familia	Malvaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Arbusto perennifolio muy popular en la jardinería ornamental de Colombia. Esta variedad en específico destaca por su follaje multicolor o variegado, donde se mezclan hojas y brotes de tonos rojizos, púrpuras, rosados y verdes, sirviendo como un elemento de gran contraste visual en parques y jardines.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	arbusto
Altura aproximada	1.5 a 3 metros
Hojas	Simples, alternas, de forma ovada a lanceolada, con márgenes marcadamente dentados o aserrados; presentan una coloración variegada muy llamativa con matices de rojo encendido, púrpura y verde claro.
Flores	Grandes, vistosas, solitarias y en forma de embudo, con una columna estaminal larga y prominente que sobresale en el centro. En los extremos de las ramas se aprecian sus capullos alargados protegidos por un cáliz verde (visibles en las fotos).
Frutos	Cápsulas redondeadas de cinco cavidades que contienen varias semillas en su interior, aunque en jardinería urbana es poco común verlos debido a las podas continuas.
Tronco o tallo	Tallos leñosos, delgados y muy ramificados desde la base, con corteza lisa de color grisáceo a marrón claro; las ramillas jóvenes son flexibles y de tonalidades rojizas.
HÁBITAT	
Distribución	Nativo de Asia oriental (probablemente China), pero ampliamente introducido, cultivado y naturalizado en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo.
Altitud	0 a 2,500 m s. n. m. (muy bien adaptado a los microclimas protegidos y plazas de los pueblos de la provincia de Pamplona y Chitagá).
Clima	Prefiere climas templados a cálidos y soleados; en zonas de montaña alta requiere ubicaciones protegidas de los vientos helados directos para evitar que se queme el follaje.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Altamente ornamental para la formación de setos vivos coloridos, borduras densas o como arbusto aislado por su follaje perenne multicolor. • Atracción de polinizadores nativos, especialmente colibríes y abejas grandes, gracias a sus llamativas estructuras florales. • Uso artesanal y medicinal tradicional en algunas regiones (infusiones de pétalos).
Estado de conservación	No evaluado (NE / Especie cultivada globalmente)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• El género *Hibiscus* cuenta con cientos de variedades hortícolas; las de follaje rojo o variegado son muy apreciadas en el diseño paisajístico porque mantienen su color vivo durante todo el año, independientemente de la época de floración. • Es la flor nacional de Malasia y un símbolo cultural de los entornos tropicales y andinos de América Latina.
Cuidados	Requiere una exposición a pleno sol para que la intensidad de los colores rojos y púrpuras de sus hojas se mantenga brillante; si se siembra en sombra total, tiende a volverse completamente verde. Exige suelos fértiles con excelente drenaje y riegos moderados.
Observaciones de identificación	La silueta arbustiva compacta al lado del sendero peatonal (foto 1/3), la disposición de las hojas alternas sobre ramas delgadas con capullos florales típicos en las puntas (foto 2/3), y los bordes marcadamente aserrados/dentados con la variegación púrpura-rojiza (foto 3/3) confirman que se trata de una variedad ornamental de Hibiscus.
Especies similares	• Acalypha wilkesiana (Gasa / Oreja de bronce - de hojas similares pero con inflorescencias en forma de cola de gato) • Photinia x fraseri (Fotinia - descartada por sus hojas dispuestas de forma diferente y coloración solo en brotes apicales) • Hibiscus syriacus (Altea / Rosa de Siria - de hojas trilobadas más pequeñas)

FICHA 25

REGISTRO FOTOGRÁFICO

San Joaquín variegado

Hibiscus rosa-sinensis (Variedad variegada / de hoja roja)

NE
No evaluado


FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Malvaceae	arbusto	1.5 a 3 metros	Nativo de Asia oriental (probablemente China)



1 Porte y forma de la copa

Arbustiva, multicolor

Porte arbustivo, ramificado desde la base, con un follaje multicolor (rojo, púrpura, rosado y verde) que contrasta con el resto del jardín.



2 Forma de la hoja

Simple · alterna · ovada · margen dentado · variegada


Simples, alternas, de forma ovada a lanceolada, con márgenes marcadamente dentados o aserrados; presentan una coloración variegada muy llamativa con matices de rojo encendido, púrpura y verde claro.



3 Tallo, rama y corteza

Tallos delgados ramificados desde la base

Tallos leñosos, delgados y muy ramificados desde la base, con corteza lisa de color grisáceo a marrón claro; las ramillas jóvenes son flexibles y de tonalidades rojizas.



4 Fruto

Cápsulas redondeadas de cinco cavidades que contienen varias semillas en su interior, aunque en jardinería urbana es poco común verlos debido a las podas continuas.

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
1	1	1	alto

FICHA 26

DATOS DE LA ESPECIE

Siete cueros mutabilis

Tibouchina mutabilis

LC
Preocupación menor

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Siete cueros mutabilis
Nombres alternos	Sietecueros de jardín, Flor de mayo, Tibuchina mutabilis
Nombre científico	*Tibouchina mutabilis*
Familia	Melastomataceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Arbusto o árbol pequeño ornamental muy apreciado en la región andina por su espectacular y singular floración. Su principal característica es que sus flores cambian de color con el paso de los días: abren de color blanco o rosado muy pálido, pasan por tonos lavanda y terminan en un violeta o púrpura intenso, mostrando varios colores al mismo tiempo en el mismo ejemplar.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol / arbusto según poda
Altura aproximada	1.5 a 3 metros (en el manejo de parque fotografiado; libre puede alcanzar los 5 metros)
Hojas	Simples, opuestas, de forma elíptica a lanceolada, con márgenes enteros y la clásica nervadura foliar acródroma (3 a 5 venas principales paralelas que corren desde la base hasta el ápice). Tienen una textura áspera o ligeramente pubescente en el haz y un color verde vivo.
Flores	Grandes, muy vistosas, con 5 pétalos y característicos estambres curvos y largos de color amarillo (visibles en la foto 1/3). Presentan un llamativo comportamiento de cambio de coloración simultánea.
Frutos	Cápsulas leñosas pequeñas de forma globosa o de copa que se abren al madurar para liberar una gran cantidad de semillas diminutas.
Tronco o tallo	Tronco único y recto en este tipo de poda de jardín; su corteza es delgada, de color marrón rojizo, y tiene la tendencia natural de la familia a desprenderse en delgadas capas o láminas papiláceas.
HÁBITAT	
Distribución	Nativo de los bosques atlánticos de Sudamérica (principalmente Brasil), pero ampliamente introducido y cultivado con éxito en los parques y plazas urbanas de la cordillera andina colombiana.
Altitud	Se adapta de forma excelente en pisos térmicos templados y fríos (1,500 a 2,800 m s. n. m.), integrándose muy bien en la provincia de Pamplona y Chitagá.
Clima	Prefiere climas frescos y húmedos de montaña; requiere muy buena exposición a la luz solar directa para florecer abundantemente.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Altamente ornamental y paisajístico debido al espectacular contraste multicolor de sus flores sobre el follaje verde. • Atracción de insectos polinizadores (abejorros y abejas nativas) atraídos por sus prominentes estambres amarillos. • Decoración de espacios públicos reducidos o jardines pequeños por su porte bajo y controlado.
Estado de conservación	Preocupación menor (LC / Especie cultivada extensamente)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• El cambio de color de las flores es una estrategia evolutiva muy inteligente: avisa a los polinizadores cuáles flores ya fueron polinizadas y ya no tienen néctar (las de color violeta oscuro), redirigiéndolos de manera eficiente hacia las flores nuevas (blancas o rosadas pálidas). • Su nombre común 'Sietecueros' hace alusión directa a la corteza de sus tallos, la cual se descascara de forma constante en múltiples capas delgadas.
Cuidados	Exige una ubicación a pleno sol para asegurar una floración constante y colorida. Requiere suelos sueltos, con muy buen drenaje, ricos en materia orgánica y de tendencia ligeramente ácida; responde excelentemente a podas de formación después de sus picos de floración.
Observaciones de identificación	La floración simultánea con tonos violeta y rosado pálido en la misma rama con estambres amarillos extendidos (foto 1/3), el porte arbustivo limpio de un solo eje en el césped del parque (foto 2/3), y el detalle en primer plano de las hojas opuestas con las 3 a 5 nervaduras longitudinales paralelas hundidas típicas de las melastomatáceas (foto 3/3) confirman la especie Tibouchina mutabilis.
Especies similares	• Tibouchina lepidota (Sietecueros común - de flores de un solo tono violeta intenso y hojas más alargadas) • Melastoma malabathricum (Melastoma asiático - de flores rosadas fijas y estambres diferentes) • Pleroma urvilleanum (Tibuchina de jardín - de hojas aterciopeladas y flores solo púrpuras)

FICHA 26

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Siete cueros mutabilis

Tibouchina mutabilis

LC
Preocupación menor


FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Melastomataceae	árbol / arbusto según poda	1.5 a 3 metros	Nativo de los bosques atlánticos de Sudamérica (principalmente Brasil)



1 Porte y forma de la copa

Compacta sobre tronco único

En el parque se maneja como arbolito de tronco único con copa compacta; sus flores cambian de blanco a lavanda y violeta, y muestran varios colores a la vez.



2 Forma de la hoja

Simple · opuesta · elíptica · nervadura acródroma (3–5 venas)


Simples, opuestas, de forma elíptica a lanceolada, con márgenes enteros y la clásica nervadura foliar acródroma (3 a 5 venas principales paralelas que corren desde la base hasta el ápice). Tienen una textura áspera o ligeramente pubescente en el haz y un color verde vivo.



3 Tallo, rama y corteza

Tronco único · corteza rojiza en láminas finas

Tronco único y recto en este tipo de poda de jardín; su corteza es delgada, de color marrón rojizo, y tiene la tendencia natural de la familia a desprenderse en delgadas capas o láminas papiláceas.



4 Fruto

Cápsulas leñosas pequeñas de forma globosa o de copa que se abren al madurar para liberar una gran cantidad de semillas diminutas.

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
1	1	1	alto

FICHA 27

DATOS DE LA ESPECIE

Tuya

Platycladus orientalis

NT
Casi amenazado

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Tuya
Nombres alternos	Ciprés de abanico, Árbol de la vida, Tuya oriental, Biota
Nombre científico	*Platycladus orientalis*
Familia	Cupressaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Pequeña conífera perennifolia de crecimiento lento y porte denso, muy utilizada en la jardinería ornamental y el paisajismo urbano andino. Destaca por la disposición vertical y aplanada de sus ramillas, que asemejan pequeños abanicos verdes. Su copa suele ser de forma ovoide o piramidal compacta, manteniendo un color verde brillante o verde-amarillento muy vivo durante todo el año.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol (conífera)
Altura aproximada	2 a 5 metros (en entornos urbanos bajo mantenimiento)
Hojas	Escuamiformes (en forma de escamas), muy pequeñas, imbricadas y dispuestas en 4 filas a lo largo de las ramillas. Se caracterizan por estar organizadas en planos verticales aplanados, compactos y con una coloración verde biche o ligeramente áurea en las puntas (como se observa en la foto de detalle).
Flores	Especie monoica. Las estructuras reproductoras son conos diminutos poco visibles que aparecen en los extremos de las ramillas a principios de año.
Frutos	Conos o gálbulos ovalados, carnosos al principio y de un color verde-azuloso o glauco (con una capa cerosa blanquecina), provistos de escamas ganchudas reflejas hacia atrás. Al madurar se vuelven leñosos, de color marrón, y se abren para liberar semillas sin alas.
Tronco o tallo	Tronco erguido, a menudo ramificado muy cerca del suelo en varios fustes verticales; corteza delgada de color marrón-rojizo que se desprende en tiras longitudinales finas con la edad.
HÁBITAT	
Distribución	Nativa del este de Asia (China, Corea y extremo oriental de Rusia). Ampliamente distribuida a nivel global como planta ornamental y un elemento tradicional indispensable en los diseños topiarios de parques de la provincia de Pamplona y el municipio de Chitagá.
Altitud	1,500 a 3,000 m s. n. m. (con una adaptación perfecta a las condiciones ambientales de Chitagá).
Clima	Templado a frío, muy resistente a las heladas urbanas y a los vientos de montaña.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Uso netamente ornamental en plazas principales, cementerios, alamedas y jardines públicos. • Excelente para el arte topiario, ya que tolera podas rigurosas para esculpir formas esféricas, piramidales u ovaladas compactas. • Formación de setos bajos, linderos tupidos y pantallas cortavientos en antejardines.
Estado de conservación	Casi amenazada (NT) en su hábitat natural nativo, pero sumamente abundante y segura bajo su estatus global cultivado.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• El término 'Árbol de la vida' proviene de sus acepciones tradicionales en Asia, donde se asociaba con la longevidad y la inmortalidad debido a su naturaleza perenne y la resistencia de su madera aromática. • A diferencia de los cipreses comunes (*Cupressus*), las ramillas de la tuya se disponen de manera estrictamente plana en un solo eje vertical, lo que permite distinguirla de inmediato al tacto y la vista.
Cuidados	Planta extremadamente rústica y longeva. Requiere exposición directa a pleno sol para mantener la densidad de su follaje y evitar que las zonas internas se sequen. Prefiere suelos bien drenados, tolerando una amplia variedad de terrenos desde calizos hasta arcillosos. Requiere riegos moderados una vez establecida y soporta podas de mantenimiento estructural en cualquier época del año.
Observaciones de identificación	Se confirma el taxón *Platycladus orientalis* (Tuya) con total seguridad. En la vista general (foto 1) se aprecia un espécimen clásico cultivado en el parque, manejado con una poda ornamental compacta de porte ovoide-globoso. En la toma de detalle (foto 2) se valida la inconfundible morfología cupresácea de ramillas aplanadas en abanico con hojas escuamiformes imbricadas de color verde brillante, junto con la presencia de pequeños frutos o conos inmaduros de color verde pálido con escamas ganchudas.
Especies similares	• Thuja occidentalis (Tuya del Canadá - con conos más alargados y planos horizontales) • Cupressus sempervirens (Ciprés común - de porte columnar y ramillas cilíndricas) • Chamaecyparis lawsoniana (Ciprés de Lawson)

FICHA 27

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Tuya

Platycladus orientalis

NT
Casi amenazado

FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Cupressaceae	árbol (conífera)	2 a 5 metros	Nativa del este de Asia (China, Corea y extremo oriental de Rusia)



1 Porte y forma de la copa

Ovoide o piramidal compacta

Copa ovoide o piramidal compacta, de crecimiento lento; las ramillas se disponen en planos verticales que parecen pequeños abanicos.



2 Forma de la hoja

Escuamiformes · imbricadas · en planos verticales (abanicos)


Escuamiformes (en forma de escamas), muy pequeñas, imbricadas y dispuestas en 4 filas a lo largo de las ramillas. Se caracterizan por estar organizadas en planos verticales aplanados, compactos y con una coloración verde biche o ligeramente áurea en las puntas (como se observa en la foto de detalle).



3 Tallo, rama y corteza

Varios fustes · corteza rojiza en tiras finas

Tronco erguido, a menudo ramificado muy cerca del suelo en varios fustes verticales; corteza delgada de color marrón-rojizo que se desprende en tiras longitudinales finas con la edad.



4 Cono

Conos o gálbulos ovalados, carnosos al principio y de un color verde-azuloso o glauco (con una capa cerosa blanquecina), provistos de escamas ganchudas reflejas hacia atrás. Al madurar se vuelven leñosos, de color marrón, y se abren para liberar semillas sin alas.

Foto: Vinayaraj · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Platycladus_orientalis_foliage_and_cones,_India_1.jpg

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
1	1	1	alto

FICHA 28

DATOS DE LA ESPECIE

Velero

Senna spectabilis

LC
Preocupación menor

IDENTIFICACIÓN	
Nombre común	Velero
Nombres alternos	Vainillo, Mucuteno, Candelillo, Carnaval, Flor amarillo
Nombre científico	*Senna spectabilis*
Familia	Fabaceae
Nivel de confianza	alto
Descripción	Árbol nativo de porte mediano, de rápido crecimiento y copa redondeada y extendida, muy valorado en el paisaje urbano de Colombia por su floración vistosa. Destaca por sus hojas compuestas de color verde vivo y sus densas panículas de flores amarillas brillantes que cubren la copa de forma espectacular durante sus periodos de mayor esplendor.
CARACTERÍSTICAS	
Tipo	árbol
Altura aproximada	4 a 12 metros
Hojas	Compuestas, paripinnadas, de 20 a 40 cm de largo, dispuestas de forma alterna. Cuentan con 10 a 16 pares de folíolos elípticos u ovados, con el ápice agudo y una superficie lisa de color verde oscuro en el haz.
Flores	Grandes, de color amarillo intenso, con cinco pétalos desiguales y redondeados, agrupadas en densos racimos o panículas terminales muy llamativas que sobresalen del follaje.
Frutos	Legumbres o vainas cilíndricas alargadas de 15 a 30 cm de largo, de color café oscuro o negro al madurar, que cuelgan del árbol y contienen numerosas semillas separadas por tabiques internos.
Tronco o tallo	Tronco generalmente corto y cilíndrico, ramificado a baja altura; corteza lisa a ligeramente rugosa con la edad, de color grisáceo a castaño claro.
HÁBITAT	
Distribución	Especie nativa de América tropical (desde México hasta Argentina). Se encuentra ampliamente distribuido en zonas cálidas y templadas de Colombia, estando bien adaptado en valles y plazas andinas como las de la provincia de Pamplona y Chitagá.
Altitud	0 a 2,200 m s. n. m. (encontrando un límite favorable en las zonas templadas de Chitagá).
Clima	Cálido a templado, con alta resistencia a la exposición solar directa.
USOS Y CONSERVACIÓN	
Usos	• Uso principalmente ornamental y paisajístico en plazas públicas • parques • separadores viales y jardines amplios. • Atracción de polinizadores: sus flores son intensamente visitadas por abejorros y diversas especies de mariposas nativas. • Sombreo urbano gracias a la arquitectura aparasolada o globosa de su copa.
Estado de conservación	Preocupación menor (LC)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Datos curiosos	• El epíteto científico *spectabilis* proviene del latín y significa 'espectacular' o 'notable', en alusión directa al impacto visual que genera el árbol cuando está completamente cubierto de flores amarillas. • En países como Argentina se le conoce popularmente como 'Carnaval' o 'Carnavalito' debido a que el pico de su floración coincide exactamente con las fechas de dicha festividad.
Cuidados	Requiere una exposición a pleno sol para asegurar una floración óptima. Prefiere suelos sueltos, con buen drenaje, ya que es sensible al encharcamiento prolongado en las raíces. Aunque tolera bien los climas templados, los ejemplares jóvenes pueden requerir cierta protección frente a vientos helados extremos de alta montaña.
Observaciones de identificación	Se confirma con total certeza el taxón *Senna spectabilis* (Velero). En la vista general (foto 1) se aprecia su hábito de crecimiento típico en entornos públicos, mostrando una copa globosa bien estructurada al lado de la arquitectura local. En la vista de detalle (foto 2) se validan completamente sus características diagnósticas: los racimos terminales de flores de un amarillo intenso y sus hojas paripinnadas compuestas por folíolos simétricos y lanceolados.
Especies similares	• Tecoma stans (Chicalá / Chirlobirlo - con flores acampanadas y hojas aserradas) • Senna siamea (Casia siamea - de inflorescencias similares pero con sutiles diferencias foliares) • Cassia fistula (Lluvia de oro - con racimos florales mucho más largos y colgantes)

FICHA 28

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Velero

Senna spectabilis

LC
Preocupación menor

FAMILIA	TIPO	ALTURA	ORIGEN
Fabaceae	árbol	4 a 12 metros	Especie nativa de América tropical (desde México hasta Argentina)



1 Porte y forma de la copa

Redondeada y extendida

Copa redondeada y extendida, de crecimiento rápido; en floración se cubre de panículas densas de flores amarillas brillantes.



2 Forma de la hoja

Compuesta · paripinnada · 10–16 pares de folíolos elípticos

Compuestas, paripinnadas, de 20 a 40 cm de largo, dispuestas de forma alterna. Cuentan con 10 a 16 pares de folíolos elípticos u ovados, con el ápice agudo y una superficie lisa de color verde oscuro en el haz.



3 Tallo, rama y corteza

Corto y cilíndrico · corteza lisa a algo rugosa

Tronco generalmente corto y cilíndrico, ramificado a baja altura; corteza lisa a ligeramente rugosa con la edad, de color grisáceo a castaño claro.



4 Fruto

Legumbres o vainas cilíndricas alargadas de 15 a 30 cm de largo, de color café oscuro o negro al madurar, que cuelgan del árbol y contienen numerosas semillas separadas por tabiques internos.

Foto: Dick Culbert · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sena_spectabilis_pods_(24959290714).jpg

CONTEO DE CAMPO	ÁRBOLES EN EL MAPA	PUNTOS GPS	CONFIANZA DE IDENTIFICACIÓN
1	0	0	alto

Fuentes consultadas

Datos que completan las fichas de la palma de cera del Quindío, la palma canaria y el ciprés (consultados en octubre de 2026). Las demás fichas provienen del registro de campo del proyecto.

Ceroxylon quindiuense

- Wikipedia — Ceroxylon quindiuense
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ceroxylon_quindiuense
- Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia (ColPlanta)
  https://colplanta.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:665697-1/general-information
- Fenología de Ceroxylon quindiuense a lo largo de un gradiente altitudinal (Revista de Biología Tropical)
  https://www.redalyc.org/journal/449/44969403022/html/
- Wikipedia — género Ceroxylon
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ceroxylon
- DAGMA Cali — Palma de cera y Semana Santa
  https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/152827/la-palma-de-cera-esta-en-peligro-de-extincion-presentamos-otras-alternativas-para-semana-santa/

Phoenix canariensis

- Wikipedia — Phoenix canariensis
  https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_canariensis
- Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia (ColPlanta)
  https://colplanta.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:668909-1/general-information
- Lifeder — Palmera canaria
  https://www.lifeder.com/palmera-canaria/
- Ley 7/1991 de símbolos de Canarias
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_animal_and_plant_symbols_of_the_Canary_Islands
- PalmTalk — Cómo distinguir P. canariensis de P. sylvestris
  https://www.palmtalk.org/forum/topic/14146-how-can-i-tell-phx-canariensis-from-phx-sylvestris

Cupressus sp. (probablemente C. lusitanica)

- INAB Guatemala — Paquete tecnológico forestal: Ciprés común (Cupressus lusitanica), 2017
  https://www.itto.int/files/itto_project_db_input/2802/technical/CIPRES.pdf
- Wikipedia — Hesperocyparis lusitanica
  https://en.wikipedia.org/wiki/Hesperocyparis_lusitanica
- Trees and Shrubs Online — Cupressus lusitanica
  https://treesandshrubsonline.org/articles/cupressus/cupressus-lusitanica/
- Wikipedia — Hesperocyparis macrocarpa
  https://en.wikipedia.org/wiki/Hesperocyparis_macrocarpa
- Oregon State University — Cupressus sempervirens
  https://landscapeplants.oregonstate.edu/plants/cupressus-sempervirens