

Evaluación de la deglución – Servicio de Kinesiología

Datos del paciente					
Apellido y Nombre					Cama:
Edad:		Dx:			Alimentación Actual
Fi		Fecha de eval.		VAA: No - TQT - IOT	

Criterios Para Iniciar El Proceso De Evaluación De Deglución		
Estabilidad clínica	Si	No
Responde ordenes simples	Si	No
Tiempo de retirada de vía aérea artificial.	Si	No
Praxias orales	Si	No
Trago automático	Si	No
Control cefálico	Si	No
Tolerancia cánula ocluida (TQT)	Si	No

Evaluación de Predictores de disfagia:		
Disfonía	Presencia	Ausencia
Disartria	Presencia	Ausencia
Alteración del reflejo nauseoso	Presencia	Ausencia
Alteración del reflejo en los pilares anteriores del velo del paladar	Presencia	Ausencia
Tos voluntaria anormal	Presencia	Ausencia
Tos post-deglucion	Presencia	Ausencia
Cambios en la voz post-deglucion	Presencia	Ausencia
La identificación de 2 de los 6 criterios predice la presencia de una disfagia severa a moderada		

Blue Test		
Inmediato	Positivo	Negativo
Tardío	Positivo	Negativo
Resultado		

Evaluación con alimentos:			
Alimentos		Si	No
Semisólidos	<i>Presencia de alimento en cavidad oral</i>		
	<i>Tos pre/post deglución</i>		
	<i>Cambios en la voz</i>		
	<i>Múltiples tragos</i>		
	<i>Coordinación apnea- deglución</i>		
	<i>Ruidos agregados a la auscultación</i>		
Líquidos	<i>Presencia de alimento en cavidad oral</i>		
	<i>Tos pre/post deglución</i>		
	<i>Cambios en la voz</i>		
	<i>Múltiples tragos</i>		
	<i>Coordinación apnea- deglución</i>		
	<i>Ruidos agregados a la auscultación</i>		
Sólidos <i>(Pieza dentarias completas: si / no)</i>	<i>Presencia de alimento en cavidad oral</i>		
	<i>Tos pre/post deglución</i>		
	<i>Cambios en la voz</i>		
	<i>Múltiples tragos</i>		
	<i>Coordinación apnea- deglución</i>		
	<i>Ruidos agregados a la auscultación</i>		

<i>Tipo de dieta sugerida: basada en IDDSI</i>