

論理学 演習問題 — 解答・解説

氏名

2025 年 11 月 10 日

目次

1	問題 1：真理表による証明	2
2	問題 3：同値変形による証明	3
付録 A	補遺：記法と恒等式	5

1 問題 1：真理表による証明

I を真 (True)、 O を偽 (False) として真理表を作成します.

(1) $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ (分配法則)

下表は、各組合せに対する各項の真理値を示します. 左辺と右辺の列が一致するため、同値であることが分かります.

表 1 $p \wedge (q \vee r)$ と $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ の真理表

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	O	I	I	I	O	I
I	O	I	I	I	O	I	I
I	O	O	O	O	O	O	O
O	I	I	I	O	O	O	O
O	I	O	I	O	O	O	O
O	O	I	I	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O

(2) $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ (分配法則)

同様に、次の真理表で左辺と右辺が一致することが確認できます.

表 2 $p \vee (q \wedge r)$ と $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ の真理表

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	O	O	I	I	I	I
I	O	I	O	I	I	I	I
I	O	O	O	I	I	I	I
O	I	I	I	I	I	I	I
O	I	O	O	O	I	O	O
O	O	I	O	O	O	I	O
O	O	O	O	O	O	O	O

2 問題 3：同値変形による証明

使用する主な法則：

- $A \rightarrow B \equiv \bar{A} \vee B$
- ド・モルガンの法則: $\overline{A \vee B} \equiv \bar{A} \wedge \bar{B}$, $\overline{A \wedge B} \equiv \bar{A} \vee \bar{B}$
- 分配律: $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$, $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
- その他の恒等式: $A \vee \bar{A} \equiv I$, $A \wedge \bar{A} \equiv O$, $A \vee O \equiv A$, $A \wedge I \equiv A$, $A \vee I \equiv I$, $A \wedge O \equiv O$

$$(1) (p \vee q) \wedge (p \vee \bar{q}) \equiv p$$

$$\begin{aligned}(p \vee q) \wedge (p \vee \bar{q}) &\equiv p \vee (q \wedge \bar{q}) \quad (\text{分配法則}) \\ &\equiv p \vee O \quad (\text{矛盾律 } q \wedge \bar{q} \equiv O) \\ &\equiv p \quad (\text{同一律 } p \vee O \equiv p)\end{aligned}$$

よって示された.

$$(2) (p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge q) \equiv p$$

$$\begin{aligned}(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge q) &\equiv (\overline{p \rightarrow q}) \vee (p \wedge q) \quad (A \rightarrow B \equiv \bar{A} \vee B) \\ &\equiv (\bar{\bar{p} \vee q}) \vee (p \wedge q) \quad (p \rightarrow q \equiv \bar{p} \vee q) \\ &\equiv (p \wedge \bar{q}) \vee (p \wedge q) \quad (\text{ド・モルガンの法則}) \\ &\equiv p \wedge (\bar{q} \vee q) \quad (\text{分配法則}) \\ &\equiv p \wedge I \quad (\text{排中律 } \bar{q} \vee q \equiv I) \\ &\equiv p \quad (\text{同一律 } p \wedge I \equiv p)\end{aligned}$$

よって示された.

$$(3) (p \wedge q) \rightarrow (p \rightarrow q) \equiv I$$

$$\begin{aligned} (p \wedge q) \rightarrow (p \rightarrow q) &\equiv (\overline{p \wedge q}) \vee (p \rightarrow q) \quad (A \rightarrow B \equiv \bar{A} \vee B) \\ &\equiv (\bar{p} \vee \bar{q}) \vee (\bar{p} \vee q) \quad (\text{ド・モルガンの法則}, p \rightarrow q \equiv \bar{p} \vee q) \\ &\equiv \bar{p} \vee \bar{p} \vee \bar{q} \vee q \quad (\text{結合・交換}) \\ &\equiv \bar{p} \vee (\bar{q} \vee q) \quad (\bar{p} \vee \bar{p} \equiv \bar{p}) \\ &\equiv \bar{p} \vee I \quad (\text{排中律 } \bar{q} \vee q \equiv I) \\ &\equiv I \quad (\text{同一律 } \bar{p} \vee I \equiv I) \end{aligned}$$

よって示された。

$$(4) (p \vee q) \rightarrow (p \wedge q) \equiv (p \vee \bar{q}) \vee (\bar{p} \vee q) \text{ の真偽}$$

この等式は成立しません (偽)。反例として $p = I, q = O$ をとります。

左辺:

$$\begin{aligned} (p \vee q) \rightarrow (p \wedge q) &\equiv (I \vee O) \rightarrow (I \wedge O) \\ &\equiv I \rightarrow O \\ &\equiv O \end{aligned}$$

右辺:

$$\begin{aligned} (p \vee \bar{q}) \vee (\bar{p} \vee q) &\equiv (I \vee \bar{O}) \vee (\bar{I} \vee O) \\ &\equiv (I \vee I) \vee (O \vee O) \\ &\equiv I \vee O \\ &\equiv I \end{aligned}$$

左辺は O 、右辺は I となり一致しないため、当該等式は偽である。

■参考 もし問題が誤植で、右辺が $(p \vee \bar{q}) \wedge (\bar{p} \vee q)$ であるならば、両辺は同値になります。簡略化の過程を追うと、最終的に両辺が $(p \wedge q) \vee (\bar{p} \wedge \bar{q})$ に一致することが分かります。

付録 A 補遺：記法と恒等式

本ドキュメントで使用した略記と恒等式の一覧をまとめます。授業や試験での参照に便利です。

- I : 真 (True)
- O : 偽 (False)
- \bar{A} : 命題 A の否定
- $A \rightarrow B$: A ならば B (含意)