

Министерство науки и высшего образования  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н. Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

---



Факультет «Фундаментальные науки»  
Кафедра «Высшая математика»

**ОТЧЁТ  
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  
ЗА 5 СЕМЕСТР 2020-2021 ГГ.**

Руководитель практики,  
ст. преп. кафедры ФН1 \_\_\_\_\_ Кравченко О.В.  
*подпись, дата*

студент группы ФН1–51 \_\_\_\_\_ Верина Я.В.  
*подпись, дата*

Москва  
2020

# Содержание

<b>1</b>	<b>Постановка задачи</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Теоретическая часть</b>	<b>4</b>
2.1	Метод конечных разностей . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Код программы</b>	<b>6</b>
3.1	Метод конечных разностей . . . . .	6
3.2	Метод прогонки . . . . .	7
3.3	Решение сингулярной двуточечной задачи . . . . .	7
<b>4</b>	<b>Результаты работы программы</b>	<b>8</b>
	<b>Список литературы</b>	<b>9</b>

# 1 Постановка задачи

Решить сингулярную двуточечную краевую задачу методом конечных разностей

$$\varepsilon y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) + f(x) = 0, \quad x \in [0, 1],$$

со смешанными граничными условиями

$$-\alpha_1 y'(0) + \alpha_2 y(0) = \gamma_1,$$

$$\beta_1 y'(1) + \beta_2 y(1) = \gamma_2,$$

при различных значениях параметра

$$\varepsilon = 1, 0.1, 0.01, 0.001.$$

Индивидуальное задание:

$$p(x) = x \sin(x) + x^2, \quad q(x) = \sqrt{x^2 + x}, \quad f(x) = \sqrt{x^2 - x^3} + x.$$

$$\alpha_1 = 1, \quad \alpha_2 = 0, \quad \beta_1 = 1, \quad \beta_2 = 0, \quad \gamma_1 = 6, \quad \gamma_2 = 9.$$

## 2 Теоретическая часть

### 2.1 Метод конечных разностей

Дано дифференциальное уравнение второго порядка

$$\varepsilon y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) + f(x) = 0, \quad x \in [a, b], \quad (1)$$

со смешанными граничными условиями

$$\begin{aligned} -\alpha_1 y'(0) + \alpha_2 y(0) &= \gamma_1, \\ \beta_1 y'(1) + \beta_2 y(1) &= \gamma_2. \end{aligned} \quad (2)$$

Разобьем интервал  $[a, b]$  на  $n$  узлов с шагом  $h = x_i - x_{i-1}, i = 1, \dots, n$ , где

$$h = \frac{b-a}{n},$$

$$x_0 = a, \quad x_1 = a + h, \quad x_2 = a + 2h, \quad \dots \quad x_n = b.$$

Обозначим

$$y(x_i) = y_i, \quad p(x_i) = p_i, \quad q(x_i) = q_i, \quad f(x_i) = f_i.$$

Заменим в дифференциальном уравнении (1) первые производные конечными разностями, тогда на концах отрезка

$$y'(x_0) = \frac{y_1 - y_0}{h}, \quad y'(x_n) = \frac{y_n - y_{n-1}}{h}$$

и в промежуточных точках

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} \approx \frac{\nabla y}{\nabla x} = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{x_{i+1} - x_{i-1}} = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}.$$

Тогда конечные разности для второй производной имеют следующий вид

$$y''(x) = \frac{d^2 y}{dx^2} \approx \frac{\nabla(\nabla y)}{\nabla(\nabla x)} = \frac{(y_{i+1} - y_i) - (y_i - y_{i-1}))}{h^2} = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}.$$

В итоге вместо дифференциального уравнения (1) со смешанными граничными условиями (2) получим систему, состоящую из  $n + 1$  уравнений с  $n + 1$  неизвестными  $y_0, y_1, \dots, y_n$

$$\begin{cases} -\alpha_1 \frac{y_1 - y_0}{h} + \alpha_2 y_0 = \gamma_1, \\ \varepsilon \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + p_i \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + q_i y_i = -f_i, \quad i = 1, \dots, n-1, \\ \beta_1 \frac{y_n - y_{n-1}}{h} + \beta_2 y_n = \gamma_2. \end{cases}$$

Поделим второе уравнение системы на  $\varepsilon$  и умножим его на  $h^2$ , а первое и третье умножим на  $h$ . Запишем полученную систему в матричной форме  $W \cdot Y = F$ , где

$$W = \begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 h & -\alpha_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 - \frac{p_1 h}{2\varepsilon} & \frac{q_1 h^2}{\varepsilon} - 2 & 1 + \frac{p_1 h}{2\varepsilon} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 - \frac{p_2 h}{2\varepsilon} & \frac{q_2 h^2}{\varepsilon} - 2 & 1 + \frac{p_2 h}{2\varepsilon} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & . & . & . & . & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 - \frac{p_{n-1} h}{2\varepsilon} & \frac{q_{n-1} h^2}{\varepsilon} - 2 & 1 + \frac{p_{n-1} h}{2\varepsilon} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\beta_1 & \beta_1 + \beta_2 h \end{pmatrix},$$

$$Y = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \dots \\ y_{n-1} \\ y_n \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} \gamma_1 h \\ -f_1 h^2 \\ \varepsilon \\ \dots \\ -f_{n-1} h^2 \\ \varepsilon \\ \gamma_2 h \end{pmatrix}.$$

Таким образом, решение сингулярной двуточечной краевой задачи (1), (2) сводится к решению СЛАУ. Для поиска значений  $Y$  применим метод прогонки, который используется для решения систем вида  $A \cdot X = B$ , где  $A$  – трехдиагональная(пятидиагональная) матрица.

## 3 Код программы

### 3.1 Метод конечных разностей

```
function [xx Y] = konech_raznoste(eps,N)
a=0; b=1;
h=(b-a)/N;
c1=0;c2=-1; d1=0; d2=1;
c = 6; d = 9;
syms x;
p = x*sin(x) +x^2;
q = sqrt(x^2+x);
f = -x-sqrt(x^2-x^3);
for i=1:N+1
xx(i)=a+(i-1)*h;
end
n=length(xx)-1;

for i=1:n-1
pp(i)= double(subs(p,x,xx(i+1)))/eps);
qq(i)= double(subs(q,x,xx(i+1)))/eps);
ff(i)= double(subs(f,x,xx(i+1)))/eps);
end

F=zeros(n+1,1);

%Собираем матрицу F
F(1)= c*h;
F(n+1) = d*h;
for i = 1:n-1
F(i+1)=ff(i)*h*h;
end

%Собираем матрицу W
aa=zeros(n-1,1);
for i=1:n-1
aa(i)=qq(i)*h*h-2;
end
aaa=[c1*h - c2; aa;d1*h + d2 ]; %главная диагональ

bb=zeros(n-2,1);
for i=1:n-1
bb(i)=1-h/2*pp(i);
end
bbb=[bb;-d2];

cc=zeros(n-2,1);
for i=1:n-1
cc(i)=1+h/2*pp(i);
end
ccc=[c2; cc];
```

```
W=diag(aaa,0)+diag(bbb,-1)+diag(ccc,1);
```

```
Y=progonkaa(W,F);
```

### 3.2 Метод прогонки

```
function x= progonkaa(A,b)
[n n]=size(A);
P(1)=-A(1,2)/A(1,1); %-c1/y1, y1=b1
Q(1)=b(1,1)/A(1,1) ;%d1/y1, y1=b1

for i=2:n-1 %прямая прогонка находим коэфф P,Q
yi=A(i,i)+A(i,i-1)*P(i-1);
P(i)=-A(i,i+1)/yi;
Q(i)=(b(i,1)-A(i,i-1)*Q(i-1))/yi;
end

yn=A(n,n)+A(n,n-1)*P(n-1);
Q(n)=(b(n,1)-A(n,n-1)*Q(n-1))/yn;

%обратный ход находим икс
x(n)=Q(n);
for i=n-1:-1:1
x(i)=P(i)*x(i+1)+Q(i);
end
```

### 3.3 Решение сингулярной двуточечной задачи

```
function xxx = progonka()
[x0 y0] =konech_raznoste(1,20);
[x1 y1]=konech_raznoste(0.1,20);
[x2 y2]=konech_raznoste(0.01,25);
[x3 y3]=konech_raznoste(0.001,50);

hold on; grid on;
plot(x0,y0,'o','Linewidth', 2, 'Color', 'r');
plot(x0,y0,'Linewidth', 2, 'Color', 'r');
plot(x1,y1,'o','Linewidth', 2, 'Color', 'b');
plot(x1,y1,'Linewidth', 2, 'Color', 'b');
plot(x2,y2,'o','Linewidth', 2, 'Color', 'g');
plot(x2,y2,'Linewidth', 2, 'Color', 'g');
plot(x3,y3,'o','Linewidth', 2, 'Color', 'm');
plot(x3,y3,'Linewidth', 2, 'Color', 'm');
legend('Узлы','eps=1','Узлы','eps=0.1','Узлы','eps=0.01','Узлы','eps=0.001');
```

## 4 Результаты работы программы




Рис. 1: Решение задачи,  $\varepsilon = 1$




Рис. 2: Решение задачи,  $\varepsilon = 0.1$






Рис. 3: Решение задачи,  $\varepsilon = 0.01$




Рис. 4: Решение задачи,  $\varepsilon = 0.001$

## Список литературы

- [1] Блюмин А.Г., Федотов А.А., Храпов П.В. Численные методы вычисления интегралов и решения задач для обыкновенных дифференциальных уравнений: Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Численные методы». — М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2008. — 74 с.
- [2] Самарский А.А. Введение в численные методы. СПб.: Издательство «Лань», 2005. — 288 с.
- [3] Дьяконов В. П. MATLAB. Полный самоучитель. — М.: ДМК Пресс, 2012. — 768 с.: ил.
- [4] Львовский С.М. Набор и вёрстка в системе L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X — 3-е изд., перераб. и доп. — 2003.