
W0 → W12: paired molecular change
a
Dupilumab
b
Abrocitinib 100 mg
c
Abrocitinib 200 mg
q / NE
IL-4 [36]
IL-5 [36]
IL-13 [15]
IL-31 [10]
TSLP [36]
IL-33 [36]
CCL17 [36]
CCL18 [23]
IFN-gamma [36]
IL-12p70 [32]
IL-18 [36]
TNF-alpha [34]
IL-21 [28]
IL-6 [36]
IL-17A [33]
IL-22 [3]
IL-10 [36]
IL2RA [36]
CCL26 [36]
Periostin [36]
CCL11 [36]
IL-36beta [36]
IFN-beta [27]
[33]
[32]
[9]
[11]
[33]
[33]
[33]
[13]
[33]
[31]
[32]
[32]
[17]
[33]
[25]
[3]
[33]
[33]
[28]
[33]
[33]
[33]
[25]
[25]
[25]
[1]
[6]
[25]
[25]
[25]
[10]
[25]
[24]
[25]
[25]
[16]
[25]
[25]
[3]
[25]
[25]
[25]
[25]
[25]
[21]
−2
0
Later − earlier log₂ concentration
W0 → W12 paired interval · [n] = complete pairs · * FDR q<.05 · NE: not estimable