
dupi
pooled abro
a
Baseline serum–region association
IL-4
IL-5
IL-13
IL-31
TSLP
IL-33
CCL17
CCL18
IFN-gamma
IL-12p70
IL-18
TNF-alpha
IL-21
IL-6
IL-17A
IL-22
IL-10
IL2RA
CCL26
Periostin
CCL11
IL-36beta
IFN-beta
Head/ neck
Upper limbs
Trunk
Lower limbs
dupi
abro 100 mg
abro 200 mg
−1
0
1
Spearman correlation
b
Regional burden (% of maximum)
Head/neck 20 6 6
Upper limbs 27 9 7
Trunk 28 7 6
Lower limbs 23 7 5
Head/neck 18 5 4
Upper limbs 18 5 3
Trunk 20 4 1
Lower limbs 16 3 2
Head/neck 30 7 5
Upper limbs 32 6 3
Trunk 33 6 5
Lower limbs 25 5 2
W0
W12
W24
0
50
100
Paired decrease (% of maximum)
c
W0–12
W0–24
W12–24
Head/neck 14 17 13 19 0 0
Upper limbs 17 18 21 21 3 1
Trunk 20 20 24 23 3 1
Lower limbs 16 16 20 18 4 2
dupi
abro
dupi
abro
dupi
abro
−25
0
25
d
Whole-body itch
W0–12
W0–24
W12–24
0
1
2
3
4
5
6
7
PP-NRS decrease (points)