

理力热统初步

理论力学初步	1
拉格朗日方程	1
哈密顿原理推拉格朗日方程	1
例子1: 一维谐振子	2
例子2: 推导反射定律	2
例题1: 滑杆球	3
例题2: 弹簧球	4
例题3: 匀速运动 的lagrange描述	4
守恒量	5
时间均匀 能量守恒	5
空间均匀 动量守恒	5
旋转对称 角动量守恒	6
有心力	7
开普勒问题	7
散射问题	9
小振动	11
一维谐振子	11
加入保守外力	11
加入摩擦力	12
势能展到三阶	13
多维谐振子	15
刚体	17
动能	17
转动惯量	17
例题: 小滚动	18
欧拉角	19
对称陀螺问题	19
哈密顿力学	21
变分法推导	21

由拉格朗日方程推导	22
例子：一维谐振子	22
例子：开普勒问题	23
例子：对称陀螺	24
泊松括号	25
例子：角动量	26
哈密顿雅可比方程	27
哈密顿雅可比方程意义	27
例子：一维谐振子	27
例子：开普勒问题	28
旧量子论	29
sommerfield量子化条件	29
一维谐振子能量量子化	29
氢原子轨道量子化及能量量子化	29
椭圆轨道	30
总结	31
统计力学初步	32
热力学第一第二定律	32
四种态函数及微分关系	32
U	32
F 赫姆霍兹自由能	32
G 吉布斯自由能	33
A 巨势	33
朗道相变 解释铁磁	34
高于 T_c 失去磁性	34
外加B磁滞回线	35
海森堡不确定原理	36
波长的两个极限情况	36
解谐振子	36
金属中电子	37
简化问题为理想费米气体	37
周期边界条件量子化	37

系综理论	38
相空间	38
微观状态数, 态密度	38
刘维尔定理	38
微正则系综 (无能量无粒子交换)	39
统计物理两大假设 (各种微观状态出现概率相等, 熵的定义)	39
一维谐振子微观状态数计算	40
理想气体应用微正则系综	40
正则系综 (能量交换, 粒子数不交换)	41
配分函数	42
与F建立联系	42
解理想气体	42
热波长热体积	43
稀磁致冷	44
麦克斯韦玻尔兹曼分布	46
双原子分子热容自由度冻结	46
巨正则系综 (能量交换粒子数交换)	48
配分函数	48
巨势	49
解理想气体	49
费米狄拉克分布, 玻色-爱因斯坦分布	50
黑体辐射 (理想光子气电磁波解)	52
玻色-爱因斯坦凝聚	56
理想费米气	57
范德华气体	59
总结	62

一. 拉格朗日力学 Lagrange Mechanics

1. Lagrange 方程的推导

Lagrange 最小作用量原理 (哈密顿原理)

实际路程取极值:



$$S = \int_A^B dt L(q, \dot{q})$$

 q_α : 广义坐标 \dot{q}_α : 广义速度 (广义速度与广义坐标不一定具有微分关系).

$$L(q, \dot{q}) = T(\text{动能}) - U(\text{势能}) \quad (\text{广泛应用})$$

$$\Delta S = S_{\text{假设}} - S_{\text{实际}}$$

$$= \int_A^B dt [L(q + \delta q, \dot{q} + \delta \dot{q}) - L(q, \dot{q})]$$

泰勒展开 $L(q + \delta q, \dot{q} + \delta \dot{q}) = L(q, \dot{q}) + \frac{\partial L}{\partial q} \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q}$

$$\delta \dot{q} = \delta \frac{d}{dt} q = \frac{d}{dt} (\delta q)$$

$$\Delta S = \int_A^B dt \left(\frac{\partial L}{\partial q} \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \frac{d}{dt} (\delta q) \right)$$

第二项分部积分 $\int_A^B dt \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \frac{d}{dt} (\delta q) \right]$

$$= \int_A^B \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} d(\delta q)$$

$$= \delta q \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \Big|_A^B - \int_A^B \delta q \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) dt$$

若 δq 出现在 A, B 处, 则起始/终止位置改变故 $\delta q(A/B) = 0$

即第一项为 0

$$\text{故 } \Delta S = \int_A^B dt \left(\frac{\partial L}{\partial q} \delta q - \delta q \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \right)$$

δq 可以出现在 A, B 间任何一处

由于假设路径与实际路径非常接近

$$\text{故 } \Delta S = 0 \text{ 即 } \int_A^B dt \left(\frac{\partial L}{\partial q} \delta q - \delta q \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \right) = \int_A^B dt \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \right) \delta q = 0$$

$$\text{即 } \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

推广到 N 自由度

$$i=1, 2, \dots, n, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (\text{Lagrange 方程})$$

二. 守恒定律

1. energy conservation \Leftrightarrow time symmetry能量守恒定律 \Leftrightarrow 时间对称性 $t \rightarrow t + \delta t$, L 不变

$$\text{即 } L(q, \dot{q}, t) = L(q, \dot{q}, t + \delta t) = L(q, \dot{q}, t) + \frac{\partial L}{\partial t} \delta t$$

$$\frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q} \frac{dq}{dt} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \frac{d\dot{q}}{dt} + \frac{\partial L}{\partial t}$$

$$\text{定义 } \boxed{p \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}} \Rightarrow \text{由 Lagrange 方程 } \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) = \frac{\partial L}{\partial q} \text{ 即 } \frac{dp}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q} = p$$

$$\frac{dL}{dt} = p \frac{dq}{dt} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \frac{d\dot{q}}{dt} + \frac{\partial L}{\partial t}$$

$$= p \dot{q} + p \frac{d\dot{q}}{dt} + \frac{\partial L}{\partial t}$$

$$= p \dot{q} + \frac{d}{dt}(p \dot{q}) - p \dot{q} + \frac{\partial L}{\partial t}$$

$$= \frac{d}{dt}(p \dot{q}) + \frac{\partial L}{\partial t} \Rightarrow -\frac{\partial L}{\partial t} = \frac{d}{dt}(p \dot{q}) - \frac{dL}{dt} = \frac{d}{dt}(p \dot{q} - L)$$

$$\text{定义哈密顿量 } H = p \dot{q} - L \quad (p \dot{q} = \sum_i p_i \dot{q}_i = p_x \dot{q}_x + p_y \dot{q}_y + p_z \dot{q}_z)$$

$$-\frac{\partial L}{\partial t} = \frac{dH}{dt}$$

$$\text{若 } \frac{\partial L}{\partial t} = 0 \Rightarrow H \text{ 不变}$$

$$L = \frac{1}{2} m \dot{q}^2 - U(q), \quad p \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = m \dot{q} \text{ (动量)}$$

$$H = p \dot{q} - L = m \dot{q}^2 - \left[\frac{1}{2} m \dot{q}^2 - U(q) \right] \\ = \frac{1}{2} m \dot{q}^2 + U(q)$$

2. spatical homogeneity \Leftrightarrow momentum conservation空间均匀性 \Leftrightarrow 动量守恒 $q_p \rightarrow q_p + \delta q_p$, L 不变

$$L(q_p + \delta q_p, \dot{q}_p, t) - L(q_p, \dot{q}_p, t) = \frac{\partial L}{\partial q_p} \delta q_p = 0 \Rightarrow \frac{\partial L}{\partial q_p} = 0$$


$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_p} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_p} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_p} \right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_p} = p_p \text{ 不变}$$

Harmonic oscillation

有耗 $\omega \rightarrow \omega_0$ 时, $\xi \rightarrow +\infty$

solution ① dissipation due to friction (摩擦力引起耗散)

② unharmonic oscillation (展开到更高阶项)



$$U = U(p=p_0) + \frac{1}{2}k(p-p_0)^2 + \frac{1}{6}\beta(p-p_0)^3 + o(p-p_0)$$

$$L = \frac{1}{2}m\dot{p}^2 - \frac{1}{2}k(p-p_0)^2 - \frac{1}{6}\beta(p-p_0)^3$$

(define $\frac{d^2}{dp^2}|_{p=p_0} = k, \frac{d^3}{dp^3}|_{p=p_0} = \beta$)

define $\xi = p - p_0, \dot{\xi} = \dot{p}$

$$L = \frac{1}{2}m\dot{\xi}^2 - \frac{1}{2}k\xi^2 - \frac{1}{6}\beta\xi^3$$

$$\frac{\partial L}{\partial \xi} = -k\xi - \frac{1}{2}\beta\xi^2, \frac{\partial L}{\partial \dot{\xi}} = m\dot{\xi}, \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\xi}}\right) = m\ddot{\xi}$$

Lagrange equation $\Rightarrow m\ddot{\xi} = -k\xi - \frac{1}{2}\beta\xi^2$

即 $\ddot{\xi} + \omega_0^2\xi + \frac{1}{2}\bar{\beta}\xi^2 = 0$ (*)

($\omega_0^2 = \frac{k}{m}, \bar{\beta} = \frac{\beta}{m}$) 很小, 则展开无意义

微扰展开 (由于 $\bar{\beta}$ 很小, ξ 可对 $\bar{\beta}$ 幂级数展开)

$$\xi = \bar{\beta}^{(0)}\xi^{(0)} + \bar{\beta}^{(1)}\xi^{(1)} + \bar{\beta}^{(2)}\xi^{(2)} + \dots$$

$\bar{\beta}^{(0)} \approx 1$ $\Rightarrow \xi = \xi^{(0)} + \bar{\beta}\xi^{(1)} + \bar{\beta}^2\xi^{(2)} + \dots$

略去大于2阶 $\xi = \xi^{(0)} + \bar{\beta}\xi^{(1)} + \bar{\beta}^2\xi^{(2)}$

代入(*) $\bar{\beta}^{(0)}\ddot{\xi}^{(0)} + \bar{\beta}\ddot{\xi}^{(1)} + \bar{\beta}^2\ddot{\xi}^{(2)}$

$+ \omega_0^2(\bar{\beta}^{(0)}\xi^{(0)} + \bar{\beta}\xi^{(1)} + \bar{\beta}^2\xi^{(2)})$

$+ \frac{1}{2}\bar{\beta}(\bar{\beta}^{(0)}\xi^{(0)} + 2\bar{\beta}^{(1)}\xi^{(0)}\xi^{(1)} + \bar{\beta}^{(2)}\xi^{(0)}\xi^{(0)}) = 0$ 略去二次项

化简 $\bar{\beta}^{(0)}[\ddot{\xi}^{(0)} + \omega_0^2\xi^{(0)}] + \bar{\beta}^{(1)}[\ddot{\xi}^{(1)} + \omega_0^2\xi^{(1)} + \frac{1}{2}\xi^{(0)}\ddot{\xi}^{(0)}]$

$+ \bar{\beta}^{(2)}[\ddot{\xi}^{(2)} + \omega_0^2\xi^{(2)}] = 0$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \Rightarrow \frac{2}{3}m\ddot{\theta}R - mgR\sin\theta = \frac{2}{3}m\ddot{\theta}R^2$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{2g}{3R}\sin\theta = 0$$



$$\theta \ll 1 \Rightarrow \sin\theta \approx \theta \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{2g}{3R}\theta = 0$$

$$\omega_0^2 = \frac{2g}{3R}, \omega_0 = \sqrt{\frac{2g}{3R}}$$

陀螺运动

Eulerian angles 欧拉角

主要是描述对称陀螺 symmetric top 三个角运动



平面 $x'y' \perp z'$, θ 为 z 与 z' 夹角

设 ON 为平面 $x'y'$ 与平面 xy 的交线

$$\Rightarrow ON \perp z', ON \perp z$$

$\dot{\theta}$ 以 ON 为旋转轴

$\dot{\varphi}$ 以 z 为旋转轴

$\dot{\psi}$ 以 z' 为旋转轴


将 $\dot{\theta}, \dot{\varphi}, \dot{\psi}$ 投影到 $x'y'$ 平面上

$$\omega_z = \cos\theta \dot{\varphi} + \dot{\psi}$$

$$\omega_{x'} = \cos\psi \dot{\theta} + \sin\psi (\dot{\varphi} \sin\theta)$$

$$\omega_{y'} = -\sin\psi \dot{\theta} + \cos\psi (\dot{\varphi} \sin\theta)$$

投影



在 $x'y'z'$ 坐标下

$$I = \begin{pmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{pmatrix}$$

1. Hamilton-Jacobi equation 哈密顿-贾可比方程

$$S = \int_A^B L(q_i, \dot{q}_i) dt$$

$$L = \frac{ds}{dt}$$

$$\Delta S = \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \Delta q_i \right|_A^B + \int_A^B \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right] \Delta q_i dt$$

假设A固定, B不固定 $\Rightarrow \Delta q_i|_{q=A} = 0$

由Lagrange equation知第二项为0

$$\text{故 } \Delta S = \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \Delta q_i \right|_{q=B} - 0 = \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \Delta q_i \right|_{q=B}$$

$$\text{又 } \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = p_i, \text{ 且 } \frac{\partial S}{\partial q_i} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = p_i$$

$$L = \frac{dS}{dt} \quad (S = S(q_i, t))$$

$$= \frac{\partial S}{\partial q_i} \frac{dq_i}{dt} + \frac{\partial S}{\partial t}$$

$$= p_i \dot{q}_i + \frac{\partial S}{\partial t} \Rightarrow -\frac{\partial S}{\partial t} = p_i \dot{q}_i - L \text{ 即 } -\frac{\partial S}{\partial t} = H(q_i, p_i, t)$$

$$\begin{cases} \vec{p} = \nabla S \text{ (梯度)} \\ H = E \text{ (能量)} = -\frac{\partial S}{\partial t} \end{cases}$$

$$(\vec{p}, E) = (\nabla S, -\frac{\partial S}{\partial t})$$

做等S线, S线的极值 \Rightarrow 运动方向

$$\Delta \text{ 静电场 } \vec{E} = -\nabla \varphi$$

粒子看作 $\lambda \rightarrow \infty$ 的波

e.g. 在Harmonic oscillator中

$$-\frac{\partial S}{\partial t} = H = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{1}{2} k x^2$$


$$p_x = \frac{\partial S}{\partial x} \Rightarrow -\frac{\partial S}{\partial t} = \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

$$\text{猜测 } S = -E_0 t + S_1(x) ; \frac{\partial S}{\partial t} = -E_0, \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^2 = \left(\frac{dS_1}{dx} \right)^2$$

$$\text{故 } E_0 = \frac{1}{2m} \left(\frac{dS_1}{dx} \right)^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

$$\Rightarrow \frac{dS_1}{dx} = \sqrt{(E_0 - \frac{1}{2} k x^2) 2m}$$

Dilute Magnetism Cooling: 稀磁制冷



μ_B 为玻尔磁矩, $\mu_B = 9.27 \times 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$

$$H = - \sum_i \mu_B \cdot B \cdot n_i \quad (n_i = 1 \text{ 或 } -1) \quad \text{与向上自旋时 } n_i = 1, \uparrow < 0$$

$$N \text{ 个 Fe 原子, } Z = \sum_i \Omega(\epsilon_i) e^{-\beta \epsilon_i}$$

	$\Omega(\epsilon_i)$	ϵ_i
$\uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow$	1	$-N\mu_B B$
$\uparrow \downarrow \cdots \uparrow \uparrow$	N	$-(N-2)\mu_B B$
$\uparrow \downarrow \downarrow \cdots \uparrow \uparrow$	$\frac{N(N-1)}{2}$	$-(N-4)\mu_B B$
\vdots	\vdots	\vdots
$\downarrow \downarrow \cdots \downarrow \downarrow$	1	$N\mu_B B$


$$Z = \sum_i \Omega(\epsilon_i) e^{-\beta \epsilon_i}$$

$$= 1 \cdot e^{\beta N \mu_B B} + N \cdot e^{\beta (N-2) \mu_B B} + \frac{N(N-1)}{2} e^{\beta (N-4) \mu_B B} + \cdots + 1 \cdot e^{-\beta N \mu_B B}$$

$$= (e^{\beta \mu_B B} + e^{-\beta \mu_B B})^N, \ln Z = N \ln (e^{\beta \mu_B B} + e^{-\beta \mu_B B}) = N \ln [2 \cosh(\beta \mu_B B)]$$


$$F = -k_B T \ln Z = -N k_B T \ln [2 \cosh(\frac{\mu_B B}{k_B T})]$$

$$dF = -S dT - M dB, \quad E = k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} (\ln Z)$$





$$= k_B T^2 \frac{\sinh(\beta \mu_B B)}{\cosh(\beta \mu_B B)} \cdot (-\frac{\mu_B B}{k_B T^2})$$

$$= -N \mu_B B \tanh(\frac{\mu_B B}{k_B T})$$



黑体辐射

 \Leftrightarrow 

黑体辐射等效

Ideal gas of quantum version of Bose gas

量子力学的理想气体 \rightarrow 光子 gas photons

photons model:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad ①$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad ② \quad \text{真空中 } \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0}, \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}, \vec{j} = 0$$

$$\text{由 } ① \quad \nabla \times \nabla \times \vec{E} = -\nabla \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \mu_0 \epsilon_0 = \frac{1}{c^2}$$

$$\text{由 } ② \quad \nabla \times \frac{\vec{B}}{\mu_0} = \frac{\partial \epsilon_0 \vec{E}}{\partial t} \quad \text{即 } \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\text{故 } \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{B}) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow \nabla \times \nabla \times \vec{E} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\text{波动方程 } \vec{E} = \vec{E}_0 e^{i\vec{k} \cdot \vec{r} - i\omega t}$$

$$\text{代入 } \nabla \times \nabla \times \vec{E} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \text{ 可得 } i\vec{k} \times i\vec{k} \times \vec{E}_0 = -\frac{1}{c^2} (i\omega)^2 \vec{E}_0 = \frac{\omega^2}{c^2} \vec{E}_0$$

$$2) \Rightarrow \omega^2 = c^2 k^2, \omega = ck, E = \hbar \omega = \hbar ck$$

周期性边界条件 $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r} + \vec{L}, t)$, L 为 size of cavity 3 个边大小
 $e^{i\vec{k} \cdot \vec{r} - i\omega t} = e^{i\vec{k} \cdot (\vec{r} + \vec{L}) - i\omega t}$

$$\Rightarrow e^{i\vec{k} \cdot \vec{L}} = 1 \quad \text{即 } \vec{k} \cdot \vec{L} = 2\pi \cdot n \quad (n=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\text{故 } k_x L = 2\pi n_x, k_y L = 2\pi n_y, k_z L = 2\pi n_z$$

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{L} (n_x, n_y, n_z), (n_x, n_y, n_z = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\hat{Z} = \prod_i \left[\frac{1}{1 - e^{-\beta \epsilon_i}} \right] = \prod_i \left[\frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar c k_i}} \right]$$

Bose-Einstein condensation 玻色-爱因斯坦凝聚

$$\hat{H} = \sum_i \frac{p_i^2}{2m}, \quad p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi} \cdot \frac{2\pi}{\lambda} = \hbar k$$

$$\text{故 } \hat{H} = \sum_i \frac{(\hbar k_i)^2}{2m} = E, \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \Delta k = \frac{\sqrt{2m}}{2\hbar} \cdot \frac{\Delta E}{\sqrt{E}}$$

$$\Delta n = \frac{4\pi k^2 \Delta k}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3} = \frac{L^3 4\pi \frac{1}{2} m E \cdot \frac{\sqrt{2m}}{2\hbar} \frac{\Delta E}{\sqrt{E}}}{28\pi^3 \hbar^3}$$

$$D(E) = \frac{\Delta n}{\Delta E} = \frac{L^3 \sqrt{2m} \cdot m \sqrt{E}}{2\pi^2 \hbar^3} = \frac{V (2m)^{\frac{3}{2}}}{4\pi^2 \hbar^3} \sqrt{E} = C \sqrt{E}$$

$$\text{对于 Boson 气体 } A = k_B T \ln \tilde{Z} = k_B T \sum_E \ln(1 - e^{-\beta(E-\mu)}) \\ = k_B T \int_0^\infty dE [D(E) \ln(1 - e^{-\beta(E-\mu)})]$$

$$dA = -SdT - pdV - Nd\mu$$

$$N = -\frac{dA}{d\mu} = k_B T \int_0^\infty dE [D(E) \frac{e^{-\beta(E-\mu)}}{1 - e^{-\beta(E-\mu)}}]$$

$$= \int_0^\infty dE \sqrt{E} \frac{e^{\beta(E-\mu)}}{1 - e^{-\beta(E-\mu)}} = \int_0^\infty \frac{C \sqrt{E}}{e^{\beta(E-\mu)} - 1} dE$$

$$f^{BE} = \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)} - 1}$$

$$E=0 \text{ 时, } f(E=0) = \frac{1}{e^{-\beta\mu} - 1} \text{ (平均粒子数 } > 0) \Rightarrow e^{-\beta\mu} - 1 = e^{-(k_B T)^{-1} \mu} - 1 > 0$$

$$\Rightarrow \mu < 0$$

$$\text{再看 } N = \int_0^\infty dE \frac{C \sqrt{E}}{e^{\beta(E-\mu)} - 1}, \text{ 其中 } e^{\beta(E-\mu)} = \underbrace{e^{\beta E}}_{>1} \cdot \underbrace{e^{-\beta\mu}}_{>1} > 1, \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)} - 1} \text{ 收敛}$$

$$\text{令 } x = \beta E, N = \int_0^\infty \frac{C \sqrt{x}}{e^{x-\beta\mu} - 1} d\frac{x}{\beta} = \frac{1}{\beta^{\frac{3}{2}}} \int_0^\infty \frac{C \sqrt{x}}{e^{x-\beta\mu} - 1} dx = (k_B T)^{\frac{3}{2}} M$$

有限大小的盒子

$$T \rightarrow 0 \text{ 时, } N = (k_B T)^{\frac{3}{2}} \cdot M \rightarrow 0 \text{ 平均粒子数不可能为 } 0$$


$$\text{当 } \mu = 0 \text{ 时, } f^{BE}(E=0) = \frac{1}{e^{0} - 1} = \text{" } \frac{1}{0} \text{ 型"}$$

$$n(T) = n \left[1 - \left(\frac{T}{T_C} \right)^{\frac{3}{2}} \right]$$

$$N = N_0 + (k_B T)^{\frac{3}{2}} M = \frac{1}{e^{-\beta\mu} - 1} + (k_B T)^{\frac{3}{2}} M$$

绝对零度下玻色粒子全部处在 $E=0$ 的最低能级

25




$$U = A + TS + MN = A - T \frac{\partial A}{\partial T} - M \frac{\partial A}{\partial M} = \int_0^\infty \frac{dE E}{e^{\beta(E-\mu)} + 1} dE$$

$$\Rightarrow PV = \frac{2}{3}U$$


$$\text{当 } T \rightarrow 0 \text{ 时 } U \rightarrow E_F \cdot N, PV = \frac{2}{3} E_F N$$

Interaction System 互作用系统

Van der waal gas 范德瓦耳气体



具有二体互作用的有限大体积的气体
将相对运动势能曲线简化



$$U_m = \begin{cases} +\infty & (r < a_0) \\ -|U_0| & (a_0 \leq r < b_0) \\ 0 & (r \geq b_0) \end{cases}$$

哈密顿量 $H = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m} + \sum_{i,j} U_m(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)$

正则系综

$$Z = \sum_{\{i\}} \int d\vec{r}_i \dots d\vec{r}_N e^{-\beta H} = \frac{\int \dots \int d\vec{r}_1 \dots d\vec{r}_N d\vec{p}_1 \dots d\vec{p}_N e^{-\beta \left(\sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m} + \sum_{i,j} U_m(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|) \right)}}{h^{3N} \cdot N!}$$

$$= \frac{1}{h^{3N} \cdot N!} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}} Z_C$$

$$Z_C = \int \dots \int d\vec{r}_1 \dots d\vec{r}_N e^{-\beta \sum_{i,j} U_m(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)}$$

$$= \int \dots \int d\vec{r}_1 \dots d\vec{r}_N \prod_{i,j} e^{-\beta U_m(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)}$$

$$\text{令 } f_{ij} = e^{-\beta U_m(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)} - 1$$

$$Z_C = \int \dots \int d\vec{r}_1 \dots d\vec{r}_N \prod_{i,j} (1 + f_{ij})$$

$$\prod_{i,j} (1 + f_{ij}) = (1 + f_{12})(1 + f_{13}) \dots (1 + f_{1N})$$

$$\times (1 + f_{23}) \dots (1 + f_{2N})$$

$$\times (1 + f_{N+1,N}) \dots$$

$$\begin{aligned}
 F &= -k_B T \ln Z = -k_B T \ln [Z_{\text{ideal}} \cdot (1 + \frac{N^2}{2V} I_1)] \\
 &= -k_B T \ln(Z_{\text{ideal}}) - k_B T \ln(1 + \frac{N^2}{2V} I_1) \\
 &= -k_B T \ln(Z_{\text{ideal}}) - k_B T \frac{N^2}{2V} I_1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 dF &= -SdT - pdV \\
 p &= -\frac{\partial F}{\partial V} = k_B T \frac{\frac{\partial Z_{\text{ideal}}}{\partial V}}{Z_{\text{ideal}}} + k_B T \frac{\frac{\partial}{\partial V} (\frac{N^2}{2V} I_1)}{1 + \frac{N^2}{2V} I_1}
 \end{aligned}$$

$$= k_B T \frac{()^{N/V+1}}{()^{N/V}} - \frac{k_B T N^2}{2V^2} I_1 = \frac{N k_B T}{V} - \frac{k_B T N^2}{2V^2} I_1$$

$$= \frac{N k_B T}{V} - \frac{k_B T N^2}{2V^2} (-V_0 + \beta U_0 V I_1)$$

$$= \frac{N k_B T}{V} + \frac{k_B T N^2}{2V^2} V_0 - k_B T \beta \frac{U_0 V I_1 N^2}{2V^2}$$

$$\text{故 } p + \frac{U_0 V I_1 N^2}{2V^2} = \frac{N k_B T}{V} + \frac{k_B T N^2 V_0}{2V^2} \quad N U_0 = \frac{1}{2} \text{ (气体体积)}$$

$$= \frac{N k_B T}{V} (1 + \frac{N V_0}{2V}) = \frac{N k_B T}{V} (1 + \frac{V_2}{2V})$$


$$x \rightarrow 0 \text{ 时, } 1+x = \frac{1}{1-x}, \quad p + \frac{U_0 V I_1 N^2}{2V^2} = \frac{N k_B T}{V} (1 - \frac{V_2}{2V})$$

$$\text{即 } p + \frac{N^2}{V^2} \frac{U_0 V I_1}{2} = \frac{N k_B T}{V - \frac{V_2}{2}} \text{ 即 } (p + \frac{N^2}{V^2} \frac{V_2}{2} U_0) (V - \frac{V_2}{2}) = N k_B T$$

$$\Rightarrow (p + p')(V - \frac{V_2}{2}) = N k_B T$$

$$(p + \frac{m^2 a}{4V^2})(V - \frac{m}{M} b) = \frac{m}{M} RT \quad (\text{范德瓦耳斯气体方程})$$

Ising Model 伊辛模型



(1) 只有两种自旋状态 \uparrow, \downarrow $S_i \in \{\uparrow, \downarrow\}$

(2) 每个自旋只与最近的4个自旋有相互作用

$$H = -J \sum_{\langle i, j \rangle} \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j - \vec{B} \cdot \mu_B \sum_i \vec{S}_i$$

μ_B 玻尔磁子

$J > 0$ 铁磁性

$J < 0$ 反铁磁性