

理力热统初步

理论力学初步	1
拉格朗日方程	1
哈密顿原理推拉格朗日方程	1
例子1：一维谐振子	2
例子2：推导反射定律	2
例题1：滑杆球	3
例题2：弹簧球	4
例题3：匀速运动 的lagrange描述	4
守恒量	5
时间均匀 能量守恒	5
空间均匀 动量守恒	5
旋转对称 角动量守恒	6
有心力	7
开普勒问题	7
散射问题	9
小振动	11
一维谐振子	11
加入保守外力	11
加入摩擦力	12
势能展到三阶	13
多维谐振子	15
刚体	17
动能	17
转动惯量	17
例题：小滚动	18
欧拉角	19
对称陀螺问题	19
哈密顿力学	21
变分法推导	21

由拉格朗日方程推导	22
例子：一维谐振子	22
例子：开普勒问题	23
例子：对称陀螺	24
泊松括号	25
例子：角动量	26
哈密顿雅可比方程	27
哈密顿雅可比方程意义	27
例子：一维谐振子	27
例子：开普勒问题	28
旧量子论	29
sommerfield量子化条件	29
一维谐振子能量量子化	29
氢原子轨道量子化及能量量子化	29
椭圆轨道	30
总结	31
统计力学初步	32
热力学第一第二定律	32
四种态函数及微分关系	32
U	32
F 赫姆霍兹自由能	32
G 吉布斯自由能	33
A 巨势	33
朗道相变 解释铁磁	34
高于Tc失去磁性	34
外加B磁滞回线	35
海森堡不确定原理	36
波长的两个极限情况	36
解谐振子	36
金属中电子	37
简化问题为理想费米气体	37
周期边界条件量子化	37


系综理论	38
相空间	38
微观状态数, 态密度	38
刘维尔定理	38
微正则系综 (无能量无粒子交换)	39
统计物理两大假设 (各种微观状态出现概率相等, 熵的定义)	39
一维谐振子微观状态数计算	40
理想气体应用微正则系综	40
正则系综 (能量交换, 粒子数不交换)	41
配分函数	42
与F建立联系	42
解理想气体	42
热波长热体积	43
稀磁致冷	44
麦克斯韦玻尔兹曼分布	46
双原子分子热容自由度冻结	46
巨正则系综 (能量交换粒子数交换)	48
配分函数	48
巨势	49
解理想气体	49
费米狄拉克分布, 玻色-爱因斯坦分布	50
黑体辐射 (理想光子气电磁波解)	52
玻色-爱因斯坦凝聚	56
理想费米气	57
范德华气体	59
总结	62

一、拉格朗日力学 Lagrange Mechanics

1) Lagrange 方程的推导

Lagrange 最小作用量原理 (哈密顿原理)

实际路程取极值



$$S = \int_A^B dt L(q_i, \dot{q}_i)$$

q_i :广义坐标 \dot{q}_i :广义速度 (广义速度与广义坐标互为微分关系).

$$L(q_i, \dot{q}_i) = T(\text{动能}) - U(\text{势能}) \quad (\text{广泛运用})$$

$$\Delta S = S_{\text{假设}} - S_{\text{实际}}$$

$$= \int_A^B dt [L(q_i + \delta q_i, \dot{q}_i + \delta \dot{q}_i) - L(q_i, \dot{q}_i)]$$

泰勒展开

$$L(q_i + \delta q_i, \dot{q}_i + \delta \dot{q}_i) = L(q_i, \dot{q}_i) + \frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i$$

$$\delta \dot{q}_i = \delta \frac{d}{dt} q_i = \frac{d}{dt} (\delta q_i)$$

$$\Delta S = \int_A^B dt \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} (\delta q_i) \right)$$

$$\text{第二项为零} \quad \int_A^B dt \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} (\delta q_i) \right]$$

$$= \int_A^B \frac{\partial L}{\partial q_i} d(\delta q_i)$$

$$= \delta q_i \frac{\partial L}{\partial q_i} \Big|_A^B - \int_A^B \delta q_i \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) dt$$

若 δq_i 出现在 A, B 处, 则起始/终了位置改变故 $\delta q_i(A/B) = 0$

即第一项为 0

$$\text{故 } \Delta S = \int_A^B dt \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i - \delta q_i \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right)$$

δq_i 可以出现在 A, B 间任何一处

由于猜想路径与实际路径非常接近

$$\therefore \Delta S = 0 \text{ 即 } \int_A^B dt \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i - \delta q_i \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right) = \int_A^B dt \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right) \delta q_i = 0$$

$$\text{即 } \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

推广到 n 个自由度

$$i=1, 2, \dots, n, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (\text{Lagrange 方程})$$

二、守恒定律

1. energy conservation (\Rightarrow time symmetry)

能量守恒定律 (\Leftrightarrow 时间对称性)

$t \rightarrow t + \delta t$, L 不变

$$\text{即 } L(q, \dot{q}, t) = L(q, \dot{q}, t + \delta t) = L(q, \dot{q}, t) + \frac{\partial L}{\partial t} \delta t$$

$$\frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{dq_i}{dt} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d\dot{q}_i}{dt} + \frac{\partial L}{\partial t}$$

$$\text{由 } p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \Rightarrow \text{由 Lagrange 方程 } \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{\partial L}{\partial q_i} \text{ 即 } \frac{dp}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q_i} = p$$

$$\frac{dL}{dt} = p \frac{dq_i}{dt} + \frac{\partial L}{\partial t}$$

$$= \dot{p} \dot{q}_i + p \frac{dq_i}{dt} + \frac{\partial L}{\partial t} \quad p \frac{dq_i}{dt} = \frac{d}{dt}(p \dot{q}_i) - \dot{q}_i \frac{dp}{dt} = \frac{d}{dt}(p \dot{q}_i) - \dot{q}_i p$$

$$= \dot{p} \dot{q}_i + \frac{d}{dt}(p \dot{q}_i) - \dot{p} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial t}$$

$$= \frac{d}{dt}(p \dot{q}_i) + \frac{\partial L}{\partial t} \Rightarrow -\frac{\partial L}{\partial t} = \frac{d}{dt}(p \dot{q}_i) - \frac{dL}{dt} = \frac{d}{dt}(p \dot{q}_i - L)$$

定义哈密顿量 $H = p \dot{q}_i - L$ ($p \dot{q}_i = \sum_i p_i \dot{q}_i = p_x \dot{q}_x + p_y \dot{q}_y + p_z \dot{q}_z$)

$$-\frac{\partial L}{\partial t} = \frac{d}{dt} H$$

若 $\frac{\partial L}{\partial t} = 0 \Rightarrow H$ 不变

$$L = \frac{1}{2} m \dot{q}_i^2 - U(q_i), \quad p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = m \dot{q}_i (\text{总动量})$$

$$H = p \dot{q}_i - L = m \dot{q}_i^2 - [\frac{1}{2} m \dot{q}_i^2 - U(q_i)]$$

$$= \frac{1}{2} m \dot{q}_i^2 + U(q_i)$$

2. spatial homogeneity (\Rightarrow momentum conservation)

空间对称性 (\Rightarrow 动量守恒)

$q_\beta \rightarrow q_\beta + \delta q_\beta$, L 不变

$$L(q_\beta + \delta q_\beta, \dot{q}_\beta, t) - L(q_\beta, \dot{q}_\beta, t) = \frac{\partial L}{\partial q_\beta} \delta q_\beta = 0 \Rightarrow \frac{\partial L}{\partial q_\beta} = 0$$


$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\beta} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_\beta} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\beta} \right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\beta} = P_\beta \text{ 不变}$$

Harmonic oscillation

有关 $\omega \rightarrow \omega_0$, $\xi \rightarrow +\infty$

Solution ① dissipation due to friction / 摩擦力引起耗散

② unharmonic oscillation (展开到更高阶项)



$$U = U(p=p_0) + \frac{1}{2}k(p-p_0)^2 + \frac{1}{3}\beta(p-p_0)^3 + O(p-p_0)^4$$

$$L = \frac{1}{2}m\dot{p}^2 - \frac{1}{2}k(p-p_0)^2 - \frac{1}{6}\beta(p-p_0)^3$$

(define $\frac{d^2}{dp^2}|_{p=p_0} = k$, $\frac{d^3}{dp^3}|_{p=p_0} = \beta$)

define $\xi = p - p_0$, $\dot{\xi} = \dot{p}$

$$L = \frac{1}{2}m\dot{\xi}^2 - \frac{1}{2}k\xi^2 - \frac{1}{6}\beta\xi^3$$

$$\frac{\partial L}{\partial \xi} = -k\xi - \frac{1}{2}\beta\xi^2, \frac{\partial L}{\partial \dot{\xi}} = m\dot{\xi}, \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\xi}}\right) = m\ddot{\xi}$$

$$\text{Lagrange equation} \Rightarrow m\ddot{\xi} = -k\xi - \frac{1}{2}\beta\xi^2$$

$$m\ddot{\xi} + \omega_0^2\xi + \frac{1}{2}\beta\xi^2 = 0 \quad (*)$$

($\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, $\beta = \frac{\beta}{m}$) 很小而做展开意义

微扰论展开 (由于 β 很小, 可对 β 展开)

$$\xi = \bar{\beta}^{(0)}\xi^{(0)} + \bar{\beta}^{(1)}\xi^{(1)} + \bar{\beta}^{(2)}\xi^{(2)} + \cancel{\xi^{(n)}} \quad (\text{高阶})$$

$$\bar{\beta}^{(0)} \approx 1 \quad \Leftarrow \bar{\beta}^{(0)}\xi^{(0)} + \bar{\beta}\xi^{(1)} + \bar{\beta}^{(2)}\xi^{(2)}$$

$$\text{略去大于 } 2\pi/\lambda \quad \xi^2 = \bar{\beta}^{(0)}\xi^{(0)}_2 + 2\bar{\beta}^{(1)}\xi^{(0)}\xi^{(1)}$$

$$(E\lambda/2\pi) \quad \bar{\beta}^{(0)}\xi^{(1)} + \bar{\beta}\xi^{(1)} + \bar{\beta}^{(2)}\xi^{(2)}$$

$$+ \omega_0^2(\bar{\beta}^{(0)}\xi^{(0)} + \bar{\beta}\xi^{(1)} + \bar{\beta}^{(2)}\xi^{(2)})$$

$$+ \frac{1}{2}\beta(\bar{\beta}^{(0)}\xi^{(0)}_2 + 2\bar{\beta}^{(1)}\xi^{(0)}\xi^{(1)}) = 0 \quad (\text{略去二次项})$$

$$\text{代入 } \bar{\beta}^{(0)}[\xi^{(0)} + \omega_0^2\xi^{(0)}] + \bar{\beta}^{(1)}[\xi^{(1)} + \omega_0^2\xi^{(1)} + \frac{1}{2}\xi^{(0)}\beta]$$

$$+ \bar{\beta}^{(2)}[\xi^{(2)} + \omega_0^2\xi^{(2)}] = 0$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \quad \text{即 } -mgR\sin\theta = \frac{3}{2}m\ddot{\theta}R^2$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{2g}{3R}\sin\theta = 0$$



$$\theta \text{ 为常数} \Rightarrow \sin\theta = 0 \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{2g}{3R}\theta = 0$$

$$\omega_0^2 = \frac{2g}{3R}, \omega_0 = \sqrt{\frac{2g}{3R}}$$

陀螺运动

Eulerian angles 欧拉角

主要是描述对称陀螺 symmetric top 三个角运动




将 θ, ϕ, ψ 投影到 $x'y'$ 平面上

$$w_z^* = \underline{\cos\theta \cdot \dot{\psi} + \dot{\phi}}$$

$$w_x^* = \cos\psi \cdot \dot{\theta} + \sin\psi (\dot{\phi} \sin\theta)$$

$$w_y^* = -\sin\psi \cdot \dot{\theta} + \cos\psi (\dot{\phi} \sin\theta)$$



在 $x'y'$ 坐标下

$$I = \begin{pmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & I_{xx} \end{pmatrix}$$

A. Hamilton-Jacobi equation 哈密顿-雅可比方程

$$S = \int L(q_i, \dot{q}_i) dt \quad A \quad L = \frac{ds}{dt}$$

$$\Delta S = \left. \frac{\partial L}{\partial q_i} \Delta q_i \right|_A^B + \int_A^B \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right] \Delta \dot{q}_i dt$$

$$\text{假设 } A \text{ 固定, } B \text{ 不固定} \Rightarrow \Delta q_i|_{q_i=B} = 0$$

由 Lagrange equation 知第二项为 0

$$T \Delta S = \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \Delta \dot{q}_i \right|_{q_i=B} - 0 = \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right|_{q_i=B} \Delta \dot{q}_i$$

$$x \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = p_i, \text{ 且 } \frac{\partial S}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = p_i$$

$$L = \frac{ds}{dt} \quad (S = (q_i, t))$$

$$= \frac{\partial S}{\partial q_i} \frac{dq_i}{dt} + \frac{\partial S}{\partial t}$$

$$= p_i \dot{q}_i + \frac{\partial S}{\partial t} \Rightarrow -\frac{\partial S}{\partial t} = p_i \dot{q}_i - L \text{ 即 } -\frac{\partial S}{\partial t} = H(q_i, p_i, t)$$

哈密顿-雅可比方程

$$\left\{ \vec{p} = \nabla S \text{ (动量)} \right.$$

$$\left. H = E \text{ (能量)} = -\frac{\partial S}{\partial t} \right.$$

$$(\vec{p}, E) = (\nabla S, -\frac{\partial S}{\partial t})$$

做等 S 线, S 线的极值 \Rightarrow 运动方向

$$\triangle \text{ 静电场 } \vec{E} = -\nabla \psi$$

粒子看作 $\lambda \rightarrow \infty$ 的波

e.g. \ddot{x} Harmonic oscillator

$$-\frac{\partial S}{\partial t} = H = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{1}{2} k x^2$$


$$p_x = \frac{\partial S}{\partial x} \Rightarrow -\frac{\partial S}{\partial t} = \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

$$\text{猜测 } S = -E_0 t + S_1(x); \frac{\partial S}{\partial t} = E_0, \frac{\partial S}{\partial x} = \left(\frac{\partial S_1}{\partial x} \right)^2$$

$$\text{故 } E_0 = \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S_1}{\partial x} \right)^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

$$\Rightarrow \frac{ds_1}{dx} = \sqrt{(E_0 - \frac{1}{2} k x^2) 2m}$$

Dilute Magnetism Cooling: 稀磁制冷



$$\mu_B \text{ 为玻尔磁矩, } \mu_B = 9.27 \times 10^{-24} \text{ J.T}^{-1}$$

$$H = - \sum_i \mu_B \cdot B \cdot n_i \quad (n_i = 1 \text{ 或 } -1) \quad \text{当向上自旋时, } n_i = 1 > 0$$

$$NiFe 原子, Z = \sum_i \ln(\varepsilon_i) e^{-\beta \varepsilon_i}$$

$$\sum_i \varepsilon_i \quad \varepsilon_i$$

$$\uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow \quad 1 \quad -N\mu_B B$$

$$\uparrow \downarrow \cdots \uparrow \uparrow \quad N \quad -(N/2)\mu_B B$$

$$\uparrow \downarrow \downarrow \cdots \uparrow \uparrow \quad \frac{N(N-1)}{2} \quad -(N/4)\mu_B B$$

$$\vdots \quad \vdots$$

$$\downarrow \downarrow \cdots \downarrow \downarrow \quad 1 \quad N\mu_B B$$

$$Z = \sum_i \ln(\varepsilon_i) e^{-\beta \varepsilon_i}$$

$$= 1 \cdot e^{\beta N\mu_B B} + N \cdot e^{\beta (N/2)\mu_B B} + \cdots + 1 \cdot e^{-\beta N\mu_B B}$$


$$= (e^{\beta N\mu_B B} + e^{-\beta N\mu_B B})^N, \ln Z = N \ln(e^{\beta N\mu_B B} + e^{-\beta N\mu_B B}) = N \ln[\cosh(\beta N\mu_B B)]$$

$$F = -k_B T / n Z = -N k_B T / n [\cosh(\beta N\mu_B B)]$$


$$dF = -SdT - \chi dB, E = k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} (\ln Z)$$

$$\tanh(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = k_B T^2 \frac{\sinh(\beta N\mu_B B)}{\cosh(\beta N\mu_B B)} \cdot \left(-\frac{\mu_B B}{k_B T}\right)$$

$$= -N\mu_B B \tanh\left(\frac{\mu_B B}{k_B T}\right)$$



黑体辐射



黑体辐射模型

Ideal gas of quantum version of boson gas

量子力学化的理想气体 → 光子体 photons

photons model:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B} \quad \text{①}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial}{\partial t} \vec{D} \quad \text{②} \quad \text{真空中 } \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0}, \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}, \vec{j} = 0$$

$$\text{由① } \nabla \times \nabla \times \vec{E} = -\nabla \times \frac{\partial}{\partial t} \vec{B} \quad \mu_0 \epsilon_0 = \frac{1}{c^2}$$

$$\text{由② } \nabla \times \frac{\vec{B}}{\mu_0} = \frac{\partial}{\partial t} \epsilon_0 \vec{E} \quad \vec{B}_0 = \mu_0 \sum \frac{\partial}{\partial t} \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \vec{E}$$

$$\text{故 } \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{B}) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{E}$$

$$\Rightarrow \nabla \times \nabla \times \vec{E} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{E}$$

波动方程 $\vec{E} = E_0 e^{i\vec{k}\cdot\vec{r} - i\omega t}$

$$\text{由 } \lambda \nabla \times \nabla \times \vec{E} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{E} \quad \text{得 } i\vec{k} \times i\vec{k} \times \vec{E}_0 = -\frac{1}{c^2} (i\omega)^2 \vec{E}_0 = \frac{\omega^2}{c^2} \vec{E}_0$$

$$\Rightarrow \omega^2 = -c^2 k^2, \omega = ck, E = \hbar \omega = \hbar c k$$

周期性边界条件 $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r} + \vec{L}, t)$, \vec{L} size of cavity 3维大小

$$e^{i\vec{k} \cdot \vec{r} - i\omega t} = e^{i\vec{k} \cdot (\vec{r} + \vec{L}) - i\omega t}$$

$$\Rightarrow e^{i\vec{k} \cdot \vec{L}} = 1 \quad \vec{k} \cdot \vec{L} = 2\pi \cdot n \quad (n=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\text{故 } k_x L = 2\pi n_x, k_y L = 2\pi n_y, k_z L = 2\pi n_z$$

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{L} (n_x, n_y, n_z), \quad (n_x, n_y, n_z = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\hat{Z} = \prod_{\vec{k}} \left[\frac{1}{1 - e^{-\beta(E_{\vec{k}} + \mu)}} \right] = \prod_{\vec{k}} \left[\frac{1}{1 - e^{-\beta(E_{\vec{k}} + \mu)}} \right]$$

Bose-Einstein condensation 玻色-爱因斯坦凝聚

$$\hat{H} = \sum_i \frac{\vec{p}_i^2}{2m}, p = \frac{\hbar}{\lambda} = \frac{\hbar}{2\pi} \cdot \frac{2\pi}{\lambda} = \hbar k$$

$$t_B \hat{H} = \sum_i \frac{(\hbar k_i)^2}{2m} = E, k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \Delta k = \frac{\sqrt{2m}}{2\hbar} \cdot \frac{\Delta E}{\sqrt{E}}$$

$$\Delta n = \frac{4\pi k^2 \Delta k}{L^3 \hbar^3} = \frac{L^3 4\pi \cdot \frac{2mE}{\hbar^2} \cdot \frac{\sqrt{2m}}{2\hbar} \cdot \frac{\Delta E}{\sqrt{E}}}{28\pi^3 \hbar^3}$$

$$D(E) = \frac{\Delta n}{\Delta E} = \frac{L^3 \sqrt{2m} \cdot m \sqrt{E}}{2\pi^2 \hbar^3} = \frac{V (2m)^{\frac{3}{2}}}{4\pi^2 \hbar^3} \sqrt{E} = C_1 \sqrt{E}$$

$$\text{对于玻色子气体 } A = -k_B T \ln Z = k_B T \sum_E \ln \left(1 - e^{-\beta(E-M)} \right)$$

$$= k_B T \int_0^{+\infty} dE [D(E) \ln (1 - e^{-\beta(E-M)})]$$

$$dA = -SdT - pdV - NdM$$

$$N = -\frac{dA}{dM} = -k_B T \int_0^{+\infty} dE [D(E) \frac{-e^{-\beta(E-M)}}{1 - e^{-\beta(E-M)}}]$$

$$= \int_0^{+\infty} dE \frac{f^E}{1 - e^{-\beta(E-M)}} = \int_0^{+\infty} \frac{C_1 E}{e^{\beta(E-M)} - 1} dE$$

$$f^E = \frac{1}{e^{\beta(E-M)} - 1}$$

$$E=0 \text{ 时}, f(E=0) = \frac{1}{e^{-\beta M}} \quad (\text{平均粒子数} > 0) \Rightarrow e^{-\beta M} = e^{\frac{(k_B T) \cdot M}{k_B T}} - 1 > 0$$

$$\Rightarrow M < 0$$

$$\text{再看 } N = \int_0^{+\infty} dE \frac{C_1 E}{e^{\beta(E-M)} - 1}, \text{ 其中 } e^{\beta(E-M)} = e^{\beta E} \cdot e^{-\beta M} > 1, \frac{1}{e^{\beta(E-M)} - 1} \text{ 为递减}$$

$$\text{令 } x = \beta E, N = \int_0^{+\infty} \frac{C_1 \sqrt{x}}{e^x - 1} dx = \frac{1}{\beta^{\frac{3}{2}}} \int_0^{+\infty} \frac{C_1 \sqrt{x}}{e^x - 1} dx = (k_B T)^{\frac{3}{2}} M$$

有限大小的值


$$T \rightarrow 0 \text{ 时}, N = (k_B T)^{\frac{3}{2}} \cdot M \rightarrow 0 \quad \text{平均粒子数不可能为 0}$$

$$\text{当 } M=0 \text{ 时}, f^E(E=0) = \frac{1}{e^{0}-1} = \frac{1}{0} \text{ 型} \quad n(T) = n \left[1 - \left(\frac{T}{T_C} \right)^{\frac{3}{2}} \right]$$

$$N = N_0 + (k_B T)^{\frac{3}{2}} M = \frac{1}{e^{-\beta M} - 1} + (k_B T)^{\frac{3}{2}} M$$

绝对温度下玻色粒子完全处在 $E=0$ 的最低能级

25




$$U = A + T \ln M N = A - T \frac{\partial A}{\partial T} \cdot M \frac{\partial A}{\partial M} = \int_0^{\infty} \frac{P(E)E}{e^{(E-E_0)/T} + 1} dE$$

$$\Rightarrow PV = \frac{2}{3} U$$

$$\frac{1}{3} T \rightarrow 0 \text{ 时}, U \rightarrow E_F \cdot N, PV = \frac{2}{3} E_F N$$

Interaction System 互作用系统

Van der waal gas 索德华气体



具有二体互作用的有限大体积的气体
将实际分子势能曲线简化

$$U_m = \begin{cases} +\infty & (r < a_0) \\ -|U_0| & (a_0 \leq r < b_0) \\ 0 & (r > b_0) \end{cases}$$

哈密顿量 $H = \sum_{i=1}^N \frac{\vec{p}_i^2}{2m} + \sum_{i,j} U_m(\vec{r}_i - \vec{r}_j)$

正则系综

$$Z = \prod_i \frac{1}{h^3} \int d\vec{r}_i d\vec{p}_i e^{-\beta E_i} = \frac{\int \dots \int d\vec{r}_1 \dots d\vec{r}_N d\vec{p}_1 \dots d\vec{p}_N e^{-\beta \left(\sum_i \frac{\vec{p}_i^2}{2m} + \sum_{i,j} U_m(\vec{r}_i - \vec{r}_j) \right)}}{h^{3N} N!}$$

$$= \frac{1}{h^{3N} N!} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}} Z_C$$

$$Z_C = \int \dots \int d\vec{r}_1 \dots d\vec{r}_N e^{-\beta \sum_{i,j} U_m(\vec{r}_i - \vec{r}_j)}$$

$$= \int \dots \int d\vec{r}_1 \dots d\vec{r}_N \prod_{i < j} f_{ij} e^{-\beta U_m(\vec{r}_i - \vec{r}_j)}$$

$$\prod f_{ij} = e^{-\beta U_m(\vec{r}_i - \vec{r}_j)} - 1$$

$$Z_C = \int \dots \int d\vec{r}_1 \dots d\vec{r}_N \prod_{i < j} f_{ij} (1 + f_{ij})$$

$$\prod_{i < j} (1 + f_{ij}) = (1 + f_{12})(1 + f_{13}) \dots (1 + f_{1N})$$

$$\times (1 + f_{23}) \dots (1 + f_{2N})$$

$$\times (1 + f_{N+1N})^{2N}$$

$$F = -k_B T / nZ = -k_B T \ln \left[\frac{N^2}{Z_{\text{ideal}}} \cdot \left(1 + \frac{N^2}{2V} I_1 \right) \right]$$

$$= -k_B T \ln \left(\frac{N^2}{Z_{\text{ideal}}} \right) + k_B T \ln \left(1 + \frac{N^2}{2V} I_1 \right)$$

$$= -k_B T \ln \left(\frac{N^2}{Z_{\text{ideal}}} \right) - k_B T \frac{N^2}{2V} I_1$$

$$\delta F = -SdT - pdV$$

$$p = -\frac{\partial F}{\partial V} = k_B T \frac{\frac{\partial \ln \frac{N^2}{Z_{\text{ideal}}}}{\partial V}}{Z_{\text{ideal}}} + k_B T \frac{-N^2}{2V^2} I_1$$

$$= k_B T \frac{(N^2 V^{N-1})}{(1) V^N} - \frac{k_B T N^2}{2V^2} I_1 = \frac{N k_B T}{V} - \frac{k_B T N^2}{2V^2} I_1$$

$$= \frac{N k_B T}{V} - \frac{k_B T N^2}{2V^2} (-V_0 + \beta U_0 V_1)$$

$$= \frac{N k_B T}{V} + \frac{k_B T N^2}{2V^2} V_0 - k_B T \beta \frac{U_0 V_1 N^2}{2V^2}$$

$$\text{设 } p + \frac{U_0 V_1 N^2}{2V^2} = \frac{N k_B T}{V} + \frac{k_B T N^2 V_0}{2V^2} \quad N U_0 = V_2 \text{ (气体系体积)}$$

$$= \frac{N k_B T}{V} \left(1 + \frac{N V_0}{2V} \right) = \frac{N k_B T}{V} \left(1 + \frac{V_2}{2V} \right).$$


$$x \rightarrow 0 \text{ 时}, 1+x = \frac{1}{1-x}, p + \frac{U_0 V_1 N^2}{2V^2} = \frac{N k_B T}{V} \left(1 - \frac{1}{1 - \frac{V_2}{2V}} \right)$$

$$R_p p + \frac{N^2}{V^2} \frac{U_0 V_2}{2} = \frac{N k_B T}{V - \frac{V_2}{2}} R_p \left(p + \frac{N^2}{V^2} \frac{V_2}{2} U_0 \lambda V - \frac{V_2}{2} \right) = N k_B T$$

$$\Rightarrow (p + p') \left(V - \frac{V_2}{2} \right) = N k_B T$$

$$(p + \frac{m^2 a}{M^2 V^2})(V - \frac{m}{M} b) - \frac{m}{M} RT \text{ (麦德万斯气态方程)}$$

Ising Model 伊辛模型



(1) 只有两种自旋状态 \uparrow, \downarrow $S_i \in \{\uparrow, \downarrow\}$

(2) 每个格点只与最近的4个格点有相互作用

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j - B \cdot \mu_B \sum_i \vec{S}_i$$

μ_B 玻尔磁子

$J > 0$ 针对磁性 $J < 0$ 反对磁性