

矩阵论 (Matrix Theory)

数理与统计学院
SUES

矩阵论(MATRIX THEORY)

◆ 矩阵的广泛应用

	X_1	X_2	\cdots	X_k	\cdots	X_p
S_1	x_{11}	x_{12}	\cdots	x_{1k}	\cdots	x_{1p}
S_2	x_{21}	x_{22}	\cdots	x_{2k}	\cdots	x_{2p}
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots
S_n	x_{n1}	x_{n2}	\cdots	x_{nk}	\cdots	x_{np}

由上表, 记

$$\mathbf{X}_{(i)} = (x_{i1}, x_{i2}, \cdots, x_{ip})', \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

和

$$\mathbf{X}_j = (x_{1j}, x_{2j}, \cdots, x_{nj})', \quad j = 1, 2, \cdots, p$$

分别表示第*i*个样品的*p*个变量的观测值和不同样品的第*j*个变量 X_j 的*n*次观测值. 在具体观测之前, 它们分别为*p*维和*n*维随机向量.

数据表可以用矩阵形式表示, 记为 \mathbf{X} , 即

$$\mathbf{X} = (x_{ij})_{n \times p} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{X}'_{(1)} \\ \mathbf{X}'_{(2)} \\ \vdots \\ \mathbf{X}'_{(n)} \end{pmatrix} = (\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \cdots, \mathbf{X}_p).$$

称 \mathbf{X} 为样本数据阵(或样本资料阵). 在具体观测之前, 它是一个随机矩阵.

矩阵论(MATRIX THEORY)

◆ 马科维茨的均值-方差模型

哈里.马科维茨(Harry M. Markowitz)于1952年在《财务学杂志》上发表论文《Portfolio Selection》，该论文最早采用风险资产的期望收益率(均值)和用方差(或标准差)代表的风险来研究资产组合和选择问题，堪称现代金融理论史上的里程碑，标志着现代组合投资理论的开端. 1989年美国运筹学会、管理科学协会联合授予马科维茨、冯·诺伊曼**运筹学理论奖**，以表彰他们在证券组合选择理论、稀疏矩阵技术、SIMSCRIPT程序语言等方面所作的理论突破和技术创新工作. 由于其出色的、开创性的工作，马科维茨与威廉夏普及默顿米勒分享了1990年**诺贝尔经济学奖**.

矩阵论(MATRIX THEORY)

◆ 马科维茨的均值-方差模型

$$\begin{aligned} \min \quad & x^T \Sigma x \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 1^T x = 1, \\ r^T x \geq r_{\min}, \\ x \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

◆ 主成分分析

主成分分析(Principal Component Analysis, PCA)是将多个变量通过线性变换以选出较少个数重要变量的一种多元统计分析方法，在人口统计学、数量地理学、分子动力学模拟、数学建模、数理分析等学科领域有广泛应用。

PCA首先是由**K. 皮尔森(1901)**对非随机变量引入的，尔后**H. 霍特林**将此方法推广到随机向量的情形。

基本思想：研究如何通过少数几个主成分来揭示多个变量间的内部结构，即从原始变量中导出少数几个主成分，使它们尽可能多地保留原始变量的信息，且彼此间互不相关.数学上的处理就是将原来 p 个指标作线性组合，作为新的综合指标。

矩阵论(MATRIX THEORY)

◆ 主成分分析

PCA的优化模型(续)

第一主成分的优化模型:

$$\alpha_1 = \underset{\alpha}{\operatorname{argmax}} \quad \alpha^T \hat{\Sigma} \alpha, \quad \text{s.t. } \|\alpha\|_2 = 1,$$

其中 $\hat{\Sigma} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X}) / (N - 1)$ 为样本协方差矩阵.

其余主成分的优化模型:

$$\begin{aligned} \alpha_{k+1} &= \underset{\alpha}{\operatorname{argmax}} \quad \alpha^T \hat{\Sigma} \alpha, \\ \text{s.t. } \quad &\|\alpha\|_2 = 1, \alpha^T \alpha_l = 0, \forall 1 \leq l \leq k. \end{aligned}$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

本课程的主要内容

- ◆ 线性空间与线性变换
- ◆ 内积空间
- ◆ 范数理论
- ◆ Jordan标准型
- ◆ 矩阵分析
- ◆ 矩阵分解
- ◆ 矩阵广义逆
- ◆ 特殊矩阵
- ◆ 矩阵的特殊积等

矩阵论(MATRIX THEORY)

第一章

线性空间与线性变换

矩阵论(MATRIX THEORY)

◆ 向量空间

对于平面 R^2 中的任意向量，我们已定义过加法及数乘两种运算，而且这两种运算是封闭的，即运算后的结果仍在 R^2 中。

而且这两种运算满足下面8条运算律：

对 $\forall \alpha, \beta, \gamma \in R^2, \forall k, l \in R$, 成立

(1) 加法交换律: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$,

(2) 加法结合律: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$,

矩阵论(MATRIX THEORY)

(3) 具有**加法单位元（零向量）** $\mathbf{0} \in R^2$ ，使得

$$\alpha + \mathbf{0} = \alpha$$

(4) 具有**加法逆元（负向量）** $-\alpha \in R^2$ ，使得

$$\alpha + (-\alpha) = \mathbf{0}$$

(5) **数乘的结合律**: $k(l\alpha) = (kl)\alpha$

(6) **数乘的单位元**: $1 \cdot \alpha = \alpha$

(7) **分配律1**: $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$

(8) **分配律2**: $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$

矩阵论(MATRIX THEORY)

由线性代数的知识，二维向量空间 R^2 显然可推广到 n 维向量空间 R^n 。并且数乘所依赖的实数域 R 也可推广到复数域 C 。相应的向量空间分别称为实向量空间和复向量空间。

我们知道，向量是特殊的矩阵。所有 $m \times n$ 阶的实矩阵的集合 $R^{m \times n}$ 对矩阵的加法和数乘封闭，并且也满足上述8条运算律。因此也是“实向量空间”。

不过这里的“向量”是实矩阵！

§ 1.1 线性空间的基本概念

线性空间是线性代数最基本的概念之一，是矩阵论中极其重要的概念之一。它是**向量空间**在**元素**和**线性运算**上的推广和抽象。

线性空间中的**元素**可以是**向量、矩阵、多项式、函数**等，**线性运算**可以是我們熟悉的一般运算，也可以是各种**特殊的运算**。

矩阵论(MATRIX THEORY)

1.1.2 线性空间的定义与性质

一、线性空间的概念

定义1.1.4 如果非空集合 V 对于加法及数乘两种运算封闭, 并且对于加法和数乘满足下面8条运算律, 那么就称集合 V 为数域 P 上的线性空间或向量空间:

对 $\forall \alpha, \beta, \gamma \in V, \forall k, l \in P = R$ 或 $P = C$, 成立

(1) 加法交换律: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$,

(2) 加法结合律: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$,

矩阵论(MATRIX THEORY)

(3) 具有**加法单位元（零向量）** $\mathbf{0} \in V$ ，使得

$$\alpha + \mathbf{0} = \alpha$$

(4) 具有**加法逆元（负向量）** $-\alpha \in V$ ，使得

$$\alpha + (-\alpha) = \mathbf{0}$$

(5) **数乘的结合律**: $k(l\alpha) = (kl)\alpha$

(6) **数乘的单位元**: $1 \cdot \alpha = \alpha$

(7) **分配律1**: $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$

(8) **分配律2**: $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$

矩阵论(MATRIX THEORY)

注意： 这里我们不再关心元素的**特定属性**，而且我们也不用关心这些**线性运算**（**加法和数乘**）的**具体形式**。

例如： 在**正实数集** $R^+ = \{a \mid a > 0, a \in R\}$ 中定义**加法** “ \oplus ” 和**数乘** “ \otimes ” 运算如下：

$$a \oplus b = ab, \quad \lambda \otimes a = a^\lambda, \quad \forall a, b \in R^+, \lambda \in R$$

则 R^+ 是数域 R 上的**线性空间**。

矩阵论(MATRIX THEORY)

事实上, 有

$$\forall a, b \in R^+ \Rightarrow a \oplus b = ab \in R^+;$$

$$\forall \lambda \in R, a \in R^+ \Rightarrow \lambda \otimes a = a^\lambda \in R^+.$$

所以对定义加法与数乘运算**封闭**.

下面一一验证八条线性运算规律:

$$(1) a \oplus b = ab = ba = b \oplus a;$$

$$(2)(a \oplus b) \oplus c = (ab) \oplus c = (ab)c = a(bc) = a \oplus (b \oplus c);$$

(3) R^+ 中存在零元素 1, 对于 $\forall a \in R^+$, 有

$$a \oplus 1 = a \cdot 1 = a;$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

(4) $\forall a \in R^+$, 有负元素 $a^{-1} \in R^+$, 使

$$a \oplus a^{-1} = a \cdot a^{-1} = 1;$$

$$(5) 1 \otimes a = a^1 = a;$$

$$(6) \lambda \otimes (\mu \otimes a) = \lambda \otimes a^\mu = (a^\mu)^\lambda = a^{\lambda\mu} = (\lambda\mu) \otimes a;$$

$$(7) (\lambda + \mu) \otimes a = a^{\lambda+\mu} = a^\lambda a^\mu = a^\lambda \oplus a^\mu \\ = (\lambda \otimes a) \oplus (\mu \otimes a);$$

$$(8) \lambda \otimes (a \oplus b) = \lambda \otimes (ab) = (ab)^\lambda = a^\lambda b^\lambda \\ = a^\lambda \oplus b^\lambda = (\lambda \otimes a) \oplus (\lambda \otimes b).$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

例1 数域 P 上的 n 维向量全体，按 n 维向量加法与 n 维向量的数乘构成数域 P 上的线性空间 P^n .

例2 数域 P 上 $m \times n$ 阶矩阵全体，按矩阵的加法和数乘构成 P 上的线性空间 $P^{m \times n}$.

例3 数域 P 上一元多项式全体（包括0）按照多项式的加法以及数与多项式的乘法构成 P 上的线性空间 $P[x]$.

矩阵论(MATRIX THEORY)

例4 数域 P 上次数不超过 n 的一元多项式 (包括 0) 按照多项式的加法以及数与多项式的乘法也构成 P 上的线性空间 $P[x]_n$.

问： 数域 P 上次数等于 n 的一元多项式 (包括 0) 按照多项式的加法以及数与多项式的乘法也构成 P 上的线性空间吗？

例5 区间 $[a, b]$ 上全体连续实值函数全体按通常函数的加法和数与函数的乘法构成线性空间 $C[a, b]$.

矩阵论(MATRIX THEORY)

例6 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的所有解的集合构成数域 R 上的线性空间 $N(A)$, 称为 $Ax = 0$ 的**解空间**, 或矩阵 A 的**核空间或零空间**, 即

$$N(A) \equiv \{x \in R^n \mid Ax = 0, \quad A \in R^{m \times n}\}$$

$$Ker(A)$$

问: $S \equiv \{x \in R^n \mid Ax = b, \quad b \neq 0, \quad A \in R^{m \times n}\}?$

矩阵论(MATRIX THEORY)

例7 所有矩阵向量积 Ax 的集合构成数域 R 上的线性空间 $R(A)$ ，称为矩阵 A 的列空间或值域，也称为矩阵 A 的像，即

$$R(A) \equiv \{y \in R^m \mid y = Ax, \quad x \in R^n, A \in R^{m \times n}\}$$

$\text{Im}(A)$

例8 集合 $V = \{x \mid x = [x_1, x_2, 1]^T, x_1, x_2 \in R\}$ 不是线性空间.

因为加法不封闭!

二、线性空间的基本性质

如果 V 是数域 P 上的**线性空间**，则

- (1) 线性空间 V 中的**零向量** $\mathbf{0}$ 是唯一的.
- (2) 线性空间 V 中的每个向量的**负向量**是唯一的.
- (3) $\mathbf{0} \cdot \alpha = \mathbf{0}, k \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}.$
- (4) 当 $k\alpha = \mathbf{0}$ 时，有 $k = \mathbf{0}$ 或 $\alpha = \mathbf{0}.$
- (5) $(x - y)\alpha = x\alpha - y\alpha; x(\alpha - \beta) = x\alpha - x\beta.$

矩阵论(MATRIX THEORY)

1.1.3 基、坐标、维数

一、基、坐标、维数的概念

定义1.1.6 给定线性空间 V ，如果存在 V 中的一组向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ，满足：

- (1) $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关；
 - (2) V 中任意向量 α 都能由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示。
- 即存在数 $x_1, \dots, x_n \in P$ ，使

$$\alpha = x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n$$

则向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 就称为 V 的一组**基**，系数 x_1, \dots, x_n 就称为向量 α 在此基下的**坐标**，基中的向量个数 n 称为线性空间 V 的**维数**，记为 $\dim V = n$ 。

矩阵论(MATRIX THEORY)

例1 线性空间 $P[x]_n$ 是数域 P 上的 $n+1$ 维空间，其基可取为 $1, x, x^2, \dots, x^n$.

例2 线性空间 P^n 是数域 P 上的 n 维空间，其基可取为 e_1, e_2, \dots, e_n .

例3 线性空间 $P^{m \times n}$ 是数域 P 上的 $m \times n$ 维空间，其基可取为 E_{ij} .

矩阵论(MATRIX THEORY)

例4 向量空间 C 是实数域 R 上的二维空间，其基可取为 $\{1, i\}$ ，即

$$C = \text{span}\{1, i\} = \{a \cdot 1 + b \cdot i \mid a, b \in R\}.$$

同时向量空间 C 也是复数域 C 上的一维空间，其基可取为 $\{1\}$ ，即

$$C = \text{span}\{1\} = \{k \cdot 1 \mid k \in C\}.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

说明:

(1) 线性空间的基**不一定存在**. 例如:

$$V = \{0\}, \dim\{0\} = 0$$

$$V = P[x], \dim P[x] = \infty$$

(2) **不存在有限个基向量的线性空间称为无限维线性空间**. 本书只讨论有限维线性空间.

(3) **n 维线性空间任意 n 个线性无关的向量均构成一组基.**

矩阵论(MATRIX THEORY)

以下定理告诉我们，如何找到有限维线性空间的基.

定理（基的扩张定理） 数域 P 上的 n 维线性空间 V 中的任意一个线性无关向量组

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \quad (1 \leq r \leq n)$$

都可以扩充成 V 的一组基.

矩阵论(MATRIX THEORY)

证明: 令 $W \equiv \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$,

则必有 $\alpha_{r+1} \in V$ 且 $\alpha_{r+1} \notin W$, 使得

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}$ 线性无关.

否则对任意 $\beta \in V - W$, 都有 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta$ 线性相关. 这样 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 即 $\beta \in W$. 与 β 的取法矛盾.

重复上述过程, 直至得到 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$.

矩阵论(MATRIX THEORY)

定理1.1.1 数域 P 上的**线性空间** V 中的任意向量在给
定基下的坐标是**唯一**的.

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基, $\forall \alpha \in V$, 存在唯一的一
组数 $x_1, \dots, x_n \in P$, 使

$$\alpha = x_1 \alpha_1 + \dots + x_n \alpha_n$$

即 V 中的向量 α 与有序数组 (x_1, \dots, x_n) 一一对应.

矩阵论(MATRIX THEORY)

这种一一对应保持了线性运算的对应关系，可以说线性空间 V 与 P^n 具有相同的结构，称为同构. 因为这种同构关系，维数是有限维线性空间的唯一的本质特征. 在同构的意义下，向量空间 P^n 并不只是线性空间 V 的一个特殊例子，而是所有的 n 维线性空间的代表. 只需主要研究元素为向量的线性空间 P^n .

矩阵论(MATRIX THEORY)

由基的定义，在 n 维线性空间 V 中，任意 n 个线性无关的向量都可以作为 V 的一组基。
对于不同的基，同一个向量的坐标是不同的。

那么，随着基的改变，同一个向量的坐标如何改变呢？

矩阵论(MATRIX THEORY)

二、基变换和坐标变换

定义 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 β_1, \dots, β_n 是 n 维线性空间 V 的两个基, 且存在可逆矩阵 P , 使得

$$[\beta_1, \dots, \beta_n] = [\alpha_1, \dots, \alpha_n]P.$$

则称上式为**基变换公式**, 矩阵 P 为基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 到基 β_1, \dots, β_n 的**过渡矩阵**.

对于线性空间 V , 有

$$P = [\alpha_1, \dots, \alpha_n]^{-1}[\beta_1, \dots, \beta_n].$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

定理1.1.3 设 n 维线性空间 V 中元素 α 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 与基 β_1, \dots, β_n 下的坐标分别为

$$x = [x_1, \dots, x_n]^T, \quad y = [y_1, \dots, y_n]^T.$$

P 为基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 到基 β_1, \dots, β_n 的过渡矩阵, 则成立**坐标变换公式**:

$$x = Py \quad \text{即} \quad y = P^{-1}x.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

证明： 由于 $\alpha = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n$

$$= (\alpha_1, \cdots, \alpha_n) \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n) x.$$

$$\alpha = [\beta_1, \cdots, \beta_n] y = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n) P y.$$

因为坐标唯一，所以 $x = P y$.

由于 P 可逆，所以也有 $y = P^{-1} x$.

矩阵论(MATRIX THEORY)

例5

已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性空间 V^3 的一组基, 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 满足

$$\beta_1 + \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \beta_1 + \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_2 + \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_3.$$

(1) 证明: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也是一组基.

(2) 求由基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵.

(3) 求向量 $\alpha = \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标.

矩阵论(MATRIX THEORY)

解：（1）由已知条件，有

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

由于上式两边矩阵均可逆，所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关，
即 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也是一组基.

矩阵论(MATRIX THEORY)

(2)

$$\begin{aligned}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) &= (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

所以, 由基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

(3)

$$\begin{aligned}\alpha &= \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

所以, 向量 $\alpha = \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为 $(2, -5, 1)$.

矩阵论(MATRIX THEORY)

整体有时太庞大，所以我们经常希望能够“通过部分来获知整体”，从而达到“解剖麻雀”的效果。对线性空间的研究亦是如此。我们希望通过对线性子空间的研究，能够更加深刻地揭示整个线性空间的结构。

矩阵论(MATRIX THEORY)

主要内容

- 子空间的概念
- 子空间的判定
- 子空间的构造
- 子空间的运算
- 维数定理

1.1.4 子空间的定义

定义1.1.8 设 U 是线性空间 V 的非空子集. 如果 U 在 V 中规定的加法和数乘运算下构成线性空间, 则称 U 是 V 的 (线性) 子空间.

例1 $\{0\}$ 和 V 为 V 的平凡子空间.

例2 $P[x]_n$ 为 $P[x]$ 的子空间.

矩阵论(MATRIX THEORY)

判定非空集合是否为线性空间，要验算加法和数乘运算的封闭性，以及8条运算律. 至于判定线性空间的子集是否为线性空间，可用下面定理判定.

定理1.1.4 (子空间判别法) 数域 P 上的线性空间 V 的非空子集 U 是 V 的子空间的充要条件是 U 对 V 中的两种运算都封闭，即

- (i) 对任意的 $\alpha, \beta \in U$ ，有 $\alpha + \beta \in U$.
- (ii) 对任意的 $x \in P$ ， $\alpha \in U$ ，有 $x\alpha \in U$.

矩阵论(MATRIX THEORY)

例3 设 $A \in M^{m \times n}(R)$, $Ax = 0$ 的解空间 $N(A)$ (**ker A**) 是 R^n 的线性子空间. A 的值域 $R(A)$ (**Im A**) 是 R^m 的线性子空间.

例4 R^3 中 **过原点** 的直线是 R^3 的一个子空间.

例5 集合 $T_1 = \{x \mid x = (\mathbf{x_1, x_2, 0})^T, x_1, x_2 \in R\}$ 是向量空间. 它是 R^3 在 Ox_1x_2 平面上的 **投影子空间**.

矩阵论(MATRIX THEORY)

例6 已知 V 是数域 P 上的线性空间, $\alpha, \beta \in V$, 则集合

$$W = \{x = \lambda\alpha + \mu\beta \mid \lambda, \mu \in P\}$$

是 V 的一个子空间. 称为**由向量** α, β **所生成的子空间**, 记为 $\text{span}(\alpha, \beta)$ 或 $L(\alpha, \beta)$.

定理1.1.5 由线性空间 V 中的**向量组** $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ **所生成的线性空间**

$$W = \{x = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \dots + \lambda_s\alpha_s \mid \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s \in R\}$$

记作 $\text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 或 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$.

矩阵论(MATRIX THEORY)

1.1.5 子空间的交与和

定理1.1.6 设 V_1, V_2 是数域 P 上线性空间 V 的两个子空间, 则它们的交 $V_1 \cap V_2$ 也是 V 的子空间.

定理1.1.7 设 V_1, V_2 是数域 P 上线性空间 V 的两个子空间, 则集合 (称为 V_1 与 V_2 的和)

$$V_1 + V_2 \equiv \{ \alpha_1 + \alpha_2 \mid \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2 \}$$


也是 V 的子空间.

为什么要研究子空间的和?


为什么不研究子空间的并?

矩阵论(MATRIX THEORY)

例：二维平面 V_2 中， $W=x$ 轴， $V=y$ 轴均为 V 的子空间。
如下图所示，向量 $\alpha_1 \in W$ ， $\alpha_2 \in V$ ，但 $\alpha_1 + \alpha_2$ 却不在 $W \cup V$ 中。



矩阵论(MATRIX THEORY)



矩阵论(MATRIX THEORY)

可以验证, 子空间的交与和具有下列运算律:

(i) 交换律 $V_1 \cap V_2 = V_2 \cap V_1$

$$V_1 + V_2 = V_2 + V_1$$

(ii) 结合律 $(V_1 \cap V_2) \cap V_3 = V_1 \cap (V_2 \cap V_3)$

$$(V_1 + V_2) + V_3 = V_1 + (V_2 + V_3)$$

根据归纳法可知, $\bigcap_{i=1}^m V_i$ 和 $\sum_{i=1}^n V_i$ 都是 V 的子空间.

矩阵论(MATRIX THEORY)

例1 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的子空间, 且

$$V_1 = \text{span}(\alpha_1, \cdots, \alpha_s),$$

$$V_2 = \text{span}(\beta_1, \cdots, \beta_t),$$

则

$$V_1 + V_2 = \text{span}(\alpha_1, \cdots, \alpha_s, \beta_1, \cdots, \beta_t).$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

定理1.1.8 (维数公式) 设 V_1, V_2 是数域 P 上线性空间 V 的两个有限维子空间, 则它们的**交**与**和**都是有限维的, 并且

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2).$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

证明:

令 $\dim(V_1) = s, \dim(V_2) = t, \dim(V_1 \cap V_2) = r$.

取 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为 $V_1 \cap V_2$ 的基, 并分别扩充成 V_1, V_2 的基, 即

$$V_1 = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \dots, \beta_s),$$

$$V_2 = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \gamma_{r+1}, \dots, \gamma_t),$$

所以

$$V_1 + V_2 = \text{span}(\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \dots, \beta_s, \gamma_{r+1}, \dots, \gamma_t).$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

设 $k_1\alpha_1 + \cdots + k_r\alpha_r + p_{r+1}\beta_{r+1} + \cdots + p_s\beta_s + q_{r+1}\gamma_{r+1} + \cdots + q_t\gamma_t = 0$

则有

$$\alpha = k_1\alpha_1 + \cdots + k_r\alpha_r + p_{r+1}\beta_{r+1} + \cdots + p_s\beta_s \in V_1$$

又

$$\alpha = -(q_{r+1}\gamma_{r+1} + \cdots + q_t\gamma_t) \in V_2$$

所以 $\alpha \in V_1 \cap V_2$.

从而可令 $\alpha = l_1\alpha_1 + \cdots + l_r\alpha_r$,

则 $l_1\alpha_1 + \cdots + l_r\alpha_r = -(q_{r+1}\gamma_{r+1} + \cdots + q_t\gamma_t)$.

矩阵论(MATRIX THEORY)

由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \gamma_{r+1}, \dots, \gamma_t$ 线性无关, 所以

$$l_1 = \dots = l_r = q_{r+1} = \dots = q_t = 0.$$

因此 $\alpha = 0$.

$$\text{即 } \alpha = k_1 \alpha_1 + \dots + k_r \alpha_r + p_{r+1} \beta_{r+1} + \dots + p_s \beta_s = 0.$$

再由 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \dots, \beta_s$ 线性无关, 所以

$$k_1 = \dots = k_r = p_{r+1} = \dots = p_s = 0.$$

从而 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \dots, \beta_s, \gamma_{r+1}, \dots, \gamma_t$ 线性无关,
所以是 $V_1 + V_2$ 的一组基. 即证维数公式成立.

矩阵论(MATRIX THEORY)

由维数公式可知，子空间和的维数要比维数的和小.
例如三维空间 V_3 中，两张通过原点的不同平面之和是整个三维空间 V_3 ，而其维数之和是4，由此说明这两张平面的交是一维的直线.

矩阵论(MATRIX THEORY)

例2 设 $\alpha_1 = (2, 1, 3, 1)^T, \alpha_2 = (-1, 1, -3, 1)^T,$

$$\beta_1 = (4, 5, 3, -1)^T, \beta_2 = (1, 5, -3, 1)^T,$$

$$V_1 = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2), V_2 = \text{span}(\beta_1, \beta_2).$$

求 $V_1 \cap V_2$ 、 $V_1 + V_2$ 的基与维数.

解：由题意知

$$\dim(V_1) = 2, \dim(V_2) = 2$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

由例1 知 $V_1 + V_2 = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2)$.

由

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 5 & 5 \\ 3 & -3 & 3 & -3 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{ERT} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{行最简形}$$

知 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 线性无关, 从而是 $V_1 + V_2$ 的一组基
 $\dim(V_1 + V_2) = 3$.

矩阵论(MATRIX THEORY)

由维数定理知, $\dim(V_1 \cap V_2) = 1$.

设 $\alpha \in V_1 \cap V_2$, 则 $\alpha \in V_1$, $\alpha \in V_2$

所以可令 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = \alpha = l_1\beta_1 + l_2\beta_2$

即

$$\begin{cases} 2k_1 - k_2 - 4l_1 - l_2 = 0 \\ k_1 + k_2 - 5l_1 - 5l_2 = 0 \\ 3k_1 - 3k_2 - 3l_1 + 3l_2 = 0 \\ k_1 + k_2 + l_1 - l_2 = 0 \end{cases}$$

解关于 k_1, k_2, l_1, l_2 的齐次方程.

矩阵论(MATRIX THEORY)

由

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -4 & -1 \\ 1 & 1 & -5 & -5 \\ 3 & -3 & -3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{ERT} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得 $k_1 = 0$, $k_2 = \frac{5}{3}l_2$, $l_1 = -\frac{2}{3}l_2$, 行最简形

因此 $\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = \frac{5}{3}l_2 \cdot \alpha_2$.

所以 $V_1 \cap V_2$ 的基为 α_2 .

$$\beta_2 = -\frac{5}{3}\alpha_2 + \frac{2}{3}\beta_1$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

练习：已知 $\alpha_1 = (-1, 3, 2, 1)^T, \alpha_2 = (1, 0, 0, 2)^T,$

$$\beta_1 = (0, 1, 1, 3)^T, \beta_2 = (-3, 2, 1, -6)^T$$

且 $V_1 = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}, V_2 = \text{span}\{\beta_1, \beta_2\}$

求 $V_1 + V_2$ 与 $V_1 \cap V_2$ 的基和维数.

矩阵论(MATRIX THEORY)

解：因为

$$V_1 + V_2 = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\} + \text{span}\{\beta_1, \beta_2\} = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2\},$$

而

$$(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & -3 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 的一个极大线性无关组，则和空间的维数是3，基为 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$

且 $\beta_2 = \alpha_1 - 2\alpha_2 - \beta_1$.

矩阵论(MATRIX THEORY)

由行最简形知 $\dim(V_1) = 2, \dim(V_2) = 2,$

又

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2).$$

故 $\dim(V_1 \cap V_2) = 1$. 由 $\beta_2 = \alpha_1 - 2\alpha_2 - \beta_1$ 得

$$\xi = \alpha_1 - 2\alpha_2 = \beta_1 + \beta_2 = (-3, 3, 2, -3)^T \in V_1 \cap V_2.$$

所以 $(-3, 3, 2, -3)^T$ 为 $V_1 \cap V_2$ 的一组基.

矩阵论(MATRIX THEORY)

由子空间 V_1+V_2 的定义可知, 若 $x_1 \in V_1, y \in V_2$, 则 V_1+V_2 中任一向量 z 可以表示为 $z=x+y$. 但是, 一般来说, 这种表示并不是唯一的. 例如: 在 R^3 中

若 $V_1 = \text{span}\{(1,0,0),(0,1,0)\}$, $V_2 = \text{span}\{(1,1,0)\}$

则有 $z = (1,2,0) \in V_1 + V_2$, 但

$$(1,2,0)=(1,2,0)+(0,0,0) \in V_1 + V_2$$

$$(1,2,0)=(0,1,0)+(1,1,0) \in V_1 + V_2$$

这说明和空间的向量 z 的表示法不唯一!

矩阵论(MATRIX THEORY)

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2).$$

由维数公式：和空间的维数不大于子空间维数之和.

定义1.1.10 设 V_1, V_2 是数域 P 上的线性空间 V 的两个子空间，如果

$$V_1 \cap V_2 = \{0\},$$

则称 $V_1 + V_2$ 为 V_1 与 V_2 的**直和**，记作 $V_1 \oplus V_2$.

显然直和的概念可以推广到多个子空间的情形.

矩阵论(MATRIX THEORY)

定理1.1.9 设 V_1, V_2 是数域 P 上的线性空间 V 的两个子空间, 则下列命题是等价的:

- (1) $V_1 + V_2$ 是直和;
- (2) $\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2)$;
- (3) 和 $V_1 + V_2$ 中零向量的表示法唯一, 即若
 $\alpha_1 + \alpha_2 = 0 \quad (\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2),$
则 $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$.
- (4) 和 $V_1 + V_2$ 中每个向量的表示法是唯一的.

矩阵论(MATRIX THEORY)

证明: (1) \Rightarrow (2). 根据维数公式显然成立.

(2) \Rightarrow (1). 根据维数公式 $\dim(V_1 \cap V_2) = 0$.

所以 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$.

(1) \Rightarrow (4). 设存在向量 $\alpha \in V_1 + V_2$, 有

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 = \alpha'_1 + \alpha'_2, \quad \alpha_1, \alpha'_1 \in V_1, \alpha_2, \alpha'_2 \in V_2$$

由于 $\alpha_1 - \alpha'_1 \in V_1, \alpha'_2 - \alpha_2 \in V_2$, 且 $\alpha_1 - \alpha'_1 = \alpha'_2 - \alpha_2$,
所以 $\alpha_1 - \alpha'_1 = \alpha'_2 - \alpha_2 \in V_1 \cap V_2 = \{0\}$.

从而 $\alpha_1 - \alpha'_1 = \alpha'_2 - \alpha_2 = 0$.

矩阵论(MATRIX THEORY)

(4) \Rightarrow (3). 显然成立.

(3) \Rightarrow (1). 对任意向量 $\alpha \in V_1 \cap V_2$, 有

$$\mathbf{0} = \alpha + (-\alpha), \alpha \in V_1, -\alpha \in V_2.$$

根据 (3), 零向量的表示是唯一的, 因此

$$\alpha = -\alpha = \mathbf{0}.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

例3 设 S, K 分别是 n 阶实对称矩阵和反对称矩阵的全体. 显然容易证明 S, K 均为线性空间 $R^{n \times n}$ 的子空间. 试证明 $R^{n \times n} = S \oplus K$.

证明: 因为任意实方阵可以分解为一个实对称矩阵和一个实反对称矩阵的和, 即

$$A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T), \quad A \in R^{n \times n}$$

又 $\dim(R^{n \times n}) = n^2 = n(n+1)/2 + n(n-1)/2$
 $= \dim(S) + \dim(K)$, 根据定理1.1.9可知结论成立.

矩阵论(MATRIX THEORY)

定理 (**直和分解**) 设 V_1 是数域 P 上的线性空间 V 的一个子空间, 则一定存在 V 的另一个子空间 V_2 , 使得线性空间 V 具有**直和分解**

$$V = V_1 \oplus V_2$$

则称 V_1 和 V_2 是一对**互补的子空间**, 或者 V_1 是 V_2 的**补子空间**.

显然直和分解可以推广到多个子空间的情形.

矩阵论(MATRIX THEORY)

例如： R^3 的直和分解与非直和分解.

设 $V_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_3 = 0, x_1, x_2 \in R\},$

$V_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 \in R\},$

$V_3 = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 = 0, x_2, x_3 \in R\}.$

则 $R^3 = V_1 + V_2$ 是直和分解,

$R^3 = V_1 + V_3$ 不是直和分解.

矩阵论(MATRIX THEORY)

注意：子空间的补子空间未必是唯一的，也就是说线性空间的直和分解未必是唯一的.

例如：若 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 0)^T$,

$$\beta_1 = (0, 0, 1)^T, \quad \beta_2 = (0, 1, 1)^T.$$

显然, $U = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2)$ 是 R^3 的一个子空间,
且 $\text{span}(\beta_1)$ 和 $\text{span}(\beta_2)$ 都是 U 的补子空间.

1.2 线性变换

线性变换是线性空间的核心内容，反映的是线性空间中元素间的一种基本联系，体现出一种“动态的”或者“直观的”视角.

借助**基**的概念，可在线性变换与矩阵之间建立一一对应关系，因此通俗地讲“**变换即矩阵**”. 这同时也意味着**线性变换的运算**可以转化为**矩阵的运算**.

1.2.1 线性变换的定义

例1（**旋转变换**或**Givens变换**）将线性空间 R^2 中的所有向量均绕原点**顺时针**旋转角 θ ，则**像** (η_1, η_2) 与**原像** (ξ_1, ξ_2) 之间的关系为

$$\begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

例2 (反射变换或Householder变换) 向量 l_θ 为 R^2 中与 x 轴正向夹角为 θ 且过原点的向量. 将 R^2 中的所有向量均以向量 l_θ 为轴做反射, 则像 (η_1, η_2) 与原像 (ξ_1, ξ_2) 之间的关系为

$$\begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

从几何上看，图形经过**旋转变换**或**反射变换**后只是位置改变了，形状和大小都没有改变，所有的长度、角度都保持不变，直线仍然变成了直线，三角形、长方形、正方形、平行四边形、圆仍然变成了三角形、长方形、正方形、平行四边形、圆，也就是说变换前后的图形是全等的。

从映射的角度看，**旋转变换**或**反射变换**对应的显然是**同构映射**。

矩阵论(MATRIX THEORY)

例3（**伸缩变换**）将 \mathbf{R}^2 中的单位圆沿坐标轴方向分别拉伸 a 倍和 b 倍，所得图形为椭圆，则**像** (η_1, η_2) 与**原像** (ξ_1, ξ_2) 之间的关系为

$$\begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

从几何上看，图形经过**伸缩变换**后位置没有改变，角度也没有改变，但**形状和大小都略有变化，所有的长度也改变了**。虽然直线仍然变成了直线，三角形、长方形、平行四边形仍然变成了三角形、长方形、平行四边形，但圆变成了椭圆、正方形变成了长方形。也就是说**变换前后的图形未必是全等的**。

从映射的角度看，**伸缩变换**对应的显然**不再是同构映射**。但是**线性关系经过变换仍然得到保留**。

矩阵论(MATRIX THEORY)

定义1.2.1 设 V 是数域 P 上的线性空间，映射（未必是双射） $T: V \rightarrow V$ 称为 V 上的线性变换或线性算子，如果对 V 中的任意两个向量 $\alpha, \beta \in V$ 和任意数 $k \in P$ ，都有

- (i) (可加性) $T(\alpha + \beta) = T(\alpha) + T(\beta)$;
- (ii) (齐次性) $T(k\alpha) = kT(\alpha)$.

则称 $T(\alpha)$ 为 α 在 T 下的像，而 α 是 $T(\alpha)$ 的原像.

矩阵论(MATRIX THEORY)

例4 由下式

$$T(x) = Ax, \quad x \in R^n, A \in R^{n \times n}$$

确定的映射 $T : R^n \rightarrow R^n$ 是线性变换.

当矩阵 A 是对角矩阵时, 该变换是一种伸缩变换.

特别地, 如果 A 是单位矩阵, 该变换即为恒等变换.

矩阵论(MATRIX THEORY)

例5 (标量变换) 由下式

$$T(x) = \lambda x, \quad x \in V, \lambda \in P$$

确定的线性空间 V 到其自身的映射 $T: V \rightarrow V$ 是线性变换. 这里 λ 称为线性变换 T 的特征值, 非零向量 $x \neq 0$ 称为 T 的对应于特征值 λ 的特征向量.

矩阵论(MATRIX THEORY)

例6 数域 R 上的所有**无限次可导**实函数的集合 V 是一个线性空间，则由下式

$$D(f) = f', \quad f \in V$$

确定的**微商变换** $D: V \rightarrow V$ 是 V 上的一个线性变换.

矩阵论(MATRIX THEORY)

例7 闭区间 $[a, b]$ 上的所有**实连续函数**的集合 $C[a, b]$ 构成 R 上的一个线性空间，则由下式

$$J(f) = \int_a^t f(u) du, \quad f \in C[a, b]$$

确定的积分变换 $J : C[a, b] \rightarrow C[a, b]$ 是 $C[a, b]$ 上的一个线性变换.

例 6和例 7 表明，微积分的两个基本运算（微分和积分），从变换的角度看都是线性变换（或线性算子），由此可知线性变换在理论与应用中有着广泛的应用.

1.2.2 线性变换的性质

定理 如果 $T : V \rightarrow V$ 是线性变换, 则

(1) $T(0) = 0$; 零向量对应零向量

(2) $T(-\alpha) = -T(\alpha)$; 负向量对应负向量

(3) $T\left(\sum_{i=1}^m \lambda_i \alpha_i\right) = \sum_{i=1}^m \lambda_i T(\alpha_i)$. 叠加原理

(4) 原像线性相关 \Rightarrow 像线性相关.

注: 线性变换可能将线性无关的向量组变成线性相关的向量组, 如 零变换.

1.2.3 线性变换的运算

定理 如果 $L(V)$ 表示 V 上的所有线性变换的集合，并且对任意 $T, T_1, T_2 \in L(V)$, $\alpha \in V, k \in P$

$$(1) \quad (T_1 + T_2)(\alpha) \equiv T_1(\alpha) + T_2(\alpha);$$

$$(2) \quad (kT)(\alpha) \equiv kT(\alpha);$$

$$(3) \quad (T_1 T_2)(\alpha) \equiv (T_1(T_2(\alpha)));$$

则可以验证, $T_1 + T_2, kT, T_1 T_2$ 都是线性变换, 因此 $L(V)$ 也是数域 P 上的线性空间.

矩阵论(MATRIX THEORY)

1.2.4 线性变换的值域与核

设 T 是数域 P 上的线性空间 V 上的线性变换. 令

$$\mathbf{Im}(T) \equiv \mathbf{R}(T) \equiv \{ T(\alpha) \mid \forall \alpha \in V \},$$

$$\mathbf{Ker}(T) \equiv \mathbf{N}(T) \equiv \{ \alpha \in V \mid T(\alpha) = 0 \},$$

易知 $\mathbf{Im}(T)$ 和 $\mathbf{Ker}(T)$ 都是 V 的子空间.

称 $\mathbf{Im}(T)$ 是线性变换 T 的值域, 而 $\mathbf{Ker}(T)$ 是线性变换的核. $\mathbf{Im}(T)$ 的维数称为 T 的秩, $\mathbf{Ker}(T)$ 的维数称为 T 的零度.

矩阵论(MATRIX THEORY)

设 T 是数域 P 上的线性空间 V 上的线性变换.

令 $\alpha_1, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基, 则

$$\mathbf{Im}(T) = \text{span}(T(\alpha_1), T(\alpha_2), \dots, T(\alpha_n)).$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

例1 已知 $R^{2 \times 2}$ 的线性变换, $T(X) = MX - XM$, $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$
求: $R(T)$ 与 $N(T)$ 的基与维数.

解: 取 $R^{2 \times 2}$ 的自然基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$, 则

$$\begin{aligned} T(E_{11}) &= \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, & T(E_{12}) &= \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \\ T(E_{21}) &= \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}, & T(E_{22}) &= \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

显然, $T(E_{11}), T(E_{21})$ 是一个最大线性无关组. 所以,
 $\dim(R(T)) = 2$, 且 $T(E_{11}), T(E_{21})$ 是 $R(T)$ 的一组基.

矩阵论(MATRIX THEORY)

设 $X = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix} \in N(T)$, 由

$$T(X) = MX - XM = \begin{bmatrix} 2x_3 & -2x_1 - 2x_2 + 2x_4 \\ 2x_3 & -2x_3 \end{bmatrix} = 0,$$

解得 $X = \left\{ \begin{bmatrix} -c_1 + c_2 & c_1 \\ 0 & c_2 \end{bmatrix} \mid c_1, c_2 \in R \right\}$.

所以, $\dim(N(T)) = 2$, 且 $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
是 $N(T)$ 的一组基.

矩阵论(MATRIX THEORY)

例2 $P[x]_{n-1}$ 为变量 x 的次数不超过 $n-1$ 的实系数多项式构成的空间 (n 维), 并设求导变换为 D , 则

$$D(P[x]_{n-1}) = (P[x]_{n-1})' = P[x]_{n-2}$$

$$\text{故 } \mathbf{Im}(D) = P[x]_{n-2}$$

$$\mathbf{Ker}(D) = P$$

且

$$\dim(\mathbf{Ker}(D)) + \dim(\mathbf{Im}(D)) = n = \dim(P[x]_{n-1}).$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

设 T 是数域 P 上的 n 维线性空间 V 上的线性变换.

注意:

虽然 $\dim \operatorname{Im}(T) + \dim \operatorname{Ker}(T) = n$, **但一般有**

$$\operatorname{Im}(T) + \operatorname{Ker}(T) \neq V.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

1.2.5 线性变换的矩阵表示

定义 n 维线性空间 V 上的线性变换

$$T: V \rightarrow V$$

将 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 映射为 $T(\alpha_1), T(\alpha_2), \dots, T(\alpha_n)$.

由于 $T(\alpha_i)$ 仍然是基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的线性组合, 令

$$T(\alpha_i) = a_{1i}\alpha_1 + a_{2i}\alpha_2 + \dots + a_{ni}\alpha_n \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

因此

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (T(\alpha_1), T(\alpha_2), \dots, T(\alpha_n)).$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\equiv (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \mathbf{A}.$$

这里，矩阵 \mathbf{A} 称为**线性变换 T** 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的**矩阵表示**.

因此线性变换与方阵之间可以建立一一对应关系.

矩阵论(MATRIX THEORY)

定理1.2.6

设 A, B 分别是线性变换 T_1 和 T_2 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵, 那么在此基下有:

- (1) $T_1 + T_2$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 $A + B$;
- (2) kT_1 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 kA ;
- (3) T_1T_2 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 AB ;
- (4) 若 T_1 可逆, 则 T_1^{-1} 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A^{-1} .

注: 定理中的(1)(2)说明了 $L(V)$ 与 $P^{n \times n}$ 同构.

矩阵论(MATRIX THEORY)

定理1.2.4 设线性变换 T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A ，且

向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标为 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$

$T(\alpha)$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标为 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$

则

$$y = A x.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

对 V 中的任意向量 $\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n$

显然其在线性变换 T 下的像为

$$\begin{aligned} T(\alpha) &= T(x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n) \\ &= x_1T(\alpha_1) + x_2T(\alpha_2) + \cdots + x_nT(\alpha_n) \\ &= (T(\alpha_1), T(\alpha_2), \cdots, T(\alpha_n))x \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)Ax \equiv (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)y. \end{aligned}$$

因此原像与像（在给定基下）的坐标变换公式为

$$y = Ax.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

例1 R^3 中的投影变换

$$P : (x, y, z) \rightarrow (x, y, 0),$$

在基 i, j, k 下的矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

例 2 $P[x]_n$ 中的微商变换

$$D(f) = f', \quad f \in P[x]_n$$

在基 $1, x, \dots, x^n$ 下的矩阵为

$$\begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{2} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \mathbf{n} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \end{bmatrix}.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

例3

已知 $P_2[t]$ 上线性变换

$$T(a_0 + a_1t + a_2t^2) = (a_0 - a_1) + (a_1 - a_2)t + (a_2 - a_0)t^2.$$

求 T 在基 $1, t, t^2$ 下的矩阵.

解 因为

$$T(1) = 1 - t^2, \quad T(t) = -1 + t, \quad T(t^2) = -t + t^2,$$

所以 T 在基 $1, t, t^2$ 下的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$

矩阵论(MATRIX THEORY)

例4 在 R^3 中 T 将基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 变为基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$, 其中

$$\alpha_1 = (1, 1, -1)^T, \quad \alpha_2 = (0, 2, -1)^T, \quad \alpha_3 = (1, 0, -1)^T$$

$$\beta_1 = (1, -1, 0)^T, \quad \beta_2 = (0, 1, -1)^T, \quad \beta_3 = (0, 3, -2)^T$$

(1) 求 T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵;

(2) 求向量 $\xi = (1, 2, 3)^T$ 及 $T(\xi)$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标.

矩阵论(MATRIX THEORY)

解： (1) 设 T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为 A ，则

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = T(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)A$$

$$\Rightarrow A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

$$\text{设 } \xi = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$\text{则 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1} \xi$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ -4 \\ -9 \end{pmatrix}.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

设 $T(\xi)$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $(y_1, y_2, y_3)^T$.

$$\begin{aligned} \text{则} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} &= A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ -4 \\ -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 \\ -32 \\ -13 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

当基改变后，线性变换的表示矩阵是否改变呢？

设 T 为 n 维向量空间 V 上的线性变换，对于 V 的基 x_1, x_2, \dots, x_n 和 y_1, y_2, \dots, y_n 的矩阵表示分别是 A 和 B ，并且基 x_1, x_2, \dots, x_n 到基 y_1, y_2, \dots, y_n 的过渡矩阵为 P ，即有

$$(y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)P.$$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = (y_1, y_2, \dots, y_n)P^{-1}.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

$$\begin{aligned}\text{则 } (y_1, y_2, \cdots, y_n)B &= T(y_1, y_2, \cdots, y_n) \\ &= T(x_1, x_2, \cdots, x_n)P \\ &= (Tx_1, Tx_2, \cdots, Tx_n)P \\ &= (x_1, x_2, \cdots, x_n)AP \\ &= (y_1, y_2, \cdots, y_n)P^{-1}AP,\end{aligned}$$

故 $B = P^{-1}AP$, 或

$$A = PBP^{-1}.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

定理1.2.5 设 T 为 n 维向量空间 V 上的线性变换, 对于 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的矩阵表示分别是 A 和 B , 且基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵为 P , 则矩阵 A 与 B 相似, 即存在可逆矩阵 P 使得

$$B = P^{-1}AP.$$

据此定理可知, 同一个线性变换下在不同基下**矩阵表示是相似的**. 反之, 若两矩阵相似, 则它们可看成同一线性变化在不同基下的矩阵.

矩阵论(MATRIX THEORY)

例5 设 T 是 R^3 中的线性变换

$$\alpha_1 = (0, 0, 1)^T, \quad \alpha_2 = (0, 1, 0)^T, \quad \alpha_3 = (1, 0, 0)^T$$

$$\beta_1 = (1, 1, 1)^T, \quad \beta_2 = (1, 1, 0)^T, \quad \beta_3 = (1, 0, 0)^T$$

是 R^3 的两组基, 且

$$T(\beta_1) = (1, 0, 0)^T, T(\beta_2) = (2, 1, 0)^T, T(\beta_3) = (3, 2, 1)^T$$

求 T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵.

矩阵论(MATRIX THEORY)

解: $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$

$\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

$$\text{而 } T(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{pmatrix},$$

故 T 在 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{pmatrix}.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

因此 T 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为

$$A = PBP^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

例6* 设 $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \in R^{2 \times 2}$, 在 $R^{2 \times 2}$ 中定义线性变换为

$$T(X) = XB$$

试求 $R^{2 \times 2}$ 的一组基是 T 在所求基下矩阵为对角阵.

分析: 先求一组基下的矩阵, 然后将此矩阵对角化, 从而得到过渡矩阵, 由过渡矩阵与此组基得到所求基.

矩阵论(MATRIX THEORY)

解:

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$T(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

即

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{又 } |\lambda E - A| = (\lambda - 2)^2(\lambda + 2)^2.$$

当 $\lambda = 2$ 时, 特征向量为

$$\xi_1 = (2, 1, 0, 0)^T, \xi_2 = (0, 0, 2, 1)^T.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

当 $\lambda = -2$ 时, 特征向量为

$$\xi_3 = (2, -1, 0, 0)^T, \xi_4 = (0, 0, 2, -1)^T.$$

故

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

$$\text{从而 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & & & \\ & 2 & & \\ & & -2 & \\ & & & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{令 } (X_{11}, X_{12}, X_{21}, X_{22})$$

$$= (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})P$$

$$= (2E_{11} + E_{12}, 2E_{12} + E_{22}, 2E_{11} - E_{12}, 2E_{12} - E_{22}).$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

$$\Rightarrow X_{11} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, X_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$
$$X_{21} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, X_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

则 T 在 $X_{11}, X_{12}, X_{21}, X_{22}$ 下的矩阵为对角阵

$$\begin{pmatrix} 2 & & & \\ & 2 & & \\ & & -2 & \\ & & & -2 \end{pmatrix}.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

例7* 已知矩阵 A 与 B 相似, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & 0 \\ 0 & -5 & 2 \end{bmatrix}.$$

求可逆阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.

矩阵论(MATRIX THEORY)

解：由于 A 、 B 都与同一个对角阵 Λ 相似，因此使用 Λ 来“**过渡**”。即存在可逆矩阵 P_1 、 P_2 ，使

$$P_1^{-1}AP_1 = \Lambda, \quad P_2^{-1}BP_2 = \Lambda.$$

所以 $(P_1P_2^{-1})^{-1}A(P_1P_2^{-1}) = B$. 即

$$P = P_1P_2^{-1}.$$

下面求可逆矩阵 P_1 、 P_2 .

首先求特征值.

显然 B 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = -7$.

因为 A 、 B 相似，所以这也是 A 的特征值.

矩阵论(MATRIX THEORY)

接着求可逆矩阵 P_1 .

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, 解 $(A - \lambda_1 I)x = 0$,

得基础解系 $\xi_1 = (-2, 1, 0)^T$, $\xi_2 = (2, 0, 1)^T$.

对于 $\lambda_3 = -7$, 解 $(A - \lambda_3 I)x = 0$,

得基础解系 $\xi_3 = (1, 2, -2)^T$.

$$\text{所以 } P_1 = [\xi_1, \xi_2, \xi_3] = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

接着求可逆矩阵 P_2 .

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, 解 $(B - \lambda_1 I)x = 0$,

得基础解系 $\tau_1 = (1, 0, 0)^T$, $\tau_2 = (0, 0, 1)^T$.

对于 $\lambda_3 = -7$, 解 $(B - \lambda_3 I)x = 0$,

得基础解系 $\tau_3 = (0, -9, 5)^T$.

所以
$$P_2 = [\tau_1, \tau_2, \tau_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}.$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

因此

$$\begin{aligned} P = P_1 P_2^{-1} &= \begin{bmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{9} & 1 \\ 0 & -\frac{1}{9} & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & \frac{-2}{9} & 0 \\ 0 & \frac{7}{9} & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

矩阵论(MATRIX THEORY)

1.2.6 特征值与特征向量

定义1.2.4

对 n 阶方阵 A , 如果存在数域 P 中的数 λ 和 n 维向量 α , 使得

$$A(\alpha) = \lambda\alpha,$$

则称 λ 为 A 的特征值, α 为属于特征值 λ 的特征向量. 称

$$(\lambda E - A)\alpha = 0$$

也称为 A 的特征方程.

定理1.2.8

矩阵 $A \in C^{n \times n}$ 的不同特征值对应的特征向量线性无关.

矩阵论(MATRIX THEORY)

定义1.2.5

矩阵 $A \in C^{n \times n}$ 的主对角线上元素的和

$$a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

称为 A 的迹, 记作 $\text{tr}(A)$.

定理1.2.9

矩阵 $A \in C^{n \times n}$ 的特征值分别为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 则

(1) 矩阵 A 的迹等于特征值的和, 即

$$a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n.$$

(2) 矩阵 A 的行列式等于特征值的积, 即

$$|A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n.$$

1.2.7 线性变换的特征值与特征向量

定义1.2.6

设 T 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 如果存在数域 P 中的数 λ 和 V 中的元素 α , 使得

$$T(\alpha) = \lambda\alpha,$$

则称 λ 为 T 的特征值, α 为属于特征值 λ 的特征向量.

矩阵论(MATRIX THEORY)

定理1. 2. 10

设 T 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换, λ 为 T 的一个特征值, 则特征值 λ 对应的全部特征向量加上零向量构成的集合

$$V_{\lambda} = \{\alpha | T(\alpha) = \lambda\alpha, \alpha \in V\},$$

则 V_{λ} 是 V 的一个子空间, 称为特征子空间.

矩阵论(MATRIX THEORY)

现在讨论线性变换 T 的特征值与其在一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 下的矩阵 A 的特征值的关系.

设 $T(\alpha) = \lambda\alpha$, $\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n$, 则

$$\begin{aligned} T(\alpha) &= T(x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n) \\ &= T(x_1\alpha_1) + T(x_2\alpha_2) + \cdots + T(x_n\alpha_n) \\ &= (T(\alpha_1), T(\alpha_2), \cdots, T(\alpha_n))(x_1, x_2, \cdots, x_n)^T \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)A(x_1, x_2, \cdots, x_n)^T, \\ \lambda(\alpha) &= (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)\lambda(x_1, x_2, \cdots, x_n)^T, \end{aligned}$$

所以, 有 $A(x_1, x_2, \cdots, x_n)^T = \lambda(x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$,
即 $Ax = \lambda x$.

矩阵论(MATRIX THEORY)

上式表明： T 的特征值就是矩阵 A 的特征值， T 的特征向量在这组基下的坐标就是 A 对应的特征向量。由上述定理知， T 在不同基下的矩阵式相似的，所以其特征值相同，换言之，线性变换的特征值与所选的基无关。

矩阵论(MATRIX THEORY)

教材:

李路、王国强、吴中成. 矩阵论及其应用. 上海: 东华大学出版社, 2019.

矩阵论(MATRIX THEORY)

参考教材:

- [1] 戴华. 矩阵论. 北京: 科学出版社, 2001.
- [2] 邸继征. 矩阵论. 北京: 科学出版社, 2016
- [3] 方保镕. 矩阵论 (第3版) . 北京: 清华大学出版社, 2021.
- [4] 方保镕. 矩阵论千题习题详解 (第2版) . 北京: 清华大学出版社, 2021.
- [5] 张贤达, 周杰. 矩阵论及其工程应用. 北京: 清华大学出版社, 2015.
- [6] 张贤达. 矩阵分析与应用 (第2版) . 北京: 清华大学出版社, 2013.

矩阵论(MATRIX THEORY)

参考教材:

- [7] F.Z. Zhang. Matrix Theory: Basic Results and Techniques (第2版) . Springer-Verlag New York Inc., 2011.
- [8] R.A. Horn, C.R. Johnson著, 张明尧, 张凡译. 矩阵分析 (第2版) . 北京: 机械工业出版社, 2013.
- [9] R.A. Horn, C.R. Johnson. 矩阵分析 (英文版.第2版) . 北京: 人民邮电出版社, 2015.
- [10] Gene H. Golub, Charles F. Van Loan著, 程晓亮 译. 矩阵计算 (第4版) . 北京: 人民邮电出版社, 2020
- [11] Gene H. Golub, Charles F. Van Loan. 矩阵计算 (英文版.第4版) . 北京: 人民邮电出版社, 2014.
- [12] John Derbyshire著, 张浩 译.代数的历史:人类对未知量的不舍追踪 (修订版) . 北京: 人民邮电出版社, 2021.