## 安徽大学 2016—2017 学年第一学期

# 《高等数学 A (三)》(概率论与数理统计)考试试卷(A 卷) 试题参考答案及评分标准

一、填空题(每小题3分,共15分)

1, 0.7 2,  $1-2e^{-1}$  3, 20 4, -1 5, 0.954

二、单选题(每小题3分,共15分)

6, C 7, A 8, D 9, B 10, A

#### 三、计算题(每小题12分,共60分)

11、【解】设A: 考生对相关知识完全掌握; B: 考生对相关知识部分掌握; C: 考生对相关知识完全不掌握; D: 考生选对答案;

则由题意可知: P(D|A) = 1, P(D|B) = 0.5, P(D|C) = 0.25

(1) P(D) = P(A)P(D|A) + P(B)P(D|B) + P(C)P(D|C)

$$=0.6\times1+0.2\times0.5+0.2\times0.25=0.75$$
 8  $\%$ 

(2) 
$$P(A|D) = \frac{P(AD)}{P(D)} = \frac{P(A)P(D|A)}{P(D)} = \frac{0.6 \times 1}{0.75} = 0.8$$

12、【解】(1) 
$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{0}^{+\infty} Axe^{-x^{2}} dx = \frac{A}{2} \Rightarrow A = 2$$
 4 分

(2) 
$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t) dt = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-x^2}, & x \ge 0 \end{cases}$$

(3) 
$$P(-1 \le X < 2) = \int_0^2 2xe^{-x^2} dx = 1 - e^{-4}$$

13、【解】(1) 由题设条件  $P(X^2 = Y^2) = 1$  可知  $P(X^2 \neq Y^2) = 0$ ,结合边缘与联合关系得 (X,Y) 的联合分布律为

X	-1	0	1	$P(X=x_i)$
0	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
$P(Y=y_j)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1

4分

(2) 利用同一表格法得 Z 的分布律为:

Z	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

8分

(3) 
$$EX = \frac{2}{3}$$
,  $EY = 0$ ,  $EXY = EZ = 0$ ,  $Cov(X,Y) = EXY - EXEY = 0$ , 则  $\rho_{XY} = 0$  12 分

14、【解】 
$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-x}^{1} 1 dy = 1 + x, & -1 < x \le 0, \\ \int_{x}^{1} 1 dy = 1 - x, & 0 < x \le 1, = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \ge 1. \end{cases}$$
 5 分

$$f_{Y}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-y}^{y} 1 dx, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{ 其他.} \end{cases} = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{ 其他.} \end{cases}$$

显然 
$$f(x,y) \neq f_v(x) f_v(y)$$
,则  $X$ ,  $Y$  不独立.

(2) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$  为样本观测值,则似然函数:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i; \theta) = \begin{cases} (\theta+1)^n \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\theta}, & 0 < x_i < 1 \\ 0, & \text{ #.w.} \end{cases}$$

 $\stackrel{\text{"}}{=} 0 < x_i < 1 (i = 1, 2, \dots n)$  时,  $\ln L(\theta) = n \ln(\theta + 1) + \theta \sum_{i=1}^{n} \ln x_i$ ,

两边对
$$\theta$$
求导,得 $\frac{\mathrm{dln}L(\theta)}{\mathrm{d}\theta} = \frac{n}{\theta+1} + \sum_{i=1}^{n} \ln x_i = 0$ ,

解得 $\theta$ 的极大似然估计值为 $\hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \ln x_i}$ ,

则对应的极大似然估计量为
$$\hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \ln X_i}$$
 12分

### 四、应用题(每小题5分,共5分)

16、【解】设 X 为需要赔偿的车主人数,得  $X \sim B(10000, 0.006)$ , EX = 60, DX = 59.64,则保险公司在一年获利不少于 60000 元的概率为:

$$P(120000-1000X>60000),$$

利用中心极限定理可知

$$P(120000 - 1000X > 60000) = P(X < 60) = P\left(\frac{X - 60}{\sqrt{59.64}} < \frac{60 - 60}{\sqrt{59.64}}\right) \approx \Phi(0) = \frac{1}{2}.$$
 5 \(\frac{\frac{1}}{2}\)

## 五、证明题(每小题5分,共5分)

17、【证明】取
$$U=X_1-X_2$$
,则 $EU=0$ , $DU=1$ ,则 $U\sim N(0,1)$ ; 1分

又因为
$$X_i \sim N\left(0, \frac{1}{2}\right)$$
,则 $\frac{X_i - 0}{\sqrt{\frac{1}{2}}} = \sqrt{2}X_i \sim N(0, 1)$ ,

进而
$$V = (\sqrt{2}X_3)^2 + (\sqrt{2}X_4)^2 \sim \chi^2(2)$$
 3分

$$U,V$$
相互独立,则 $Y = \frac{U}{\sqrt{\frac{V}{2}}} \sim t(2)$ . 5分