

安徽大学 20 19 —20 20 学年第 一 学期

《 概率论与数理统计 A 》考试试题 (A 卷)

参考答案及评分标准

一、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. D            2. B            3. A            4. D            5. C

二、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6.  $\frac{3}{4}$             7.  $\frac{1}{4}$             8. 2            9.  $\mu^2$             10. (3.412, 4.588)

三、计算题 (每小题 12 分, 共 72 分)

11. 解: 以  $A_1$  和  $A_2$  分别表示订阅了甲报和乙报,  $B$  表示第二年续订. 则

$$P(A_1\bar{A}_2) = 0.6 - 0.1 = 0.5, P(\bar{A}_1A_2) = 0.5 - 0.1 = 0.4, P(A_1A_2) = 0.1;$$

$$P(B|A_1\bar{A}_2) = 0.7, P(B|\bar{A}_1A_2) = 0.6, P(B|A_1A_2) = 0.8.$$

(1) 由全概率公式有

$$\begin{aligned} P(B) &= P(\bar{A}_1A_2)P(B|\bar{A}_1A_2) + P(A_1\bar{A}_2)P(B|A_1\bar{A}_2) + P(A_1A_2)P(B|A_1A_2) \\ &= 0.5 \times 0.7 + 0.4 \times 0.6 + 0.1 \times 0.8 = 0.67. \end{aligned} \dots\dots\dots 8 \text{分}$$

(2) 利用贝叶斯公式有

$$P(A_1A_2|B) = \frac{P(A_1A_2)P(B|A_1A_2)}{P(B)} = \frac{0.1 \times 0.8}{0.67} = \frac{8}{67}. \dots\dots\dots 12 \text{分}$$

12. 解: (1) 易知  $a + b + 1/3 = 1$ ,  $EX = b + 2/3 = 1$ , 故  $a = b = 1/3$ .  $\dots\dots\dots 3 \text{分}$

(2) 注意到  $U \geq V$ , 故  $P(U=0, V=1) = P(U=0, V=2) = P(U=1, V=2) = 0$ , 另外

$$P(U=0, V=0) = P(X=0, Y=0) = P(X=0)P(Y=0) = 1/9;$$

同理,

$$P(U=1, V=0) = P(X=1, Y=0) + P(X=0, Y=1) = 2/9;$$

$$P(U=1, V=1) = P(X=1, Y=1) = 1/9;$$

$$P(U=2, V=0) = P(X=2, Y=0) + P(X=0, Y=2) = 2/9;$$

$$P(U=2, V=1) = P(X=2, Y=1) + P(X=1, Y=2) = 2/9;$$

$$P(U=2, V=2) = P(X=2, Y=2) = 1/9.$$

从而  $(U, V)$  的概率分布为

$U \backslash V$	0	1	2
0	1/9	0	0
1	2/9	1/9	0
2	2/9	2/9	1/9

.....9分

$$(3) EUV = 1 \times 1 \times 1/9 + 2 \times 1 \times 2/9 + 2 \times 2 \times 1/9 = 1,$$

$$EU = 0 \times 1/9 + 1 \times 3/9 + 2 \times 5/9 = 13/9, EV = 0 \times 5/9 + 1 \times 3/9 + 2 \times 1/9 = 5/9,$$

$$\text{故 } Cov(U, V) = EUV - EU \cdot EV = 1 - 65/81 = 16/81. \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

13. 解: (1) 由  $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$  得, 当  $x > 0$  时,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{+\infty} x e^{-x(1+y)} dy = e^{-x},$$

$$\text{从而 } f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

同理,  $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$ , 当  $y > 0$  时,

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_0^{\infty} x e^{-x(1+y)} dx = \frac{1}{(1+y)^2},$$

从而

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{(1+y)^2}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

(2) Z 的分布函数

$$F_Z(z) = P(XY \leq z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ \int_0^{\infty} \int_0^{z/x} x e^{-x(1+y)} dy dx, & z > 0, \end{cases} = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ 1 - e^{-z}, & z > 0. \end{cases}$$

因此 Z 的密度函数为

$$f_Z(z) = \begin{cases} e^{-z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases} \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

14. 解: (1) 易见  $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{2} e^{-|x|} dx = 0,$

$$EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{2} e^{-|x|} dx = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = 2,$$

$$\text{从而 } DX = EX^2 - (EX)^2 = EX^2 = 2. \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

(2)  $Cov(X, |X|) = EX|X| - EX \cdot E|X| = EX|X| = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x|x|}{2} e^{-|x|} dx = 0$ , 故  $X$  和  $|X|$  不相关. ....8 分

(3) 对于给定的  $0 < a < \infty$ , 由于事件  $(|X| \leq a) \subset (X \leq a)$ , 且

$$P(X \leq a) < 1, P(|X| \leq a) > 0, \text{ 故 } P(X \leq a, |X| \leq a) = P(|X| \leq a),$$

但  $P(X \leq a)P(|X| \leq a) < P(|X| \leq a)$ , 所以

$$P(X \leq a, |X| \leq a) \neq P(X \leq a)P(|X| \leq a), \text{ 即 } X \text{ 和 } |X| \text{ 不独立. ....12 分}$$

15. 解: (1) 以  $\bar{X}$  表示该样本均值, 则  $\bar{X} \sim N(3.4, 36/n)$ , 故  $\frac{\bar{X} - 3.4}{6/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ .

从而有

$$\begin{aligned} P(1.4 < \bar{X} < 5.4) &= P(|\bar{X} - 3.4| < 2) = P\left(\frac{|\bar{X} - 3.4|}{6/\sqrt{n}} < \frac{2}{6/\sqrt{n}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - \Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{3}\right) = 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - 1 \geq 0.95, \end{aligned}$$

故  $\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) \geq 0.975$ , 即  $\frac{\sqrt{n}}{3} \geq 1.96$ , 从而  $n \geq (1.96 \times 3)^2 \approx 34.57$ , 所以  $n$  至少应取 35.

.....8 分

(2) 由于  $\frac{nS_n^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$ , 故

$$D(18S_n^2/36) = \frac{1}{4} DS_n^2 = 2(18-1) = 34, \text{ 从而 } DS_n^2 = 136. \text{ ....12 分}$$

16. 解: (1) 矩估计: 易见  $EX = \int_c^{+\infty} \frac{x}{\theta} e^{-(x-c)/\theta} dx = \theta + c$ ,

$$EX^2 = \int_c^{+\infty} \frac{x^2}{\theta} e^{-(x-c)/\theta} dx = \theta^2 + (\theta + c)^2.$$

令  $EX = \bar{x}$ ,  $EX^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$ , 则  $\theta$  与  $c$  的矩估计值分别为

$$\hat{\theta} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad \hat{c} = \bar{x} - \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}. \text{ ....6 分}$$

(2) 极大似然估计: 易见似然函数为

$$L(\theta, c) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-(x_i - c)/\theta} = \frac{1}{\theta^n} e^{-\sum_{i=1}^n (x_i - c)/\theta}, \quad x_i \geq c, 1 \leq i \leq n,$$

对数似然函数为

$$\ln L(\theta, c) = -n \ln \theta - \sum_{i=1}^n (x_i - c) / \theta, \quad x_i \geq c, 1 \leq i \leq n.$$

故当  $x_i \geq c, 1 \leq i \leq n$ , 即  $c \leq \min(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_{(1)}$  时,

$$\ln L(\theta, c) = -n \ln \theta - \sum_{i=1}^n (x_i - c) / \theta,$$

由于

$$\frac{\partial \ln L(\theta, c)}{\partial c} = \frac{n}{\theta} > 0,$$

即  $L(\theta, c)$  关于  $c$  单调递增, 故为使  $L(\theta, c)$  取到最大值,  $c$  应取  $\min(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_{(1)}$ ,

即  $c$  的最大似然估计为  $\hat{c} = x_{(1)}$ ; 再令

$$\frac{\partial \ln L(\theta, c)}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n (x_i - c) / \theta^2 = 0,$$

可得到  $\theta$  的极大似然估计值为

$$\hat{\theta} = \bar{x} - \hat{c} = \bar{x} - x_{(1)}. \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

#### 四、应用题 (每小题 8 分, 共 8 分)

17. 解: 由题意  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\mu$  与  $\sigma^2$  皆未知. 需检验的假设为

$$H_0: \mu = 500 \leftrightarrow H_1: \mu \neq 500.$$

选用统计量

$$t = \frac{\bar{X} - 500}{s / \sqrt{n}},$$

故在  $H_0$  成立的条件下  $t \sim t(n-1)$ , 从而得到该假设检验问题的拒绝域为

$$W = \left\{ \left| \frac{\bar{X} - 500}{s / \sqrt{n}} \right| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right\}.$$

将  $\bar{x} = 510$ ,  $s = 20$ ,  $n = 9$ ,  $\alpha = 0.05$  代入得,

$$\left| \frac{\bar{X} - 500}{s / \sqrt{n}} \right| = 1.5, \quad \text{而 } t_{0.025}(8) = 2.31,$$

故样本值没有落入拒绝域中, 从而接受原假设  $H_0$ , 即认为这批钢索的断裂强度

仍为  $500 \text{ kg/cm}^2$ .  $\dots\dots\dots 8 \text{ 分}$