

Table of Fourier Series for Common Signals

Name	Waveform	c_0	$c_k, k \neq 0$	Comments
Sawtooth		$\frac{X_0}{2}$	$j \frac{X_0}{2\pi k}$	
Impulse train		$\frac{X_0}{T_0}$	$\frac{X_0}{T_0}$	
Rectangular wave		$\frac{TX_0}{T_0}$	$\frac{TX_0}{T_0} \text{sinc}\left(\frac{Tk\omega_0}{2\pi}\right)$	$\frac{Tk\omega_0}{2\pi} = \frac{Tk}{T_0}$
Square wave		0	$-j \frac{2X_0}{\pi k}$	$c_k = 0, k \text{ even}$
Triangular wave sine		$\frac{X_0}{2}$	$\frac{-2X_0}{(\pi k)^2}$	$c_k = 0, k \text{ even}$

Table of Fourier transform pairs

$f(t)$	$F(\omega)$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi \delta(\omega) = \delta\left(\frac{\omega}{2\pi}\right)$
$u(t)$	$\pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
$\text{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi \delta(\omega - \omega_0)$
$\cos \omega_0 t$	$\pi \delta(\omega - \omega_0) + \pi \delta(\omega + \omega_0)$
$\sin \omega_0 t$	$\frac{\pi}{j} \delta(\omega - \omega_0) - \frac{\pi}{j} \delta(\omega + \omega_0)$
e^{-bt^2}	$\sqrt{\pi/b} e^{-\omega^2/(4b)}$
$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_0)$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \omega_0 \delta(\omega - k\omega_0)$

$f(t)$	$F(\omega)$
$\frac{1}{b^2 + t^2}$	$\frac{\pi}{b} e^{-b \omega }$
$e^{-b t }$	$\frac{2b}{b^2 + \omega^2}$
$\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$	$T \text{sinc}\left(T \frac{\omega}{2\pi}\right)$
$\text{tri}(t)$	$\text{sinc}^2\left(\frac{\omega}{2\pi}\right)$
$\frac{\omega_0}{2\pi} \text{sinc}\left(\frac{\omega_0}{2\pi} t\right)$	$\text{rect}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$
$\text{sinc}^2(t)$	$\text{tri}\left(\frac{\omega}{2\pi}\right)$
$e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{j\omega + a}$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{(j\omega + a)^n}$
$\frac{j}{\pi t}$	$\text{sgn}(\omega)$

b is a real positive number throughout. a is a real or complex number throughout, with positive real part.

Properties of the Continuous-Time Fourier Transform

	Time	Fourier
Synthesis, Analysis	$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$	$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$
Eigenfunction	$h(t) * e^{j\omega_0 t} = H(\omega_0) e^{j\omega_0 t}$	$H(\omega) 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$ $= H(\omega_0) 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$
Linearity	$a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)$	$a_1 F_1(\omega) + a_2 F_2(\omega)$
Time transformation	$f(at + b), a \neq 0$	$\frac{1}{ a } e^{j\omega b/a} F(\omega/a)$
Time shift	$f(t - \tau)$	$F(\omega) e^{-j\omega \tau}$
Time reversal	$f(-t)$	$F(-\omega)$
Time-scaling	$f(at), a \neq 0$	$\frac{1}{ a } F\left(\frac{\omega}{a}\right)$
Convolution	$f_1(t) * f_2(t)$	$F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)$
Time-domain Multiplication	$f_1(t) \cdot f_2(t)$	$\frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * F_2(\omega)$
Frequency shift	$f(t) e^{j\omega_0 t}$	$F(\omega - \omega_0)$
Modulation (cosine)	$f(t) \cos(\omega_0 t)$	$\frac{F(\omega - \omega_0) + F(\omega + \omega_0)}{2}$
Time. Differentiation	$\frac{d^n}{dt^n} f(t)$	$(j\omega)^n F(\omega)$
Freq. Differentiation	$(-jt)^n f(t)$	$\frac{d^n}{d\omega^n} F(\omega)$
Integration	$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau = f(t) * u(t)$	$\frac{1}{j\omega} F(\omega) + \pi F(0) \delta(\omega)$
Conjugation	$f^*(t)$	$F^*(-\omega)$
Symmetry properties	$f(t)$ real	$F(\omega) = F^*(-\omega)$
	$f(t) = f^*(-t)$	$F(\omega)$ real
Duality	$F^*(t)$	$2\pi f^*(\omega)$
Duality	$F(t)$	$2\pi f(-\omega)$
Relation to Laplace	$F(\omega) = F(s) _{s=j\omega}$, if ROC includes $j\omega$ axis	
Parseval's Theorem	$\int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2^*(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_1(\omega) F_2^*(\omega) d\omega$	
Parseval/Rayleigh Theorem	$E = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) ^2 d\omega$	
DC Value	$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = F(0)$	

A function that satisfies $f(t) = f^*(-t)$ is said to have **Hermitian symmetry**.

Table of Laplace transform pairs

$f(t)$	$F(s)$	ROC
$\delta(t)$	1	$\forall s$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{real}\{s\} > 0$
$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\text{real}\{s\} > 0$
$e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\text{real}\{s\} > \text{real}\{-a\}$
$-e^{-at} u(-t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\text{real}\{s\} < \text{real}\{-a\}$
$t^n e^{-at} u(t)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$	$\text{real}\{s\} > \text{real}\{-a\}$

$f(t)$	$F(s)$	ROC
$\sin(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{real}\{s\} > 0$
$\cos(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{real}\{s\} > 0$
$e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$\text{real}\{s\} > \text{real}\{-a\}$
$e^{-at} \sin(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$\text{real}\{s\} > \text{real}\{-a\}$
$u_n(t) = \frac{d^n}{dt^n} \delta(t)$	s^n	$\forall s$
$u_{-n}(t) = \underbrace{u(t) * \dots * u(t)}_{n \text{ times}}$	$\frac{1}{s^n}$	$\text{real}\{s\} > 0$

Properties of the Laplace Transform

	Time	Laplace	ROC (of result)
Linearity	$a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)$	$a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s)$	contains $\text{ROC}_1 \cap \text{ROC}_2$
Time shift	$f(t - \tau)$	$e^{-s\tau} F(s)$	same
Time-scaling	$f(at), a \neq 0$	$\frac{1}{ a } F\left(\frac{s}{a}\right)$	aROC
Time reversal	$f(-t)$	$F(-s)$	–ROC
Convolution	$f_1(t) * f_2(t)$	$F_1(s) \cdot F_2(s)$	contains $\text{ROC}_1 \cap \text{ROC}_2$
Frequency shift	$f(t)e^{j\omega_0 t}$	$F(s - j\omega_0)$	same
Frequency shift	$f(t)e^{s_0 t}$	$F(s - s_0)$	$\text{ROC} + \text{real}\{s_0\}$
Time Differentiation	$\frac{d^n}{dt^n} f(t)$	$s^n F(s)$	contains ROC
s -domain Differentiation	$(-t)^n f(t)$	$\frac{d^n}{ds^n} F(s)$	same
Integration	$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau = f(t) * u(t)$	$\frac{1}{s} F(s)$	contains $\text{ROC} \cap \{\text{real}\{s\} > 0\}$
DC Value	$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = F(0)$		must contain $s = 0$