

线性代数 试卷 3

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

试卷卷面成绩											占课程 考核成 绩 85%	平时 成绩 占 15%	课程 考核 成绩
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	小计			
得分													
评阅													
审核													

注意事项:

- (1) 本试卷共九道大题, 共八页, 请认真核对。
- (2) 正确填写学院、班级、姓名、学号等个人信息, 空填、错填或涂改的试卷为无效试卷。
- (3) 请使用钢笔、签字笔或者圆珠笔答卷, 使用铅笔或红笔答卷的试卷为无效试卷。

得分

一、单项选择题 (本题共 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 n 阶方阵 A, B, C 满足关系式 $ABC = E$, 其中 E 是 n 阶单位阵, 则必有_____。

- (A) $ACB = E$ (B) $CBA = E$ (C) $BAC = E$ (D) $BCA = E$

2. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性相关的是_____。

- (A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$
 (B) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$
 (C) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$
 (D) $\alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_1 + \alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$

3. 设 n 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则当_____时, $A - tE$ 为正定矩阵。

- (A) $t < \min\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ (B) $t > \min\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$
 (C) $t < \max\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ (D) $t > \max\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$

4. 设 n 阶矩阵 A 的秩为 $n-1$, α_1, α_2 均为非零向量且满足 $A\alpha_1 = 0, A\alpha_2 = \alpha_2$, 则线性方程组

$Ax = \frac{1}{2}\alpha_2$ 的通解为 (k 为任意常数)

- (A) $k\alpha_1 + \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}$ (B) $k\alpha_1 + \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2}$
 (C) $k\alpha_2 + \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}$ (D) $k\alpha_2 + \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2}$

5. 设 n 阶方阵 A 可逆, 其伴随矩阵为 A^* , 则 $\|A^*|A| =$ _____。

- (A) $|A|^{n^2}$ (B) $|A|^n$ (C) $|A|^{n^2-n}$ (D) $|A|^{n^2-n+1}$

得分

二、填空题（本题共 15 分，每小题 3 分）

1. 设 4 阶方阵 A 的秩为 2，则其伴随矩阵 A^* 的秩为_____。

2. 设 n 元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有解，其中 A 是 $(n+1) \times n$ 矩阵，则 $|(A, b)| =$ _____。

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，而 $n \geq 2$ 为正整数，则 $A^n - 2A^{n-1} =$ _____。

4. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + tx_2x_3$ 是正定的，则 t 的取值范围是_____。

5. 若 4 阶方阵 A 与 B 相似，矩阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$ ，则行列式 $|B^{-1} - E| =$ _____。

得分

三、（本题 9 分）

计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$ 。

得分

四、(本题 10 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ ，矩阵 X 满足 $A^*X = A^{-1} + 2X$ ，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵，求矩阵 X 。

得 分

五、(本题 14 分)

已知 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 3, 5)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, a + 2, 1)^T$, $\alpha_4 = (1, 2, 4, a + 8)^T$ 及 $\beta = (1, 1, b + 3, 5)^T$,

- (1) a, b 为何值时, β 不能表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合?
- (2) a, b 为何值时, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 唯一线性表示? 并写出该表示式。

得分

六、(本题 12 分)

求解线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4 \\ x_1 + x_3 - x_4 = -3 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 3 \end{cases}$$

得 分

七、(本题 15 分)

求一个正交变换化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 为标准形。

得分

八、(本题 5 分)

设 a_1, a_2, \dots, a_n 都是实数，问二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \dots + (x_{n-1} + a_{n-1} x_n)^2 + (x_n + a_n x_1)^2$$

在什么条件下是正定的？

得 分

九、(本题 5 分)

证明： n 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充分必要条件是

$$D = \begin{vmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T \alpha_n \end{vmatrix} \neq 0, \text{ 其中 } \alpha_i^T \text{ 表示列向量 } \alpha_i \text{ 的转置, } i = 1, 2, \dots, n.$$

线性代数试题 3 答案

一、单项选择题 (本题共 15 分, 每小题 3 分)

1. D; 2. C; 3. A ; 4. A ; 5. D

二、填空题 (本题共 15 分, 每小空 3 分)

1. 0 ; 2. 0 ; 3. 0 ; 4. $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$; 5. 24

三. (9 分)

$$x^4$$

四. (10 分)

$$X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

五. (14 分)

解: (1)

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & 4 & b+3 \\ 3 & 5 & 1 & a+8 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & a+1 & 0 \end{pmatrix}$$

所以当 $a = -1, b \neq 0$ 时, β 不能表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合。

(2)

当 $a \neq -1$ 时, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 唯一线性表示

$$\beta = -\frac{2b}{a+1}\alpha_1 + \frac{a+b+1}{a+1}\alpha_2 + \frac{b}{a+1}\alpha_3 + 0\alpha_4$$

六. (12 分)

解:

通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

七. (15 分)

$$\text{取正交矩阵: } P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

正交变换 $x = Py$

$$\text{标准形: } f(x_1, x_2, x_3) = 9y_3^2$$

八. (5 分)

解: 只需寻求 x_1, x_2, \dots, x_n 不全为零时, $x_1 + a_1 x_2, x_2 + a_2 x_3, \dots, x_{n-1} + a_{n-1} x_n, x_n + a_n x_1$ 也不全为零的条件

转化为: 下面齐次线性方程组只有零解的条件

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 = 0 \\ x_2 + a_2 x_3 = 0 \\ \vdots \\ x_{n-1} + a_{n-1} x_n = 0 \\ x_n + a_n x_1 = 0 \end{cases}$$

$$\text{因为系数行列式 } D = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + (-1)^{n+1} a_1 a_2 \cdots a_{n-1} a_n$$

所以当 $a_1 a_2 \cdots a_{n-1} a_n \neq (-1)^n$ 时, 齐次线性方程组只有零解。所以当 x_1, x_2, \cdots, x_n 不全为零

时, 二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) > 0$, 即为二次型正定。

证明:

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$

$$\therefore \begin{pmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = A^T A$$

$$\therefore D = |A^T A| = |A^T| |A| = |A|^2 \quad \therefore D \neq 0 \Leftrightarrow |A| \neq 0$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关的充分必要条件是 $|A| \neq 0 \Leftrightarrow D \neq 0$ 。