

CLASSIFICATION DES MÉDICAMENTS BY THE GROUP : TOGETHER , WE'LL BE STRONG.



EN COLLABORATION AVEC LE GROUPE :
TOGETHER , WE'LL BE STRONG.

Nota Bene : *La recherche scientifique est une quête permanente.*

ANTALGIQUES (qui calment la douleur) et **ANTIPYRÉTIQUES** (contre la fièvre)

✚ On peut classer la fièvre en 3 groupes selon le degré thermique :

- **Fièvre modérée** : 37°5 à 38°5 C
- **Fièvre élevée** : 38°5 à 40° C
- **Hyperthermie majeure** : Supérieur à 40° C

➤ **Dolyc cp 1g et 500 mg** :

- **Dolyc cp 1 g** : 1 cp x 3 / jr

Algibel Patch B/10 : 1 patch / jr

Trifed plus cp : 1 cp x 3 / jr. (*Not suitable for children under the age of 12 years old.*)

➤ **Ginsengyl gélule B/30** : 1 à 3 gélules par jour

NB : Ginsengyl est utilisé dans les cas suivants :

- Fatigue chronique et passagère
- Fatigue mentale et état de stress
- Effets de convalescence
- Dysfonctions érectiles

Zerodol-P : 1 cp x 2 /jr.

Dolotren gel : 1 appl x 2 /jr

Airtal 100 mg cp : 1 cp x 2 / jr

Tracedol cp eff : 1 cp eff x 2 /jr

Klipal Codéine cp (300 mg ou 600 mg) : 2 cp x 2/jr

Diantalex cp (2 boîtes) : 2 cp x 2 / jr pdt 5 jrs en per os.

Upsa-C 1000 mg cp effervescent : 1 cp / jr. (*Not suitable for children under the age of 15 years old*).

Dolimex cp effervescent : 1 cp eff x 3 / jr. *Ne pas dépasser 5 jours de Traitement.*

Trialgic gel : 2 gel x 2 / jr. (*Not suitable for children under the age of 15 years old*).

Acupan 20 mg / 2 ml (Néfopam) : 1 ampoule en IV ou IM par Jour. A renouveler jusqu'à 6 Ampoules par jour si nécessaire.

Tracédol : 15 mg/kg/jr. Ne pas dépasser 75 mg. (*Not suitable for children under the age of 12*)

➤ **Trabar 50, capsules (Tramadol)**. *Not suitable for children under the age of 12 years old.*

- Prendre 1 à 2 capsules toutes les 4–6 heures avec un peu de liquide. Les effets se maintiennent 4 à 8 heures, selon les douleurs traitées.

Trabar injectable : 50 à 100 mg toutes les 4 à 6 heures, sans dépasser 600 mg par jour.

➤ **Tramadol EG** (*Not suitable for children under the age of 15 years old.*) :

- **Douleurs chronique** (50 ou 100 mg cp) : 1 ou 2 cp / jr
- **Douleur Aigues** (100 mg) : 2 cp / jr
- **Douleur Aigues** (50 mg) : 2 cp x 2 / jr

Tramadol Denk 50 mg cp eff : 1 cp eff x 2 / jr. (*Not suitable for children under the age of 12 years old.*)

➤ **Novalgin** :

- **Novalgin injectable 500 mg** : elle peut être répétée toutes les 6-8 heures ; une dose quotidienne de 5 g, soit 10 ml, ne devrait pas être dépassée.
- **Novalgin injectable 500 mg** = 5 ml soit 5 cc.

- **Novalgin comprimé** :

- **Chez l'adulte, 500 mg** : 1 à 2 cp / jr. Si nécessaire jusqu'à 4 fois par jour.
- **Chez les enfants et adolescents, 250 mg** : 8 à 16 mg / kg en dose unique.

➤ **Analgin injectable 2,5 mg** = 2500 ml soit 5 cc. Dose journalière : 60mg / kg.

➤ **Dologan Denk** : 1 cp x 3/jr. Au maximum 2 cp x 3/jr. (*Not suitable for children under the age of 18 years old*).

Spasfon : 1 ampoule sera administrée au moment de la crise, renouvelée en cas de spasmes importants, sans dépasser 3 ampoules par 24 heures. Spasfon comprimés ou suppositoires prendront le relais du traitement d'attaque selon une posologie de 6 comprimés ou 3 suppositoires par jour.

Perfalgan : 15 mg/kg de paracétamol par administration, soit 1,5 ml de solution/kg, jusqu'à 4 fois par jour. Respecter un intervalle d'au moins 4 heures entre 2 administrations. La dose maximale journalière ne doit pas dépasser 60 mg/kg.

Panol comprimé : Adulte et enfant de plus de 15 ans (pesant plus de 50 kg). 1 à 2 comprimés, 1 à 3 fois par jour. Ne pas dépasser 3 g de paracétamol par jour (6 comprimés) sans avis médical.

Panol 250 susp buv flacon de 100 ml, 500 mg sachet, 500 mg comprimé : Enfant de moins de 40 kg (la dose totale de paracetamol ne doit pas dépasser 80 mg/kg/jr.

PARACETAMOL : 60 mg/kg/jr, à répartir en 4 ou 6 prises, soit environ 15 mg/kg toutes les 6 heures ou 10 mg/kg toutes les 4 heures.

- **Paracétamol 500 mg cp** : (Douleur et/ou Fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses). Réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de 27 kg soit à partir de 8 ans environ.

❖ **Posologie :**

- *Enfant de 27 à 40 kg* : 1 cp par prise, sans dépasser 4 cp par jour.
- *Enfant de 41 à 50 kg* : 1 cp par prise, sans dépasser 6 cp par jour.
- *Poids supérieur à 50 kg* : 1 ou 2 cp par prise, sans dépasser 3g par jour, soit 6 comprimés par jour.

- **Parat-une 250 mg sirop** : (*Not suitable for children under the age of 3 month.*)

- *Enfant de 3 à 6 mois* : 2,5 ml / 4 heures
- *Enfant de 6 mois à 2 ans* : 5 ml / 4 heures
- *Enfant de 3 ans et plus* : 10 ml / 4 heures

NB : Parat-Une Sirop en Per Os pendant 3 jours.

- **Doliprane** : suppo ou sachet ; (**La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.**)

- 6- 8 kg : 100 mg
- 8- 12 kg : 150 mg
- 12- 15 kg : 200 mg
- 16- 26 kg : 300 mg
- 27- 35 kg : 500 mg
- **Doliprane sachet 500 mg** : Plus de 27 kg
- **Doliprane cp 500 mg** : pour le grand enfant et adulte.
- **Doliprane 1000 mg** : La dose habituelle est de 1 gélule par prise, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum. Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant pesant plus de 50 kg (soit à partir d'environ 15 ans).

❖ **Doliprane 500 mg comprimé effervescent :**

- ✓ *Enfant de 27 à 40 kg* : 1 cp x 3 / jr sans dépasser 4 cp par jour.
- ✓ *Enfant de 41 à 50 kg* : 2 cp x 3 / jr sans dépasser 6 cp par jour.
- ✓ *Adulte et poids supérieur à 50 kg* : 2 cp x 3 / jr sans dépasser 6 cp par jour.

Perfalgan : 10- 15 mg/kg en injection si fièvre supérieure à 40 degré Celsius.

- **Acétylsalicylate** : 60 mg/kg/jr. A éviter surtout chez les enfants de moins de 3 ans.
- **Aspégic** : sachet (100 mg, 250 mg, 500 mg et 1000 mg)
 - **Catalgine** : sachet (100 mg et 250 mg)

Parol sirop : De 12 à 16 kg (environ 2 à 4 ans) : 1 ½ à 2 cuillère-mesures soit 180 mg à 240 mg, à renouveler si nécessaire au bout de 6 heures, voire 4 heures minimum, sans dépasser 6 à 8 cuillère-mesures par jour.

➤ **Efferalgan 250mg, 500mg, 1000mg** :

- **Efferalgan pédiatrique sirop** : (Dose / poids) x 3 / jr
- **Efferalgan 1g** : 1 cp x 3 / jr

➤ **Efferalgan Codéine cp effervescent** : 1 cp eff x 2 / jr. (Not suitable for children under the age of 12 years old).

➤ **Panadol Enfant et Nourrisson** : La dose à administrer est de 60 mg/kg/jr, répartir en 4 ou 6 prises, soit environ 15 mg/kg toutes les 6 heures. **NB** : Cette présentation est réservée à l'enfant de 4 à 16 kg (soit environ jusqu'à 4 ans).

- De 4 à 7 kg : ½ cuillère-mesure x 3 / jr
- De 7 à 10 kg : ½ à 1 cuillère-mesure x 3 / jr
- De 10 à 12 kg : 1 à 1 ½ cuillère-mesure x 3 / jr
- De 12 à 16 kg : 1 ½ à 2 cuillère-mesure x 3 / jr.

➤ **Panadol comprimé** :

- Adulte et enfant de plus de 15 ans (pesant plus de 50 kg) : 1 à 2 ou 3 cp / jr
- Enfant de plus de 27 kg : 60 mg / kg / jr
- Enfant de 27 à 40 kg (environ 8 à 13 ans) : 1 cp x 3/jr. **Sans dépasser 4 cp/jr**
- Enfant de 41 à 50 kg (environ 12 à 15 ans) : 1 cp à renouveler si besoin au bout de 4 heures **sans dépasser 6 comprimés par jour**.

Gripex sachet : 1 scht x 3 / jr (en cas de rhume, nez bouché, maux de tête, fièvre)

➤ **Brustan sirop** :

- **Adulte** : 3 à 4 fois par jour
- **Enfant** : 20 mg/ kg en plusieurs doses.

➤ **Febrilex** : (Rhumes, rhinites, rhino-pharyngites et états grippaux).

- **Nourrisson** : 2,5 ml x 3 / jr.
- **Enfants de 6 à 12 ans** : 5 à 10 ml de sirop 3 à 4 fois par jour
- **Plus de 12 ans et 50 kg** : 15 ml de sirop 3 à 4 fois par jour.
- **Adultes** : 60 mg/kg/ jr.

NB : Le traitement ne doit pas dépasser 5 jours maximum.

Diantalex cp 500 mg : 1 cp x 3 / jr pdt 5 jrs en Per Os (2 boîtes).

Cetalgic gélule 500mg et 1000mg :

ANTI-INFLAMMATOIRES (Propre à combattre l'inflammation)

Isolone cp eff 200 mg : 3 cp / jr (à prendre le matin)

➤ **Tradolan comprimé** :

- **150 mg** : 1 cp x 2 / jr
- **50 mg** : 1 cp x 3 / jr

Voltaire 50 mg cp : 1 cp x 2 / jr

Pronerv gel : 1 gel x 2 / jr

➤ **Ibuprofène** : 20- 30 mg/kg/jr (Chaque 6 heures)

- **Advil** : Sirop (Dose / poids) x 3 / jr
- **Sapofene** : Sirop en cuillère mesure

Algifene : Sirop (Doses / poids) : 3 x / jr

➤ **Nifluril** : Suppo 400 mg

- 06 mois- 30 mois : ½ suppo 2 x / jr
- 30 mois- 12 ans : 1 suppo 3 x / jr
- 12 ans et plus : 1 suppo pour 10 kg.

Toradol :

Brufen :

Apranax :

Cliptol gel pour se masser :

Olfen-75 ZR :

Genforte :

Malva :

Lumirelax :

Volfast :

ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROÏDIENS (réduisent la douleur, la fièvre et l'inflammation)

Contre Indication : grossesse > 5mois, Asthme, UGD, hémorragie, AVC, insuffisance rénale, enfant de moins 15 ans.

Exxib gélule ou **Comprimé 200 mg** : 1 cp ou gel / jr. (*Not suitable for children*).

Diantalex cp (2 boîtes) : 2 cp x 2 / jr pdt 5 jrs en per os.

Diclo Denk		
Ingrédients pharmaceutiques	Aspect	Posologie
Diclofénac sodium 50mg cp	Comprimé	
Diclofénac sodium 75mg / 3ml	Injectable en IM	1 dose unique
Diclofénac sodium 100 mg	Suppositoire	
Diclofénac sodium 100 mg	Comprimé	
❖ <i>Conseillé pour les adultes et enfants de plus de 16 ans.</i> • <i>Diclo-Denk 50 mg est déconseillé aux enfants et adolescent de moins de 16 ans ;</i> • <i>Diclo-Denk 100 Rectal ne convient pas aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.</i>		

Volt Fast 50 mg sachet B/30 et **B/9** : 2 à 3 scht / jr pdt 5 jrs maximum. (*Not suitable for children under the age of 15 years old*).

Feldene (**Piroxicam**) **20 mg** (cp dispers, suppo, injectable), **10 mg** (gélule)) : 1 cp x 2 / jr.

Ibuprofene (Advil, Ibumol, Ibudol, Brustan, pedifen 100mg/5ml, Trialgic AINS + PARA, Nurofen) cp 400mg. Adlt et enft 30 kg : 1 cp 2 à 3/jr ,sp

Ibuprofene 400 mg cp : 1 cp par prise. (A renouveler si besoin au bout de 6 heures. Ne pas dépasser 3 comprimés par jour soit 1200 mg par jour). **NB** : Réservé à l'adulte et l'enfant à partir de 30 kg.

✓ **La durée du traitement est limitée à :**

- **3 jours** en cas de fièvre et de migraine
- **5 jours** en cas de douleurs

Lofnac cp 100 mg : 1 cp x 2 / jr

Rapidex sachet : 1 scht x 3 / jr

Celebrex 200 mg gel : 1 gel x 2 / jr

Ketoprofene (**Profenid**, ketum, Ketoprofen-GH) **cp 100 mg** : 1 à 2 cp / jr, suppo , sp

Acide Niflunimique (Nifluril) gélule 250mg, suppo 400mg enft

Diclo ,enft 3mg/kg , suppo 100mg, Diclo-Denk 100mg, 50mg

Yokoli's Mother Believed that Life's About Serving Others.

Publish by : Together , we'll be strong.

Aceclofenac (Acenland, T Afenac, Zerodol) **100mg cp** : 1cp× 2/jr

Diclofenac [Diantalex (para +AINS) cp 500mg 250mg 50mg, Raldol cp,

Voltarène cp, (Volini gel , **Dynapar gel, cp**) : 1 cp 2 à 3 × / jr

Volini gel : 1 appl x 2 / jr

Isolone (AIS) 5 mg et 20 mg cp eff :

Trifene 20 mg/ml susp buv ; *Soulage : la Fièvre, la douleur et l'inflammation.*

Age / Poids corporel	Dose recommandée
3 à 6 mois (5 - 7 kg)	50 mg (2,5 ml), 3 fois par jour
6 mois à 1 an (7 - 10 kg)	50 mg (2,5 ml), 3 à 4 fois par jour
1 an à 4 ans (10 - 16 kg)	100 mg (5 ml), 3 fois par jour
4 à 7 ans (16 - 25 kg)	150 mg (7,5 ml), 3 fois par jour
7 à 10 ans (25 - 32 kg)	200 mg (10 ml), 3 fois par jour
10 à 12 ans (32 - 40 kg)	300 mg (15 ml), 3 fois par jour

NB : *Recommandé chez les enfants à partir de 3 mois ou pesant plus de 5 kg, adolescents et adultes.*

RHUMATOLOGIE (Maladies des os, des articulations, des muscles, des tendons et des ligaments)



Aceclofenac (Acenland ,T Afenac ,Zerodol , Actinac) **100 mg cp** : 1 cp× 2 / jr

Miorel gélule : 1 gel x 2 / jr

Dolotren gel : 1 appl x 2 / jr

Yokoli's Mother Believed that Life's About Serving Others.

Publish by : Together , we'll be strong.

Voltarene 50 mg cp : 1 cp x 2 / jr

Tramadis 50 mg gel : 1 gel x 2 / jr

T- Afenac (para+ AINS) :

Zerodol 200 mg cp : 1 cp x 2 /jr.

Arthrostop plus cp : 1 cp x3/jr. (*Contre Indiqué : grossesse et allaitement*)

Osteosyl (cal, zinc, vit kg et D3 Mag) :

Osteocare (vit D3 ,Mag, zinc) :

Renerve-P (neuropathie, néphropathie) :

Artinat 240 mg gélule (Arthrose, mal des os, Arthrite) : 2 gel x 2 / jr

CORTICOÏDE (hormones de synthèse)

Dexamethasone : 0,5mg/kg/Jr en 2 à 4 injection

Betamethasone (Célestène) : 0,5 mg /kg/jr ou 10 gouttes /kg/jr

Diprostène injectable : 1 injection pdt la période où se manifeste l'allergie.

ANTICONVULSIVANT (prévient et arrête les convulsions).

Diazépam ; si cela est inefficace on prescrit **Dépakine**



Diazépam : Chez l'adulte ; elle varie de 0,1 à 0,2 mg/kg par injection. On peut d'emblée administrer 1 à 2 ampoules par IM ou IVDL. Elle peut être renouvelée jusqu'à 4 fois par 24 heures.

Dépakine : Adultes et enfants de plus de 17 kg ; 20 à 30 mg par kg et par jour, répartis en 1 ou 2 prise.

ASTHME

Signes : L'asthme peut prendre la forme d'une toux, d'un sifflement, d'un essoufflement, d'une gêne respiratoire (dyspnée) ou d'une association de plusieurs de ces symptômes ; infections virales (rhumes), de poussière, de fumées, de changements météorologiques, de pollens, de graminées et d'arbres, de poils et de plumes d'animaux, de savons à l'odeur forte ou de parfums.

Causes : infections, allergènes (poussière), tabac, Aspirine, etc.



Seretide aerosol : 2 bouffées x 2/jr pdt 1 mois (Pneumologie, antiasthmaticque)

Seretide 500 mg : 1 dose par jour

Alemont 10 mg et 5mg cp : 1 cp / jr le soir

Oxalair : 1 pulv /jr

Pulmicort susp : 1 x 2 / jr

Aerol (salbutamol) **spray** : 1 app × 2/jr

Ventoline (salbutamol) **cp 2 mg** : 1 cp × 2/jr

Isolone cp eff :

Dexamethasone injectable + salbutamol

Celestène (AIS) cp 2mg, inj 4mg, susbv

Lorkof expectorant (salbutamol + menthol) sp

Aminophylline inj(perf) asthme aiguë grave

ANTI-EPILEPTIQUES (médicaments utilisés dans la prévention ou l'occurrence de l'épilepsie)

Acide Valproïque : Dépakine (20- 30mg/kg)

Phénobarbital : Gardéna (3- 4mg/kg/jr en per os sans dépasser 50mg/jr avant 15 ans)

FIEVRE TYPHOÏDE (maladie infectieuse causée par une bactérie à Gram négatif, une salmonelle, qui se trouve dans une eau contaminée)

Signes : Fièvre (40^0), insomnie, troubles digestif, Asthénie, vertiges, Forte céphalée, langue saburrale.

Céfixime : (*Cefaloral, Intercef, Cefixime-GH, Fixxe, Fixim, Indofix, Solexim, Mexime, bactoxime, cefolac, cedrox, Brufix, Megacef gel, Gramocef-o gel, Oroken, Ofiken*) 200mg cp ,100mg susp (2 à 12 ans) 1 cp $\times$ 2 / jr pdt 5 ou 10 jrs (2 boîtes)

Cefim gélule 200 mg : 1 gel x 2/jr. (2 boites)

Ceficap gel 400 mg B/10 : 1 gel / jr

Cefaloral 200 mg cp : 1 cp x 2 / jr pdt 7 à 10 jrs

Ceftriaxone injectable pdt 3 jr

Ciprofloxacine : (*Cifran CT, Ciprox, Ciprolon, Cipronat*) **cp 500 mg** : 1 cp $\times$ 2 / jr pdt 8 jrs

Ofloxacine (*Oflocet, Oflocef, Oflocine, Ofloxac, Orixo*) **200mg cp** : 1 cp $\times$ 2 / jr pdt 8 jrs (2 btes)

Azithromycine : (*Atmax, Rolicin, Azithro, Azee*) **500mg cp** : 1 cp / jr si résistance à **Ciprofloxacine**

Thiobactin 500mg B/24 cp et 250mg B/12 cp 250mg sp

ANTIBIOTIQUES (substance utilisée pour combattre l'infection)

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.


Maladies d'origine bactérienne

Les agents pathogènes chez l'homme sont variés : virus, bactéries, champignons etc. Ils peuvent être responsables de maladies plus ou moins graves et toucher tous les organes ou systèmes de l'organisme.

La prise en charge de ces maladies diffère selon la nature de l'agent infectieux en cause.

LES DIFFÉRENTS AGENTS PATHOGÈNES CHEZ L'HOMME

VIRUS



Les maladies virales sont déclenchées par des virus, organismes vivants qui utilisent le système immunitaire de l'hôte pour se développer. Les virus sont nombreux et responsables d'une multitude de maladies allant de la simple rhinopharyngite et de la grippe, au VIH, en passant par certaines otites, les bronchiolites et infections cutanées...

Les antibiotiques ne doivent pas être utilisés lors des infections virales : ils ne sont pas efficaces et leur utilisation contribue à faire émerger des souches de bactéries résistantes.

CHAMPIGNONS



Certains champignons ou parasites peuvent être à l'origine de **maladies parasitaires**, telles que des mycoses, la toxoplasmose, le paludisme...

Il existe des traitements adaptés, qui ne sont pas nécessairement des antibiotiques.

BACTÉRIES



ANTIBIOTIQUES



Les **infections bactériennes** peuvent être des otites, angines, infections de la peau (panaris, abcès...), diarrhées, infections urinaires et génitales.

La prescription d'antibiotiques peut être nécessaire pour lutter efficacement contre la bactérie impliquée.

Il existe de nombreux antibiotiques différents, qui ont chacun un mécanisme d'action spécifique. Ils agissent ainsi sur un certain type de bactérie, dans un certain environnement. La prescription d'antibiotiques est nécessairement faite par un médecin et repose sur un diagnostic précis pour identifier le germe impliqué et le traitement le plus adapté.

NB : Toute prescription d'antibiotique a un impact sur les résistances bactériennes elle doit être justifiée. Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens. L'activité in vitro est un élément prédictif de l'efficacité mais ne constitue pas une validation garantissant une efficacité in vivo.

Pénicilline, sulfamide

Infections : pulmonaire, bronches, nez, gorge, oreille, tubes digestif, dents, urinaire

	Amoxicilline				Amoxicilline + Acide clavulanique
Age et poids	500mg/5ml	250mg/5ml	125mg/5ml		Sirop 250mg/5ml
	Sirop				
De 2 à 12 mois (4 - 10 kg)	-	2,5ml	5ml		2,5ml
12 mois à 5 ans (10 - 15 kg)	2,5ml	5ml	10ml		5ml

Amoxicilline : (Imox , Amitron , Alfamox, Clamoxyl) **gélule 500 mg, sp 125 mg, 250 mg.**

- **Amoxicilline gélule 500 mg** : Réservée à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.
- ❖ A titre indicatif :
 - *Chez l'adulte* : 1g à 6g par jour
 - *Chez l'enfant* : 25 mg/kg à 150 mg/kg par jour
- ❖ Cas particulier du Traitement de certaines angines :
 - *Chez l'adulte* : 2g/ jr en 2 prises
 - *Chez l'enfant de plus de 30 mois* : 50 mg/kg/jr en 2 prises pendant 6 jours.
- ❖ Fréquence d'administration :
 - 2 à 3 prises par jour.

- **Amoxiclav-Denk 500/62,5 mg ou 1000/125 mg** :
 - 1 sachet, 2 à 3 fois par jour pour les personnes de plus de 40 kg,
 - 2 comprimés, 2 à 3 fois par jour pour les personnes de plus de 40 kg.

Oxagram 500 mg gel B/24 : 2 gel x 2/jr pdt 6 jrs (Panaris, Furoncle, Plaie surinfectée, Impétigo, Anthrax).

- **Mediclav** : (Amoxicilline + Acide-Clavulanique)
 - **1 g sachet** : 1 scht x 2 / jr..... Supérieur ou égal à 35 KG
 - **500 mg sachet** : 1 scht x 2 / jr..... De 20 à 35 kg
 - **500 mg cp** : 1 cp x 2 / jr..... De 20 à 35 kg
 - **100 mg sirop** : Dose poids x 2 / jr..... de 1 à 20 kg

Clavacin-Xr cp 1g : 1 cp x 2 / jr

➤ **Astaph 500 mg gélule , 125 mg et 250 mg susp** : Adulte : 100mg/Kg/Jr

Astaph 500 mg gélule B/12 et 24 : 1 gel x 3 / jr (Plaies, Furoncles, Cellulite, Impétigo, Folliculite)

➤ **Aclav 500 mg sachet, 1g, 125mg** : (amoxicilline + Acide clavulanique)

- **Adultes** : poids supérieur à 40 kg : 2 à 3 g / jr en 2 ou 3 prises
- **Enfant** : 80 mg/kg/jr en 3 prises sans dépasser la dose de 3 g par jour.
- **Nourrissons** (moins de 30 mois) : 80 mg/kg/jr en 3 prises.

Biotic plus 1g sachet : 1 scht x 2 / jr

Genclav sachet (amoxicilline + acide clavulanique) : 1 scht x 2 ou 3 / jrs pdt 5 à 10 jrs.		
Genclav 1000 mg / 125 mg Adulte et Enfant de 12 ans et plus.	1 sachet x 2 ou 3 / jour	- Infections ORL - Infections urogénitales - Infections respiratoires basses - Infections des os et des articulations - Infections de la peau et des tissus mous - Infections odonto-stomatologiques.
Genclav 500 mg / 62,5 mg Enfant de 2 ans et plus.		
Genclav 250 mg / 31,25 mg Enfant de moins de 2 ans.		

➤ **Augmentin** :

Amoxicilline + Acide clavulanique pdt 10 jrs au début des repas (2 flc ou bte)

- Sirop NRS : Dose poids 3x/jr (Enfant < 30 mois : 50 mg/kg/jr)
- Sirop Enfant : Dose poids 3x/jr (Enfant plus de 30 mois : 80 mg/kg/jr)
- Sachet ou Cp à 1g : 3x/jr (Enfant supérieur à 12 ans).

➤ **Augmentin 500 mg/62,5 mg** : Amoxicilline + acide clavulanique.

Est utilisé en cas de : infection de l'oreille moyenne et des sinus, des voies respiratoires, des voies urinaires, de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires, infections des os et des articulations :

- **Adultes et enfants de 40 kg et plus** :

Dose habituelle : 2 cp trois fois par jour

Dose inférieure : 2 cp deux fois par jour

- **Enfants pesant moins de 40 kg** : donner augmentin suspension buvable ou en sachet.

NB : Ne pas prendre augmentin plus de 2 semaines.

➤ **Augmentin 1 g sachet** : 1 scht x 2 / jr

Clamoxyl 125mg sp, 250mg sp, cp 500 mg : 2 gel × 2 / jr pdt 6 jrs

Clamoxyl 1 g gel : 1 gel x 2 / jr pdt 5 à 10 jrs (2 boîtes)

Clamoxyl 1 g cp : 1 cp x 2 / jr pdt 5 à 10 jrs (2 boîtes)

➤ **Clamoxyl** : 50 mg/kg/jour en 2 prises, pendant 6 jours

❖ *A titre indicatif, les doses prescrites peuvent varier :*

- Adultes : 1 g à 6 g par jour
- Enfant : 25mg/kg à 150mg/kg par jour

❖ *Cas particulier du traitement de certaines angines :*

- Chez l'adulte : 2 g/jour en 2 prises
- Chez l'enfant de plus de 30 mois : 50mg/kg/jour en 2 prises, pendant 6 jours.

NB : La forme gélule est réservée à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

Curam 500mg, 1000mg cp, susbv 125mg et 250mg

➤ **Curam** (amoxicilline + Acide clavulanique) :

- Adulte et enfant de plus de 40 kg : 1 g d'amoxicilline (soit 2 cp à 500 mg/62,5 mg ou 1 sachet à 1 g/125 mg), 2 ou 3 fois par jour.
- Nourrisson et enfant de moins de 40 kg : 80 mg/kg/jr répartis en 3 prises.

Curam 1g sachet : 1 scht x 2/jr

Fleming (amox + AC) **500mg cp** : 2 cp x 2 / jr

Ery 125mg, 250mg, 500mg

Erythromycine : 50mg/kg/jr en 2 ou 3 prises

Azythromicine : contre les IST : 50mg/kg/jr en une prise uniquement en Per os.

Ticasse BD200/28mg sp – ticasse 1000mg cp

Biodroxil 1000mg cp

Bibactin sp

Cedrox (cefadroxil) 250mg sp , 500mg gel

Fuclo 500mg gélule susbv 250mg

Oxapen (oxacilline) 250mg susbv Fl 60ml, inj

Bactrim forte cp, sp

Co-amoxiclav sp 100mg/12.5ml sp

Mediclave 100mg/12.5ml sp

Cephalosporine

Infections : ORL, Pneumonie, infections urinaire, Bronchite, Fièvre typhoïde

Cefixime (Cefaloral, ofiken , Fixxe, brufix, Solexim susp, **Megacef**, indofix, Fixim), cp 100mg (2- 12 ans) et **200mg** : 1cp ×2/j, susp 50mg, 40mg/5ml et 100mg/5ml

➤ **Megacef**

- **200 mg** : 1 gel x 2 / jr,
- **40 mg** : une prise matin et soir,
- **100 mg** : 1 prise matin et soir.

Fixxe 200 mg : 1 cp x 2 / jr pdt 10 jrs en Per Os (2 boîtes)

Céfixime : Oroken (8 mg/kg/jr en per os).

Ceftriaxone inj boîte de 1g

➤ **Ceftriaxone** : 50- 100 mg/kg/jr en une fois

- *Présentation* : 250mg, 500mg et 1 g.
- *Préparation* : Diluer la poudre dans 4ml d'eau pour obtenir 4,5ml de Ceftriaxone dosée à 1g.

➤ **Mesporin inj 1000 IV/IM** : 1 à 2g une fois par jour toutes les 24 heures. (*Not suitable for children under the age of 12 years old*)

- *Indication* :
 - *Infection de l'appareil respiratoire ; pneumonies, ORL ;*
 - *Infections abdominales (péritonite, infections des voies biliaires et du tractus gastro-intestinal) ;*
 - *Infections des reins et des voies urinaires ;*
 - *Infections des organes génitaux, blennorragie incluse ;*
 - *Septicémie ;*
 - *Infections des os, des articulations, des tissus mous, de la peau et des plaies ;*
 - *Méningite.*

Rocephine injectable 1g (IM)

Cedrox (cefadroxil) 250mg sp , 500mg gel

Macrolide

Infections : Infections aiguë et chroniques, sinusite, amygdalite (angines) pneumonie uretrite, chlamydia T.

Azythromicine 500mg, 250mg cp ,200mg Fl 5ml, 15ml ,sch 100mg, 200mg (*contre les IST*) : 50mg/kg/jr en une prise uniquement en Per os.

Yokoli's Mother Believed that Life's About Serving Others.

Publish by : Together , we'll be strong.

Azient (Azithro) 500mg cp : 1 cp/jr

Erythromycine 125mg, 250mg, 500mg : 50mg/kg/jr en 2 ou 3 prises

➤ **Macromax cp** (Bronchite aigue, Pharyngite aigue)

- **Adulte** : 1 cp / jr pdt 3 jrs

- **Enfant** : 20 mg/Kg/jr pdt 3 jrs

✓ **Urétrites et Cervicites non compliquées** : 2 cp en P.U

Clarithromycine 500mg cp BT/10

Oxiclor 500mg cp

Apexine (Azithro) 200 mg/5ml sp

Unizitro 200 mg/5ml sp

➤ **Métronidazole 500 mg** :

- *Enfants* : 30 mg/kg une fois par jr pdt 3 jrs

- *Adultes* : 2 g une fois par jr pdt 3 jrs

Quinolone

Boncipro cp 500 mg : 1 cp x 2 / jr. (Utilisé pour traiter les infections bactériennes telles que la pneumonie, l'anthrax, la syphilis, la gonorrhée, la bronchite, la gastro-entérite et la peste).

Oflacine perf

Oflocet 200mg cp, injectable 1,5mg/dose (OR, otite)

Ofloxacin (Oflocet, Oflocine, Ofloxac) 200mg cp

Ciprofloxacine (cipronat, Ciprolon, Ciprox) 500mg ,250mg cp

Levofloxacin 500mg, 250mg cp

Pyrantel 200mg cp

Autres

LEVOSTAL-750 mg

<u>Indication</u>	<u>Régime de dose journalière</u> (Selon la gravité)	<u>Durée du traitement</u>
Sinusite bactérienne aigue	750 mg une fois par jour	5 jours
Pneumonie nosocomiale	750 mg une fois par jour	7 à 10 jours
Infection des voies urinaires y compris la pyélonéphrite	750 mg une fois par jour	5 jours
Pneumonie acquise dans la communauté	750 mg une fois par jour	5 jours
Infections de la peau et des tissus mous	250 mg une fois par jour	7 à 14 jours
NB : Ne pas utiliser chez : - les femmes qui allaitent, Pendant la grossesse, enfant de moins de 18 ans, patient atteints d'épilepsie.		

Métronidazole 250 mg et 500 mg, cp pelliculé : Réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de 6 ans.

➤ **Métronidazole 500 mg.**

❖ La posologie usuelle est :

- Chez l'adulte : de 0,750 g/jour à 2 g/jour
- Chez l'enfant : 500 mg/jour à 20-40 mg/kg/jour.

❖ Fréquence d'administration :

1 à 3 fois par jour, selon les indications.

Vagiwash solution : 1 bain / jr

Clavin cp : 1 cp x 2 / jr

Cimetidine injectable : En cas de crise d'ulcère

Gaspral inj ou omeprazol injectable : En cas de crise d'ulcère

Normix cp : 2 cp x 2 / jr pdt 6 jrs (2 boîtes)

Candid crème : 1 appl x 3 / jr

Fluoxine cp 500 mg :

Floxapen gel 500 mg : (Infections légères à modérées) : 1 à 3 g répartie en 3 à 4 prises.

Promongyl comprimé : 1 cp x 2/jr (En cas de syndrome infectieux)

➤ **Bactrim** : 40mg/kg/jr en 2 prises en per os. *Ne se donne qu'à partir de 7 ans.*

20 mesures dosées à : Sulfamethazole 200 mg + Trimethoprim 40 mg : 40 mg/kg/jr (1 mes/5 kg/jr) en 2 prises. Maximum 8 mes/jr.

- Sirop enfant et NRS : 240 mg
- 6 semaines- 5 mois : 1 cam 2x/jr
- 6 mois- 5 ans : ½ cam 2x/jr
- 6 ans- 12 ans : 2 cam 2x/jr
- Cp (Enfant plus de 12 ans et adulte) : 400 mg.

Ziclav : (Infections bactériennes, cutanées, des voies urinaires, des voies respiratoires inférieures, otite moyenne, sinusite, et d'autres conditions).

➤ **Flagyl** : 25 mg/kg/jr, Suspension buvable, 5ml = 125mg.

Flagyl sirop 250 mg :

- Chez l'adulte : de 0,5 g/jr à 1,5 g/jr
- Chez l'enfant : 20 à 40 mg/kg/jr

Flagyl 500 mg cp : 1 cp x 2 / jr

➤ **Keforal** :

- Suspension buvable de 250 mg : 1 cam 3x/jr
- Suspension buvable de 500 mg : 1 cam 2x/jr

➤ **Extencilline** : Une seule injection en Intramusculaire (IM).

- Amp 0,6 MUI si poids inférieur à 27 kg.
- Amp 1,2 MUI si poids supérieur à 27 kg.

➤ **Oroken** : 80 mg/kg/jr , Sirop (Doses/poids) 2x/jr

- 6 mois- 30 mois : Sirop 400 mg
- 30 mois- 12 ans : Sirop 100 mg

➤ **Oroken 200 mg cp** : 1 cp x 2 / jr pdt 8 jrs (2 boîtes)

➤ **Ofiken 100 mg suspension** : 8 mg par kilo et par jour, en deux prises, à 12 heures d'intervalle. (*For children of 30 months to 12 years old*).

➤ **Ofiken 200 mg cp** : 1 cp x 2 / jr (*Not suitable for children under the age of 12 years old*)

➤ **Ospen** : 50 mg/kg/jr en 2- 3 prises en dehors des repas pdt 7- 10 jours.

- Sirop : 250000 UI- 400000 (0,25 MUI- 0,4 MUI) : 2 flc
- Cp : 1 MUI (2 btes)

➤ **Josacine** : 30- 50 mg/kg/jr en 2 prises 1h avant les repas pdt 7- 10 jrs.

- Sirop à 250- 500 mg en pipette dose poids (2 flacons)
- Comprimé à 500 mg (2 btes)

Amoxicilline – Acide Clavulanique : 80mg /kg/jr en 2 prises.

Metronyl 500 mg : 1 cp x 2 / jr

Fixime 100 mg sirop :kilo pds x 2 / jr

Solexim :

Fucloxacine 200mg sirop :

Benzathine injectable (**Retarpen**) :

Bactox :

Bristopen :

Pharpen :

Doxy 200 mg : 1 cp / jr pdt 3 jrs. (*Not suitable for children under the age of 12 years old*).

Doxy 100 mg : 1 cp x 2 / jr pdt 3 jrs. (*Not suitable for children under the age of 12 years old*).

Rollicin : *contre les IST*

Ciprofloxacin 400mg / 200mg :

Rovamycin (**En cas de rougeole**)

Dakin : pour stérilisé et/ou panser une plaie

Eosine aqueuse :

Solubacter :

Septigel solution : 1 bain x 2/jr

Cyteal : 1 bain x 2/jr

HEMATOLOGIE (étudie le sang) - **ANTIANEMIQUE** (lutte contre l'anémie) -
VITAMINE (substances organiques sans valeur énergétique mais essentielles à l'organisme).

ANÉMIE

Signes Cliniques : pâleur des conjonctives, muqueuses, paumes des mains et plantes des pieds ;
Asthenie, vertiges, dyspnée, tachycardi.

Gravité : sueur, soif, extrémités froides, œdème des membres inférieurs, état de choc.

➤ **Tonifer sirop** : (5 ml de sirop contient 40 mg de fer (fe) :

Traitement curatif : A prendre en dehors des repas.

- Adultes et enfants, poids supérieure à 30 kg : 100 à 200 mg de Fer par jour, répartis en 2 prises,
- Enfants de 20 à 30 kg : 100 à 150 mg de Fer par jour, répartis en 2 prises,
- Enfants, poids inférieure à 20 kg : 3 à 6 mg de Fer/kg/jr, repartis en 2 prises.

□ **Traitement préventif** : Adulte (60 mg de Fer par jour repartis en 2 prises)

NB : **Tonifer sirop** n'est pas recommandé au cours du premier semestre de grossesse, sauf avis médical contraire.

➤ **Ferat-Une sirop 100 ml** : (Traitement de l'anémie due à une carence en fer)

- **Adultes** : 10 à 20 ml / jr
- **Enfants âgés de 1 à 14 ans** : 5 à 10 ml / jr

➤ **Hemafer fol comprimé** :

□ **Prévention ou traitement de la carence en fer pendant** :

- **La grossesse** : 1 cp / jr en per os pdt 30 jrs
- **Allaitement** : 1 cp / jr en per os pdt 30 jrs

➤ **Hemafer injectable** : Taux d'hémoglobine inférieur à 9 g/dl.

Adultes : 200 mg soit 2 ampoules à J1 puis 100 mg soit 1 ampoule de J2 à J4. Faire le relais avec Hemafer fol comprimé.

La quantité totale utile à calculer selon la formule est : $Q \text{ (mg)} = \text{Poids (Kg)} \times (\text{THb normal} - \text{THb existant}) \times 2,4 + 500 \text{ mg}$. **NB** : Hemafer injectable doit être uniquement administrer en intramusculaire.

➤ **Stimol ampoule ou sachet** : (Dans les états de fatigue passagers).

- **Adulte** : 3 ampoules ou sachets par jour
- **Enfant de plus de 6 ans** : 2 ampoules ou sachets par jour.

Finanemi sirop : 10 ml / jr

➤ **Astymine sirop :**

- **Adulte et enfant de plus de 12 ans :** 25 gouttes par jour
- **Enfant de 4 à 12 ans :** 20 gouttes par jour
- **Enfant de 1 à 3 ans :** 15 gouttes par jour.

Escodyne cp eff : 1 cp / Jr. (Not suitable for children under the age of 12 years old).

Revital gélule : 1 gel/j

Rinomicine pdre susp buv : 1 scht x 3/jr (Etats grippaux, Rhume, Fièvre, Ecoulement nasal, Courbature, Refroidissement)

UPSA - C eff : 1 cp / jr

Magnes direct 400 mg B/30 : 1 stick / jr pdt 30 jrs.

Vitamine B12 Sirop : 5 ml x 3 / jr

Dynamisan AB

APPÉTIT (FENUGREC- VZ ,Desyrel) sp

C-cal scht : 1 scht / jr

Biofar vitC

Berocca cp eff

Surmenalit cp : 1 cp x 2 / jr

Astyfer sirop : x 2 / jr

Feramalt sirop : ... x 2 /jr

Orofer :

Solfer :

Vitfer :

Fedate sirop :ml x 2 / jr

Acfol (Acide folique) 5 mg cp : 1 à 3 cp × 2 / jr

Hb plus sp FL/150ml

Richfer sp FL/200ml , gélule B/30

Ferox sp ,gélule B/30

Amifer sp FL/200ml

Agifer sp – cp

Ferrostrane susp FL/200ml

Orofer sp,gélule B/40

Ranferon sp , gel B/30

Ferplex sp B/10 fl 15ml

Fedate sp ,gélule

Chocofer sp

Haem - up sp, gélule B/30

Fervital sp 100ml et 200ml

➤ **Vitafer sirop** : ...ml x 2 / jr

- Adulte et enfant de plus de 30 kg (environ 10 ans) : 3 à 6 cuillères à café de sirop par jour ou 1 à 2 Gélules par jour.
- Femme enceinte : 1 ou 2 cuillères / Gélule à café de sirop ou une Gélule par jour à partir du 4^{eme} mois de la grossesse (sur prescription médicale).
- Enfant de 20 à 30 kg (environ 6 à 10 ans) : 4 à 5 cuillères à café de sirop par jour ou 1 à 2 Gélules par jour.
- Enfant de 12 à 20 kg (environ 30 mois à 6 ans) : 3 à 4 cuillères à café de sirop par jour.
- Nourrisson de 8 à 12 kg (environ 6 à 30 mois) : 2 à 3 cuillères à café de sirop par jour.
- Nourrisson de 5 à 8 kg (environ 1 à 6 mois) : 1 à 2 cuillères à café de sirop par jour.

➤ **Feramalt sp, gélule B/20 100mg**

- Enfant de 0 à 2 ans : 2 ml/j
- Enfant de 2 à 6 ans : 2,5 ml/j
- Enfant de 6 à 12 ans : 5 ml/j

➤ **Tot'hema AB**

- 6 à 15 ans : 1 amp ×2/jr
- 15 ans et plus : 1 amp ×3/jr

➤ **Polyvita-M**

- Enfant : 5 ml/jr
- Adulte : 10 ml/jr

Tres-orix gel, sp :

➤ **Appetine sirop :**

- **Adulte** : 10 ml, 3 à 4 fois par jour.
- **Enfant** : 2,5 ou 5 ml, 3 fois par jour

➤ **Apetil sirop :**

- Adulte : 10 ml, 3 à 4 fois par jour.
- Enfant : 2,5 ou 5 ml, 3 fois par jour

Appitor :

Nuravit sirop : 10 ml x 3 / jr

Très orix :

Vitaplex :

Festiv :

HYPOMAGNESEMIE

L'hypomagnésémie est liée à une diminution de l'apport en cas de dénutrition ou un trouble de consommation d'alcool de long terme. La diminution de la prise orale est souvent aggravée par une augmentation de l'excrétion urinaire exacerbée par l'utilisation de diurétiques, qui augmentent l'excrétion urinaire du magnésium.

L'hypomagnésémie correspondant aussi à une concentration sérique de magnésium $< 1,8 \text{ mg/dL}$ ($< 0,70 \text{ mmol/L}$). Les causes comprennent un apport et une absorption en magnésium inadéquats ou une excrétion accrue due à une hypercalcémie ou à des médicaments tels que le **furosémide**. Les signes cliniques sont souvent dus à une hypokaliémie associée et à une hypocalcémie et comprennent une léthargie, des tremblements, une tétanie, des convulsions et des troubles du rythme. Le traitement repose sur un apport de magnésium.

Signes de carence : Crampes, contractures, Engourdissement, Fatigue, vertiges.

Mag 2 : 1 amp x 2 ou 3 / jr en Per Os.

Magnoral AB : 1 amp $\times$ 3/jr

Forticol amp buv : 1 amp x 2 / jr. (Not suitable for children under the age of 15 years old, HTA)

Trofocard sachet :

Actimag sp

Maximag AB

Uvimag B6

Magne B6 –AB cp

Crossonc sp

Calcibronat 2g cp eff

Calcium –sandoz 500g eff

Vita – c1000

Juvamine cp – eff

Nuravit sirop (eff)

Astymin gte

Bio - Ritmo AB

NAUSÉE ET VOMISSEMENTS

Les **nausées** correspondent à une sensation désagréable au niveau de l'estomac et de la gorge d'envie de vomir, tandis que les **vomissements** se définissent comme les rejets du contenu de l'estomac par la bouche.

Metoclopramide (Vogalène). Formule : 0,5 à 1mg/kg/j

POIDS	Dose journalière	Ampoule à 10mg
< 10kg soit 0 à 11 mois	1mg × 2	0,2ml
10 à 14 kg , 1 à 3 ans	1mg × 2 ou 3	0,2ml
15kg à 19kg , 3 à 5 ans	2mg × 2 ou 3	0,4ml
20 à 29 kg , 5 à 9 ans	2,5mg × 3	0,5ml
30kg et plus 9 à 14 ans	5mg × 3	1ml

➤ **Vogalène :**

- **Vogalène suppositoire :**

- *Adulte* : 3 à 6 suppo par jour, à répartir en 3 prises,
- *Enfant de 6 à 12 ans* : ½ à 1 suppo, 3 fois par jour,
- *Enfant de moins de 6 ans* : 1 suppo par 5 kg de poids par jour, à répartir en 3 prises. Soit, par exemple pour un enfant de 8 kg : ½ suppo, 3 fois par jour.

- **Vogalène injectable :**

- La dose maximale recommandée est de 10 à 20 mg/jour. Généralement administrée en IM, sera répartie en 1 à 2 prises par jour, soit 1 ampoule de 10 mg par injection, 1 ou 2 fois par jour.

Nosic comprimé 10 mg : 2 cp / jr

➤ **Nausolvit junior 20 ml gouttes :**

- *De 6 mois à 1 an* : 2 gouttes / kg en prise unique
- *De 1 à 3 ans* : 10 gouttes x 3 / jr
- *De 3 à 6 ans* : 15 gouttes x 3 / jr
- *De 6 à 12 ans* : 20 gouttes x 3 / jr

➤ **Dislep 25 mg injectable** : (Not suitable for Pregnancy and breastfeeding period)

- **Adultes** : 1 ampoule (IM ou IVDL) 2 à 3 fois par jour.

➤ **Dislep 25 mg cp** : 1 cp x 3 / jr

Motilium sirop : Dose / poids 3x/jr, 4 heures avant le repas

Primperan : 0,1 cc/kg en injection si vomissements incessants avec ou sans déshydratation.

Afridom :

Domperidone : La dose est limitée à 10 mg jusqu'à 3 fois par jour, avec une dose maximale de 30 mg par jour. NB : La durée de traitement doit être la plus courte possible.

DEPARASITANT (lutte contre les parasites)

➤ **Albendazole 400 mg** :

- **Enfant de moins de 1 an** : *ne rien donnez.*
- Enfant de 1 à 2 ans : 200mg.
- Enfant de plus de 2 ans : 400mg.

➤ **Fluvermal comprimé** : 1 cp x 2 / jr en Per Os pdt 3 jrs.

➤ **Fluvermal suspension** : 5 ml x 2 / jr en Per Os pdt 3 jrs.

Pyrantel (Helmintox sp, Wormin 500mg et 250mg cp)

Albendazol (Alben, **Nover-une**, Saniver ,ABZ, **verex**, verzol, Albentox B/3) cp 400mg

Susp: (Albentox, Mezol, ABZ, Zentel) 5ml/jr ,sp

Mebendazole (Carben ,Vermox, Meben-GH) cp 500mg ,susp

Afrizole :

Zerover :

STOMATOLOGIE (étudie et traite les maladies de la bouche et des dents)



Eludril pro : bain de bouche


Amoxicilline 500mg gélule

Metronidazole 500mg

Metamizole (Metaren, Novalgin) 500mg cp

PERTE BLANCHE

Les pertes blanches, de leur nom scientifique **leucorrhées**, sont des sécrétions de couleur blanche à translucide.



Ecorex : 1 ovule / jr pdt 6 jrs au coucher


Gynomax :

Ovumix :

Gynocare :

RÉTENTION URINAIRE

La **rétention urinaire** se définit par une incapacité à vider totalement ou partiellement la vessie. La rétention urinaire signifie que vous êtes incapable de commencer à uriner, ou que vous êtes incapable de vider complètement votre vessie lorsque vous arrivez à commencer à uriner.



Oxytroy : 1 amp / jr

Xatral :

Prostanel :

DOULEUR ABDOMINALE

Douleurs situées dans la partie inférieure de l'**abdomen** proviennent de troubles touchant la partie inférieure du côlon et certains organes de l'appareil génito-urinaire.

Visceragine :

Spasfon :

Buscopan :

QUELQUES ANTIPALUDÉENS

Les antipaludéens, appelé également **antipaludiques**, sont des médicaments employés pour prévenir, à court terme, et pour traiter le **paludisme**.

Les 5 principaux signes du **paludisme simple** : Fièvre, céphalée, vomissement, douleurs abdominales, courbatures.

- Splénomégalie (rate) = infections
- Hépatomégalie (foi) = Anémie
- langue saburrale = suspicion de Fièvre typhoïde
- **ARTEMETHER inj** : pds $\times 3,2 / 80$ ou pds $\times 4$
- **NOVALGIN inj** : 30 à 60 mg / kg / j ou pds $\times 0,03$

Signes: Paludisme grave : anémie sévère Hb < 5 ou 7 g/dl, coma, convulsions, délire, trouble de la conscience, prostration, ictère, méningite, obnubilation, choc, urine foncé.

Artémether / Lumefantrine : (Artefan, bimalaril, paluva, Laritem, Acure, PLufentrine, Palumax, Artrine, Lumiter, Cofantrine, Coartem) 20/120, 40/240, 60/360, 80/480.

➤ **Artefan comprimé 20/120 mg :**

- 5 à 9 kg : 1 cp / jr pdt 3 jr en Per Os.
- 10 à 14 kg : 1 cp x 2 / jr pdt 3 jr en Per Os.
- 15 à 24 kg : 2 cp x 2 / jr pdt 3 jr en Per Os.
- 25 à 34 kg : 3 cp x 2 / jr pdt 3 jr en Per Os.
- Supérieur à 35 kg : 4 cp x 2 / jr pdt 3 jr en Per Os.

➤ **Paludose :**

- Enfants : 5 ml x 3 / jr
- Adultes : 10 ml x 3 / jr

Asu-Denk : 1 cp / jr pdt 3 jrs

Formule voie orale

- Artémether : 4mg/kg/j
- Lumefantrine : 24mg/kg/j

ARTEMETHER / LUMEFANTRINE SUSPENSION

Artefan et Bimalaril :

- susp nourrisson (5 - 14 kg) : 5 ml $\times 2$ / Jr
- susp enfant (15 – 24 kg) : 5 ml $\times 2$ / Jr
- susp adolescent (25-34 kg) : 5 ml $\times 2$ / Jr
- susp adulte (Artefan seul) : 5 ml $\times 2$ / Jr

Yokoli's Mother Believed that Life's About Serving Others.

Publish by : Together , we'll be strong.

ANTI-DIARRHEIQUES (qui lutte contre la diarrhée)

SRO + Zinc = 1 sachet pour 1 litre d'eau/24h (utiliser en 24 heures : Renouveler si besoin).

➤ **Smecta** : sachet.

- 1 sachet : moins de 1 an
- 2 sachets : 1- 2 ans
- 3 sachets : 2 ans et plus.

Métronidazole 500 mg cp (Flagyl, Metronyl, Metrol, Metro-GH, Nidazole, Amibazol)

: 1 cp x 2 ou 3 / jr (Adulte)

► **Tiorfan :**

- *Sachet 10 mg* : 1- 9 mois : 1 sachet x 3/jr
: 9- 30 mois : 2 sachets x 3 /jr
- *Sachet 30 mg* : 30 mois- 9 ans : 1 sachet 3 x / jr
: Plus de 9 ans : 2 sachets 3 x / jr

Entamizole (Metro + ATB) 500mg, 250mg cp et susp

Loperamide gel 2 mg (Imodium, revodium) gélule, diarrhée persistante 1ère prise 2cp et 1cp/p

Metéoxane gélule : 2 gel x 3/jr

Normix cp : 2 cp x 2 / jr pdt 6 jrs (2 boîtes)

Oroken cp 200 mg : 1 cp x 2 / jr pdt 8 jrs (2 boîtes)

Diarum cp 2mg

Apazide (nifuroxazide) 200mg cp, susbv 4%

Tiorfan (racecadotril) 100mg gélule, susbv 30mg enft, scht 10mg nourrisson

ULCÈRE

Un ulcère est **une plaie** de la peau, des yeux ou d'une muqueuse, accompagnée d'une désintégration du tissu. Plus précisément, il s'agit d'une érosion (discontinuité macroscopique) de l'épithélium normal. Les causes d'un ulcère peuvent être endogènes (stress, cancer, insuffisance veineuse, ...) et/ou exogènes (actions bactériologique, mécanique, chimique...).



Pyrosis : brûlures d'estomac

Causes : alcool, alimentation trop grasse, trop riche, hernie hiatale (chirurgie)

Maalox sachet : 1 scht x 2 / jr pdt 10 jrs en Per Os.

Gaviscon sachet : 1 scht x 3 / jr pdt 10 jrs en Per Os.

Gastromag 200 ml sp : 10 ml x 2/ jr

Pantoprazole : 1 cp / jr

Ulcar 1 g sachet : 1 scht x 4 / jr

➤ **Gastricid** : 1 cp / jr. **NB** : A partir de 16 ans. Ne pas dépasser 2 cp / jr. Ne pas dépasser 2 semaines de traitement.

Almax forte sachet : 1 scht x 3 / jr

Rabeprazol (Rabetok, Rabezol, Rabeloc) 20 mg cp: 1 cp au coucher

Omeprazole (Gaspral, Dafrazol) 10mg et 20mg gélule (RGO et UGD) : 1 gel/jr (2 à 8 semaines)

Omeprazole 20mg gélule : 1 gel / jr (2 à 8 semaines)

Rabetock cp : 1 cp x 2 / jr

Clamoxyl 500 mg gel : 2 gel x 2 / jr pdt 6 jrs

Inéxium :

Eucarbon :

Mopral :

Belmazol :

Yokoli's Mother Believed that Life's About Serving Others.

Publish by : Together , we'll be strong.

Bedelix sachet :

Dafrazole :

Ulcizone , Relcer :

Viscid 200 ml sachet :

OPHTAMOLOGIE : *Médecine concernée par le diagnostic et le traitement des troubles de l'œil.*



Collyre : 1 gtte × 6 le 1er jour et 1 gtte × 4/jr pdt 15 jrs

Pommade : 1 appl 1 à 2 fois par jr au coucher Conjonctivites : lavage + collyre + pommade.

Travatan collyre : 1 gtte / jr le soir

Brimo goutte : 1 gtte x 2 / jr

Gentamicine :

Acide fusidique :

Chibro cadron :

Candid crème : 1 appl x 3 / jr

Collyres Antibiotiques

Tobrex (ATB) collyre 5ml + pde

Rifamycine (ATB) collyre 10ml + pde

Gentalline (ATB) collyre sol 10ml, 5ml pde

Chibroxine (ATB) collyre

Ciloxan (ATB) collyre 5ml

Anti inflammatoire et bacterien

Ophtacine collyre

Fradikex collyre pde

Maxidrol collyre 3ml + pde

Correctol 0.1% collyre

Chibro-cardron collyre

Pentolate 1% collyre

Cébémeycine pde

Chalazion : Inflammation sur la corner : **Frakidex collyre** ou tobradex ou Maxidrol ou Chibrocadron

Frakidex collyre : 2 gttes x 2 / jr

Frakidex pommade : 1 appl / jr au coucher

Cicatrisants : Corneregel gel 10g

Anti allergique : Almide collyre, Cromoptic collyre, Opticron, Cromsol

Anti inflammatoire : Indocollyre, Indosol, Dicloce


Antiseptique : Desomedine, Dacrine, Vitabact

JAMBRE LOURDES

Les jambes lourdes peuvent faire partie de ce qu'on appelle l'insuffisance veineuse et sont très fréquentes chez la femme qui se plaint de gonflement, lourdeurs et varices. Les symptômes augmentent avec l'âge.

Les varices sont des dilatations des veines qui apparaissent le long des jambes et qui vous donnent des lourdeurs, des crampes ou des fourmillements.


Les troubles veineux sont inconfortables, parfois inesthétiques mais leur gravité vient du fait qu'ils peuvent se compliquer de phlébites.



Veinobiase = daflon = cyclo 3 fort

Daflon 1000 mg cp : 1 cp x 3 /jr

HÉMORROÏDES : Veines gonflées dans la partie inférieure du rectum et de l'anus.



Titanoreine suppo : 1 suppo x 2 / jr pdt 10 jr

Pyliron suppo : 1supp x 2 / jrs

Sedorrhoid crème : 2 ou 3 suppositoires par jour (Voie Rectale). **NB** : *Le traitement doit être de courte durée, maximum 7 jours.*

VERTIGE

Tanganil cp 500 mg : 1 cp x 2 ou 3 / jr.

Tanakan comprimé : 1 cp x 3 / jr dans un demi-verre d'eau. (Réservé aux adultes et aux personnes âgées.)

ORL, ANTI-GRIPPE, ANTI-RHUMME

ORL : L'**otorhinolaryngologie** (littéralement « étude de l'oreille, du nez et du larynx ») représente une branche de la médecine spécialisée dans le diagnostic et le traitement des troubles du nez, de la gorge, de l' oreille, et de la région tête et cou. Le praticien est appelé **otorhinolaryngologiste**.

Anti-grippe : Médicament destiné à lutter contre la grippe.

Anti-rhumme : Médicament destiné à lutter contre le rhume.



Paidoterin sirop (*rhume, rhinite, sinusite, pharyngite...*)

	Enfants jusqu'à 1 an	Enfts de 1 à 6 ans	Enfts de 6 à 12 ans	Adultes
Dose par prise	½ à 1 càc	1 à 2 càc	2 à 3 càc	3 à 4 càc

Paidoterin sp 100 ml

0 à 1 an	1 à 6 ans	6 à 12 ans	Adulte
2,5 à 5ml ×3 / jr	5 à 10 ml ×3 / jr	10 à 15ml ×3 / jr	15 à 20 ml ×3 / jr

Gripex sachet : 1 scht x 3 / jr (en cas de rhume, nez bouché, maux de tête, fièvre)

Fervex : 1 scht x 3 /jr

Clavacin-Xr cp : 1 cp x 2 / jr

Drenoxol sirop : ...ml x 3 / jr

Yokoli's Mother Believed that Life's About Serving Others.

Publish by : Together , we'll be strong.

Maxigrip sachet : 1 scht / jr

➤ **Zithromax Comprimé** ou **Sirop** :

chez l'adulte : pour le traitement de certaines angines et des infections bucco-dentaires : 2 comprimés en une seule prise par jour pendant 3 jours ; pour le traitement des bronchites : 2 comprimés en une seule prise le 1^{er} jour, puis 1 comprimé par jour les 4 jours suivants.

➤ **Exomuc sachet** : Ce médicament fluidifie les sécrétions (mucosités) présentes dans les bronches. Il facilite leur évacuation par la toux. Il est utilisé en cas de toux grasse avec difficulté à cracher, notamment au cours des bronchites aiguës.

- Adulte : 1 scht x 3 /jr (600 mg)
- Enfant de 2 à 7 ans : 1 scht x 2 / jr (400 mg)

➤ **Exomuc 200 mg sachet** : 1 scht x 2 / jr

Maxilase cp : 1 cp x 2 /jr

Maxilase sp : ... x 3 / jr

Conghist sirop : 10 ml x 2 / jr

Voltafast 50 mg sachet : En général, en 2–3 prises; durée du traitement: max. 3 jrs. >18 ans

Leutrien 10 mg : 1 cp / jr pdt 29 jrs ou 4 semaines. (*Rhinite allergique, Asthme allergique*)

➤ **Flemming 1 g cp** : 1 cp x 2 / jr

NB : **Fleming 1000mg** est utilisé chez les adultes et les enfants pour traiter les infections suivantes : infections de l'oreille moyenne et des sinus, infections des voies respiratoires, infections des voies urinaires, infections de la peau et des tissus mous, y compris les infections dentaires, infections osseuses et articulaires.

Viscodril sirop : 5 ml x 3 / jr

➤ **Rinialer 10 mg cp** : 1 cp / jr au coucher.

NB : **Rinialer Comprimé** ; la posologie recommandée est de 10 mg une fois par jour, avec ou sans nourriture. Rinialer Solution buvable (Enfants âgés de 2 à 11 ans) : Enfants pesant 25 kg ou plus : 1 cuillerée à thé (5 ml) de solution buvable une fois par jour avec ou sans nourriture.

Bilaxten 20 mg (*for adults and adolescents 12 years of age and over*) : 1 cp / jr

Rinogrip sachet : 1 scht x 3 / jr

Febrilex junior 125 mg sp : 1 càc x 3 / jr.

Rinomicine pdre susp buv : 1 scht x 3 /jr (Etats grippaux, Rhume, Fièvre, Ecoulement nasal, Courbature, Refroidissement)

➤ **Litacold sirop**

- **De 0 à 28 jours** : 2.5ml x 3 / jr
- **De 1 an à 2 ans** : 5ml x 3 / jr
- **Plus de 2 ans** : 10ml x 3 / jr

Respibien goutte nasale : 1 pul x 3 / jr

Vibrocil goutte sol puv : 1 gtte x 3 /jr

Rhinoparol cp B/20 : 1cp×3/j

Neutrocold sp, cp : 2 cp × 2 / jr

Trifed Plus cp : 1 cp × 3 / jr

➤ **Ventésyl sirop** : (Toux grasse et sèche, rhume, asthme)

- Enfant : 5ml × 3 / jr
- Adulte : 10ml × 3 / jr.

LARYNGITE : (entre la langue et l'œsophage)

Traitement : Retarpen injectable 1 ampoule, Dexaméthasone injectable 2 ampoules.

Drill pastille : Sucer lentement les pastilles sans les croquer et à distance des repas. Espacées les prises au moins de 2 heures. Ne pas dépasser plus de 5 jours de Traitement.

Isofra (framycétine) sol pulvérisation : rhume et rhinopharyngite : 1 pul × 2 / jr

- **Coquelucedal suppo** : *Ce médicament est utilisé comme traitement d'appoint des affections bronchiques aiguës bénignes chez le nourrisson jusqu'à 30 mois.*

Posologie : 1 à 2 suppositoires par jour.

Durée du traitement : La durée du traitement doit être la plus courte possible en raison des risques de toxicité locale.

Mode d'administration : Voie rectale. Réservé au nourrisson jusqu'à 30 mois

Medicold sp + cp

Carbotoux :

Dextrométhorphan sirop :

Sekissan :

Caltoux :

Grippal :

Humex :

Sikrol :

Clarix :

Ventesyl :

Terpone :

Carbocysteine :

Ascoril :

Afine en cas de pneumonie :

Fludol sp , 300mg plqtte/10

kold stop cp B 10

Febrex plus cp B10 ,sp

Z-cold junior enft sp ,cp B4

Rapidex susp

Otrivine sol pul : 2 gttes x 3 / jr

Sterimar BB sol pulvérisation

Humex Rhume cp : 1 cp x 3 / jr

Vitamine c (cac100, C-cal)

Xino acino 0.05% :

soframycine :

PNEUMOLOGIE / ANTITUSSIF

La **pneumologie** est le domaine médical qui concerne les **maladies du poumon** et plus largement les maladies respiratoires. Les poumons sont des organes vitaux qui permettent l'oxygénation du sang. Le poumon droit est constitué de trois lobes alors que le poumon gauche ne compte que deux lobes.

Antitussif : Médicament utilisé pour prévenir ou soulager une toux.



- **Ventésyl sp** : (Toux grasse et sèche, rhume, asthme).
 - *Enfant* : 5ml × 3 / jr
 - *Adulte* : 10ml × 3 / jr.
- **Neo-codion Comprimé ou Sirop** :
 - 1 comprimé par prise, à renouveler au bout de 6 heures en cas de besoin, sans dépasser 4 comprimés par jour.
 - Sirop : deux fois par jour

Clavacin-Xr cp : 1 cp x 2 / jr

- **Rhinathiol sp** (Toux sèche)

❖ **Adulte** (250 mg, 200ml) : 3 ou 4 cuillères à soupe par jour

❖ **Enfant** (125 ml) :

- De 24 à 30 mois : 3 ou 4 cuillères-mesure par jour
- De 30 mois à 12 ans : 4 ou 6 cuillères-mesure par jour
- De 12 à 15 ans : 6 à 9 cuillères-mesure par jour

Sekisan sirop : ... ml x 3 / jr

Humex rhume : 1 cp x 3 / jr

Rinomicine pdre susp buv : 1 scht x 3/jr (Etats grippaux, Rhume, Fièvre, Ecoulement nasal, Courbature, Refroidissement)

➤ **Broncoxil sirop :**

- **Enfant** : 5 ml x 3/jr
- **Adulte** : 10 ml x 3/jr

➤ **Mucodrenol sirop :**

- Enfants de 1 à 2 ans : 2,5 ml x 2 /jr
- Enfants de 2 à 6 ans : 2,5 ml x 3 /jr
- Enfants de 6 à 12 ans : 5 ml, 2 à 3 fois par jour
- Adultes et enfants de plus de 12 ans : 10 ml x 2 /jr

Carbotoux 2% sp 125ml

Caltoux sirop enfant et adulte :

Sekrol sp 15mg et 30mg toux grasse

Tuspel p sp grasse

Tuspress sp toux sèche

Theralene sp 0.05% 150ml

Clamoxyl susp 500mg/5ml ,250mg, 125mg

Toplexil sp Fl/ 150ml

Dimetane sp

Tussidane susp

HYPERTENSION ARTERIELLE

L'hypertension est une pression artérielle élevée. La pression artérielle est la force du sang qui pousse contre les parois des artères lorsqu'il les traverse. Les artères sont les vaisseaux sanguins qui transportent le sang oxygéné du cœur vers les tissus du corps.

Signes : céphalées, vertiges, vomissement, mouches volantes, bourdonnement d'oreille



Captopril Denk 25 mg cp : 1 cp en sublingual puis 1 cp à prendre si la TA ne diminue pas. Faire le relais avec **Captopril Denk 50/25 mg** : 1 à 2 cp / jr. (*Not suitable for Diabétique*)

Cadurine comprimé : 1 Cp / jr (*Not suitable for Diabétique*)

Cotareg 160 mg : 1 cp / jr

Tritazide 5/12.5 mg : 1cp / jr pdt 30 jrs

Exforge cp 5/80 mg B/28 : 1 cp / jr

Natrixam cp : 1 cp / jr

Tensionorme cp B/24 : 1 cp / jr.

Hyzaar cp : 1 cp /jr

Inditor SR 1,5 mg :

Aprofort 300 mg/10 mg : 1 cp / jr.

➤ **Furosemide (Lasilix comprimé 40mg, 20mg)** :

- **Lasilix cp** : 1 à 2 mg / kg de poids corporel, répartie en 1 à 2 prises. 2 à 3 comprimés par jour ou 3 à 4 cp / jr en 2 prises.

➤ **Furosemide (Lasilix injectable)** :

- **Lasilix injectable** :

- **Adultes** : 2 à 3 ampoules par jour par voie IM ou IVDL
- **Enfants et nourrissons** : (IV = 0,5 à 1 mg / kg / jr)

Ramithiazide cp 10mg/12.5mg, 10mg/25mg, 5mg/12.5mg : 1cp/jr pdt 30 jr

Yokoli's Mother Believed that Life's About Serving Others.

Publish by : Together , we'll be strong.

Coversyl 5mg cp : 1cp/jr pdt 30jrs

Nicardipine (loxen) 10mg/10ml 2A: 2,5cc en IVD et 17,5cc dans le soluté G5%

Fludex cp 1.5mg

Cerebro cp rétablissement du liaison cerveau-organisme

Ramipril-GH (HTA , AVC ,IC)

HYPOTENSION ARTERIELLE

L'hypotension artérielle, communément appelée "**baisse de tension**" ou "**chute de tension**", désigne une baisse significative de la pression sanguine dans les artères.

Eptaminol : 1 Cp / jr

Florinef : 2 à 4 cp / jr en une prise vespérale

Dopamine injectable en IV

INSOMNIE

L'insomnie est un trouble du sommeil courant qui peut rendre difficile l'endormissement, difficile de rester endormi ou vous amener à vous réveiller trop tôt et à ne pas pouvoir vous rendormir.

Atarax 25mg cp : 1cp au coucher

Stilnox 10mg cp : 1cp au coucher

Valium 10mg cp

Polaramine 2mg

Allergy1 sp >2 ans

ALLERGOLOGIE - ANTIHISTAMINIQUE

Allergologie : La branche de la science médicale qui étudie les causes et le traitement des allergies.

Un antihistaminique est un médicament qui sert à réduire ou à éliminer les effets de l'histamine, qui, libérée en grande quantité par l'organisme a de nombreux effets inflammatoires en cas de réaction allergique. L'histamine est une molécule organique de la famille des amines biogènes.

Aerius sirop : ... ml /jr

Nosic Comprimé 10 mg : 2 cp le soir

Dexamethasone injectable :

➤ **Primalan comprimé** :

- **5 mg** : 1 cp x 2 / jr
- **10 mg** : 1 cp / jr

➤ **Primalan sirop** : (*Not suitable for children under the age of 2 years old.*)

- **Adultes et enfants de plus de 40 kg** : 8 cuillères-mesure de 2,5 ml par jour
- **Enfants de moins de 40 kg** : 1 cuillère-mesure de 2,5 ml par 5 kg de poids par jour.

Allergine 10 mg : Prise unique par 24 heures : (*Not suitable for children under the age of 11 years old.*)

❖ **Allergyl** :

- **Allergyl 25 mg** : Adultes : 25 mg une fois par jour au coucher pendant 7 à 10 jours maximum.
- **Allergyl sirop** : enfants âgés de 2 à 6 ans ; 5 mg (1 cuillère à thé) de sirop pris une fois par jour.

➤ **Quintana sirop** : La dose quotidienne en fonction du poids corporel *sera répartie en une ou deux prises par jour* :

- **En dessous de 40 kg** : une cuillère-mesure de 1,25 mg par 5 kg de poids.
- **Au-dessus de 40 kg** : 8 cuillères-mesure de 1,25 mg

• **Agiderm crème** : 1 appl x 2 / jr

• **Flustaph gélule** : 2 gel x 3 / jr

❖ **Ketomed crème** : 1 appl x 2 / jr

➤ **Griséofulvine** (*Antifongique*) 125 mg et 500 mg :

- **Comprimé** : 1 cp x 2/jr
- **Pommade** : 1 appl x 2/jr

Allercet cp : 1 cp / jr

Desloratadine cp 5mg, sp 150ml

Genset cp 10mg. Sp 60ml

Polaramine cp 2mg

Betastène 0,5mg gtte ,cp

Loratol sp 5ml/jr

ANTI ARYTHMIQUES

Les anti-arythmiques sont des médicaments utilisés pour supprimer les rythmes accélérés du cœur, appelés arythmies cardiaques, telles la fibrillation auriculaire, le flutter auriculaire, la tachycardie ventriculaire et la fibrillation ventriculaire.

Cardiocalm et **Tranquital** (gère les palpitations cardiaque et les troubles de sommeil) :

Cardiocalm :


Tranquital :

Digoxine :

Amiodarone :

HYPERCHOLESTÉROLÉMIE

Hypercholestérolémie. C'est aussi le précurseur des hormones stéroïdes et des acides biliaires. Comme le cholestérol est insoluble dans l'eau, il est transporté dans le plasma sanguin à l'intérieur de particules de protéines (lipoprotéines). Les lipoprotéines sont classées selon leur densité : lipoprotéines de très basse densité (VLDL), lipoprotéines de densité intermédiaire (IDL), ...



Atorex :

Tahor :

ANTIDIABETIQUE

Le but des antidiabétiques est d'équilibrer la glycémie mais aussi de diminuer l'incidence des complications du diabète, notamment les microangiopathies (rétinopathie diabétique, néphropathie diabétique, etc.). Dans le cas du diabète de type 2, l'un des objectifs est de diminuer le risque de survenue d'une maladie cardiovasculaire.

Signes : hyperglycémie, polyurie (uriner assez), polyphagie (Manger beaucoup), Amaigrissement, polydipsia (boire assez d'eau), Asthénie. Glycémie normale : (0,6-1,10 g/l)

Glyferon 850 mg cp -1000 mg cp. B/30 cp : 1 cp / j

Glucophage 500 mg cp (Metformin GH) : 1 cp × 2 / j

Gtide 60 mg : 1 cp / j

Ranophage OD

Amarel cp 1mg -2mg ,3mg et 4mg

Daonil

Glucor

Glymepiride :

Diamicron :

TROUBLE DIGESTIF / CONSTIPATION

Trouble digestif : Les facteurs favorisant une mauvaise digestion sont : la survenue d'une infection comme une gastro-entérite (le syndrome dyspeptique est alors dit « post infectieux ») ; l'anxiété et le stress ; le tabac ; la consommation d'alcool ; la prise de repas copieux et d'aliments gras ou acides ; la grossesse.

La constipation : Elimination de selle peu fréquente ou un passage difficile des selles qui persiste pendant plusieurs semaines ou plus. La constipation est généralement décrite comme ayant moins de trois selles par semaine.

➤ **Pinkoo** (gère les troubles digestifs pour bébé) :

- *Nouveau-né* : 2,5 ml x 3 / jr
- *1 Mois - 6 Mois* : 5 ml x 3 / jr
- *6 Mois - 12 Mois* : 10 ml x 3 / jr
- *1 an et plus* : 10 à 15 ml x 3 / jr

Débridat 200 mg : 1 cp x 3 / jr

➤ **Duphalac 10 g/ 15 ml** :

❖ **Adultes et adolescents** :

- *Traitement d'attaque* : 1 à 3 sachets par jour
- *Traitement d'entretien* : 1 à 2 sachets par jour

❖ **Enfants de 7 à 14 ans** :

- *Traitement d'attaque* : 1 sachet par jour.

➤ **Skilax goutte.**

- *Adultes et enfants de plus de 10 ans* : 10 à 20 gouttes / jr (5- 10 mg / jr)
- *Enfants de 4- 10 ans* : 5 à 10 gouttes / jr (2,5- 5 mg / jr)
- *Moins de 4 ans* : 0,25 mg / kg / jour (Cela correspond à 1 goutte de médicament)

NB : Pour obtenir un effet laxatif le matin, vous devez prendre le médicament la veille.

➤ **Huile de paraffine Sirop** :

- *Inférieur à 1 an* : 1 càc/jr
- *1-6 ans* : 2 càc/jr
- *Supérieur à 6 ans* : 3 càc/jr

Eductyl suppo adulte : 1 suppo par jour.

NB : Un usage prolongé risque d'entraîner des brûlures anales et une inflammation du rectum.

ANTISPASMODIQUES

Un antispasmodique (synonyme : spasmolytique) est un médicament pharmaceutique ou un autre agent qui supprime les spasmes musculaires.

Spasmex suppo : 1 suppo x 3 / jr

Spasmosyl suppo : 1 suppo x 2 / jr

➤ **Débridat** : Suspension buvable 1mg/kg/jr en 2-3 prises (1 cac = 5ml)

- < 6 mois : ½ cac 2-3 x/jr
- 6 mois-1 an : 1 cac 2x/jr
- 1 an-6 ans : 1 cac 3x/jr
- Supérieur à 6 ans : 2 cac 3x/jr ou dose poids
- Cp 100 mg pour le grand enfant : 1 cp 2 ou 3x/jr

Spasfon : Cp 80 mg ; 1 cp 3x/jr à partir de 10 ans.

➤ **Stopcolique sirop :**

- 6 mois- 5 ans : 2,5 cc = ½ cac 3x/jr
- Inferieur à 5 ans : 5 cc = 1 cac 3x/jr
- Adulte : 7,5 cc = 1 cac et ½ 3x/jr

Thémonol sirop : cam 3x/jr

➤ **Bedelix saachet :**

- < 2 ans : ½ sachet 1-2x/jr
- 2 ans- 5 ans : ½ sachet 2- 3x/jr
- 5 ans- 10 ans : 1 sachet 2x/jr

Badygaz sirop : 1 cam le soir

PSCHIATRIE

La psychiatrie est la spécialité médicale consacrée au diagnostic, à la prévention et au traitement des troubles mentaux. Celles-ci comprennent diverses inadaptations liées à l'humeur, au comportement, à la cognition et aux perceptions.

Melex cp (anxiété)

Valium injectable + diazepam 10mg/2ml. (injection IM)

Promethazine 25mg : 1 fois/jr au coucher pendant 7 à 10 jr

AUTRES

Biltricide 600mg (Praziquantel)

Indication : **Bilharziose**

Schistosoma haematobium	Une dose unique de 40mg par kg de poids corporel.
Schistosoma mansoni Schistosoma intercalatum	Une dose unique de 40mg ou 2 doses de 20mg/kg/jr
Schistosoma japonicum	Une dose unique de 60mg ou 2 doses de 30mg/kg/jr
Clonorchis sinensis Opisthorchis viverrini	3 doses de 25mg par kg de poids corporel réparties sur 24 heures.
Paragonimus westermani	3 x 25 mg/jr par kg de poids corporel pendant 2 jours.

Levothyrox cp : 1 cp / jr

Steonose : rétrécissement du pylore

Biafine : pour badigeonner une plaie

Pommade Contre les acnés : Adapalene , Le peroxyde de benzoyle

Médicament contre les acnés : rubozinc 15 mg + erythromycine et Doxy.

Pommade contre dartre : Protopic et silkis ,

Griséofulvine (Antifongique) : contre teigne

Dexaméthasone (Glucocorticoïde) : utilisé contre les affections de la peau et aussi contre l'asthme

https://www.dirpharm.net/images/sampledats/pdf/Liste_nationale.pdf

Quelques maladies, traumatismes et traitements

Constipation / Troubles Fonctionnels Digestifs

Duphalac buv sol 10 mg : 1 scht x 2 ou x 3 / jr en Per Os,

Eductil suppo : 1 suppo x 2 ou x 3 / jr par Voie Rectale.

Metéoxane gel : 2 gel x 3 / jr

Forlax sachet : 1 scht × 2 / j

Spasfon lyoc 80mg cp : 1 cp × 3 / jr

Microlax scht

Debridat sachet : 1 scht x 2 / jr

Debridat sirop : 1 càc x 3 / jr

Flatoril gélule B/45 : 1 gel x 2 / jr

Brulure mictionnelle

Dr : IST



- **Pour traiter les hommes :**

Signes : Douleur testiculaire, Brûlures mictionnelles, Ecoulement uretral.

- **Ceftriaxone 1g** : en IM dans une fesse
- **Métronidazole (Flagyl, Metronyl) cp 500 mg** : 4 cp en prise unique en per os
- **Doxy 200mg** : 1 cp/jr pdt 3 jrs en per os
- **Ciprofloxacine 500mg cp** : 1 cp en P.U en per os
- **Azithromycine** (atmax, azicure, Rolicin cp, Azithro gélule) 500mg, 1cp ou gel/j sur 3 jrs

- **Pour traiter les femmes :**

Signes : Douleur pelvienne, brûlures mictionnelles, Ecoulement vaginal ou Leucorrhées ou perte blanche, prurit vaginal

- **Ceftriaxone 500mg inj** : 1 inj en IM dans une fesse
- **Métronidazole 500mg cp** : 4 cp, en prise unique en per os
- **Azithromycine 500mg cp** : 2 cp/jr en une prise unique pdt 3 jrs en per os
- **Econazole 150mg ovule** ou **Ecorex ovule** : 1 ovule/jr le soir au coucher pdt 6 jrs

Tergynan ovule, Poligynax ovule, Ecorex ovule, Flagyl ovule, Ovumix ovule : 1 ovule au coucher

Polygynax ovule : 1 capsule vaginale chaque soir au moment du coucher, pendant 12 jours.

Ogyderm solution pour toilette : 2 fois par jour

Intim-T sol toilette

Dazel kit

NB : Revoir le ou la patient(e) le 10^{ème} jour et le 24^{ème} jour. Expliquer la nécessité de traiter le(s) partenaires.

Infection urinaire

Cifran CT : 1 cp x2/jr

- **Mesporin inj 1000 IV/IM** : 1 à 2g une fois par jour toutes les 24 heures. (*Not suitable for children under the age of 12 years old*)

Ulcération de la cavité buccale

Dr : *Candidose buccale*



Daktarin gel buccal : 1 appl x 3 / jr

Douleur abdominale

- Novalgin injectable :
- Novalgin cp 500 mg : ...cp x 2 / jr
- Spasfon injectable 40mg :
- Spasfon suppo : 1 suppo x 2 / jr pdt 5 jrs
- Spasfon cp 80mg et 160mg....

Flagyl 500mg (Metronidazole) cp, perf, sp

Nufluril suppo 400mg (enfants)

Visceralgine cp 50mg, inj 20mg. sp 2% 150ml. Suppo 20mg

Metamizole (Metaren, Restriva, Novalgin) cp 500mg

Spasmo - Apotel (para +hyoscine) 500mg + 10mg cp

Yokoli's Mother Believed that Life's About Serving Others.

Publish by : Together , we'll be strong.

LOMBALGIE

Dicaciline inj ou Diclofenac inj

Celebrex (AINS) 200mg gélule

Profenid suppo : 1 suppo × 2 / jr

Profenid inj : en IM

Acenland cp 100mg : 1ou 2 cp/jr

Ulcère gastroduodéal

Gaspral 20 mg (à partir du 11^{ème} jr du TTT ; 30 min avant le repas) : 1 cp x 2 / jr pdt 10 jrs.

Almax forte sachet : 1 scht x 3 / jr

Clamoxyl 500 mg gel : 2 gel x 2 / jr pdt 6 jrs

Métronidazole 500 mg (à partir du 6^{ème} jr du TTT) : 1 cp x 2 / jr pdt 5 jrs

Clariva 500 mg (à partir du 6^{ème} jr du TTT) : 1 cp x 2 / jr pdt 5 jrs.

Protocole antivenimeux

Kit perfusion (SSI ou Ringer)

Diclofénac injectable en IM

Antibiotiques : (Amoxicilline injectable ou ceftriaxone) en IV

Dexaméthasone injectable en IV

Gluconate de calcium injectable : 3 ampoules (1 amp en IVDL et 2 amp dans le sérum)

Diclofénac cp (*Not suitable for Ulcéreux*) : ...cp x 2 / jr pdt 5 jrs

Amoxicilline gel 500 mg : ...gel x 2 / jr pdt 5 jrs.

Sat : 1 amp en sous-cutané

B. Complex : 1 amp dans le sérum

B. 12 : 1 amp dans le sérum

Novalgine injectable en IVDL

Tramadol

Nettoyer la plaie et faire un pansement

Donner souvent nescafé

Morsure de chien

Diclofénac inj :

Novalgin inj :

Amoxicilline inj :

SAT :

NB : Faire le sérum antirabique si le chien n'est pas vacciné.

Trouble fonctionnel

Spasmopriv 100 mg : 1 gel x 3 / jr

Oreillon

Les oreillons sont une maladie infectieuse virale très contagieuse, touchant le plus souvent les enfants de 4-5 ans, surtout en période hivernale. La transmission du "virus ourlien" se fait par voie aérienne, par inhalation de gouttelettes de salive émises par une personne malade ou par contact direct avec la salive.



Analgin injectable :

Augmentin susp enft : ...kg dose x 2 / jr pdt 5 jrs en Per Os.

Vomissements + selles liquide

DR : Gastro-entérite

Novalgine injectable :

Vogalène injectable : ...

Métronidazole cp : X 2 / jr

Cotrim sp : ... ml x 2 / jr

Doliprane sachet :

Douleur dentaire

Dr : Stomatite

Amoxicilline gel 500 mg : ...gel x 2 / jr pdt 5 jrs

Métronidazole 500 mg : ...cp x 2 / jr

Diclofénac inj (Not suitable for Ulcéreux) : ...Amp en IM

Novalgine inj : ...

Diclofénac cp (Not suitable for Ulcéreux) : ...cp x 2 / jr

Saignement après planning familial

Microgynon cp : 1 cp / jr

NB :

- *Ne pas prendre les comprimés de couleur rouge au cas ou la patiente saigne après le dépôt.*
- *Elle peut prendre les comprimés de couleur rouge si elle utilise Microgynon comme méthode contraceptive.*

HÉMORRAGIE : Écoulement du sang hors des vaisseaux.



Dysnone injectable, cp 500mg (interne ou externe) ou Tronconex + cefadroxil

Ocytocine : delivrance, stopper hémorragie et contraction utérine

Exacyl injectable, cp 500mg

Vitamine k1

Hématurie



Dr : Suspicion de bilharziose

Praziquantel cp 500 mg : 3 cp en P.U

Désir de grossesse

Vivagest comprimé : 1 cp / jr.

Utrogestran gélule 200 mg : 1 gel x 2 /jr en Per os.

Clomifex 50 mg : 1 cp x 2 /jr (3 boîtes)

DERMATOLOGIE - ANTISEPTIQUE

- **Primalan comprimé 10 mg** : 1 cp / jr pdt 10 jrs en per os
- **Dexaméthasone injectable** : 2 à 4 ampoules en IM ou IV
- **Isolone cp eff 200 mg** : 3 cp / jr (à prendre le matin)
- **Alben comprimé 400 mg** : 1 cp en prise unique
- **Savon antiseptique** (*Siptigel, Septilait, Cyteal solution*) : 1 bain x2/jr pdt 10 jrs

Astaph 125 mg sirop : x 3 / jr (for Child)

Lamisil crème : 1 applx 3 / jr

Positon crème : 1 appl x 2 / jr

Astaph 500mg gélule, susp 125mg et 250mg : 1 gel × 3 /jr (furonculose, anthrax, abcès, impetigo)

Azithro 500mg et 250mg cp, scht 100mg et 200mg : 1 cp/jr pdt 10 jrs

Ascabiol sol appl : 1 appl x 2 / jr

➤ **Mitosyl irritations** : Erythème fessier du nourrisson.

❖ **Posologie** :

- 1 à 3 fois par jour sur la zone irritée.

❖ **Voie cutanée** :

- Irritation cutanée : la durée d'utilisation est limitée à 5 jours.
- Fesses rouges du nourrisson : la durée d'utilisation est limitée à 3 jours
- O

➤ **Micozal 2% Crème** : Traitement topique des infections de la peau à dermatophytes, des candidoses cutanées, du Pityriasis versicolor.

❖ **Posologie** : 1 appl x 2 / jr

Ketoderm crème 2% : 1 appl x 2 / jr

Osmogel : 1 appl x 2 /jr (Appliquer un peu de gel sur la zone douloureuse, puis recouvrir d'une compresse)

Dicaciline 2.4mg inj

Till sol app : antiseptique

Oxiclar 50mg gélule, 250mg 125mg susp

Pharpen 500mg gélule, 250mg susp

Yokoli's Mother Believed that Life's About Serving Others.

Publish by : Together , we'll be strong.

Oxapen(oxacilline) 250mg susbv Fl 60ml, inj

Floxapen 500mg cp et susp

Ceftriaxone

Bactrim forte cp 500mg

Bactrim sp 100ml

Triam-Denk inj

Halibut 250mg pde:Érythème, escarres et ulcère de  plaie superficielle et brûlures 1er dgr + associés avec eosine

Ogyderm sol(varicelle, Rougeole, teigne gale) 1 app avant le bain (Dartres,panaris pieds athlètes)

Acne : Retinoine crème 30g et lotion 15ml , Retacnyl crème 0,05% 30g, Effederm crème ,Ketrel crème 0,05%

hexomedine sol p app antiseptique

Varicelle : Dicaciline 2.4mg + Dexa , Astaph+ Siptigel + Eosine +histaminique

Acide Fusidique 15 g crème : furoncle, panaris.

Phytoral pde 15g cp.

Larva migrans

Il s'agit d'une maladie de la peau relativement rare due à un ver. La lésion est pourtant assez facilement reconnaissable car le patient est attiré par un petit cordon situé juste sous la peau faisant des courbes et des boucles, entouré d'une zone rouge traduisant l'inflammation et qui entraîne surtout des démangeaisons locales importantes. Ce trajet visible ne correspond pas en fait au ver lui-même (rendant illusoire toute tentative de le retirer chirurgicalement), mais en fait la réaction allergique inflammatoire que laisse derrière lui le parasite quand il progresse sous la peau.



Albendazole cp 400 mg + Prurex : Mélanger puis badigeonner la partie (petite chirurgie)

Decoderm tri crème : 1 appl x 2/jr pdt 5 jours

Yokoli's Mother Believed that Life's About Serving Others.

Publish by : Together , we'll be strong.

Vergeture

Dexeryl crème : 1 appl x 2 / jr

PRODUITS DE PANSEMENT

Savon : Siptigel , betadine rouge

Antiseptiques : dakin , éther

Pousser la chair : cuticell classic 10 cm, L-mesitran

Cicatrisations : baneocin 20g pde , betadine jaune, Septimyl

Baneocin pommade : 1 appl x 3 / jr

Brûlures Superficielle : Brulex pde 30mg, Biafine pde, eosine sol

Vircryl 1.0 ou 2.0 ou 3.0 (**suture interne**) , **Nilon No 2** (**suture externe**)

Plaie infecté : Astaph cp 500mg : 1 cp × 3 / jr

Examens

Paludisme : GE ou Frottis, NFS

Infection : CRP

AVP : Radiographie F/P , Echo (abdo), NFS (si saignement)

Douleur abdominale ou pelvienne : Echographie

CALCULS DES DOSES

Diazepam : 0,5 à 1 mg/kg/j en Intra Rectale ou IV

Ceftriaxone : 100 mg/kg/j

➤ **Dexamethasone**

- Pds < 15 kg 1/2 amp
- Pds > 15 kg 1 amp
- 0.5 mg/kg sans dépasser 2A

Metronidazole : 30 à 40mg/kg en 2 ou 3 prise

Aspirine : 50 mg/kg/j

➤ **Novalgine** : 30 à 60 mg/kg/j

5 kg - 8 kg = 1cc ; 9 kg - 12 kg = 1,5cc ; 13 kg - 15 kg = 1,5cc ; 16 - 18 kg = 2cc; 19 - 22 kg = 2,5cc ; 23 - 25 kg = 3cc ; 26 -31 kg = 3,5cc ;32 - 34 kg = 4cc; 35 - 36 kg = 4,5cc; 40 kg et + = 5cc

Age : 3 - 6 ans = 0,5 à 1,5cc ;6 - 12 ans = 1 à 2,5cc; 12 ans et + 5cc

➤ **Cotrimoxazole**

- 6 semaines - 5 mois : 2,5 ml×2/j
- 6 mois - 5 ans : 5 ml×2/j pds< 20 kg
- 6 ans - 12 ans : 10 ml×2/j pds> 20 kg
- 13 ans et + : 1 cp ×2/j

➤ **Paluject**

- 24 mg/kg/j en inj
- 25 mg/kg/j en cp

➤ **Transfusion**

(THb attendu - THb patient) × 6 × pds

Débit : Q × 15/temps

➤ **Artesunate**

- Pds < 20 kg ; IV : 3×pds ÷10
- IM : 3×pds÷20
- Pds > 20 kg; IV : 2,4×pds÷10
- IM : 2,4×pds÷20

➤ **Para perf** : 60 mg / kg / j = pds × 60 ÷ 3 (dose journalière)

➤ **Gentamycine**

- Dose: 5 mg/kg/j
- Dosage : 80mg/2ml

➤ **Cefixime**

- Cp, gel 200mg
- susp pdre 40mg/5ml et 100mg/5ml
- Enft Dose: 8mg/kg/jr

➤ Antibiothérapie

• Angine rouge

- **Amoxicilline** (Clamoxyl) Sirop, comprimé : 40 mg/kg/jr sur 3 prises, soit :
 - ✓ Inférieur à 08 kg = Sirop 125 mg : 1 cm x 3 / jr
 - ✓ 09- 16 kg = Sirop 250 mg : 1 cm x 3 / jr
 - ✓ 17- 38 kg = Sirop 500 mg : 1 cm x 3 / jr
 - ✓ Supérieur à 39 kg = cp 500 mg : 1 cp x 3 / jr
- NB** : En per os pendant 5 à 10 jours

• Angine érythémato-pultacé

- **Amoxicilline + Acide Clavulanique** : 40mg/ 5mg/ kg/jr à répartir sur 2 ou 3 prises :
 - ❖ Augmentin Sirop, sac, cp
 - ✓ Inférieur à 15 kg = Sirop nourrisson : 1 DDP x 3 / jr
 - ✓ 15- 25 kg = Sirop enfant : 1 DDP x 3 / jr
 - ✓ 25- 38 kg = sac 500 mg : 1 sac x 2 / jr
 - ✓ Supérieur à 38 kg = cp 1g ou sac 1g : 1 sac x 2 / jr
- NB** : En per os pendant 5 à 10 jours

• Angine : cas d'allergie au B-lactamines

- **Josamycie (Josacine)** : 50 mg/kg/jr à répartir sur 2 prises, soit :
 - ✓ Inférieur à 8 kg = Susp buv 125 mg/ 5ml : 1 DDP x 2 / jr
 - ✓ 09- 16 kg = Susp buv 250 mg/5ml : 1 DDP x 2 / jr
 - ✓ 17- 38 kg = Susp buv 500mg/5ml : 1 DDP x 2 /jr
 - ✓ Supérieur à 39 kg = cp 500 mg à 1g : 1 cp x 2 /jr
- NB** : En per os pendant 5 jours

• Angine : impossibilité du traitement par voie orale

- **Benzathine benzylopénicilline (Extencilline)**
 - ✓ Poids inférieur à 27 kg : Amp 0,6 MU
 - ✓ Poids supérieur à 27 kg : 1,2 MU
- NB** : 1 seule injection en IM

- **Infection urinaire**

- **Céfixime (Oroken)** susp buv, cp : 8 mg/kg/jr à répartir sur 2 prises, soit :
 - ✓ Inférieur à 10 kg = sirop 40 mg : 1 DDP x 2 / jr
 - ✓ Supérieur à 10 kg = sirop 100 mg : 1 DDP x 2 / jr
 - ✓ Enfant supérieur à 12 ans : cp 200 mg : 1 cp x 2 / jr**NB** : En per os pendant 5 à 10 jours.

- **Gastro-entérite**

- **Métronidazole (Flagyl)** : **Si apyrexie**, sirop, cp : 30- 40 mg/kg/jr à répartir sur 3 prises :
 - ✓ Inférieur à 13 ans = susp buv 125 mg : 1 cm x 3 / jr en per os pdt 7 jr
 - ✓ Supérieur à 13 ans = Flagyl cp : 1 cp x 3 / jr en per os pdt 7 jrs
- **Sulfaméthoxazole + triméthoprim (Bactrim)** : **Si fièvre** ; sirop, cp : 30mg/6mg/jr
 - ✓ Inférieur à 13 ans = susp buv 200/40mg : 1 cm/10kg/jr en per os pdt 7 jrs
 - ✓ Supérieur à 13 ans = cp 400/80mg : 1 cp x 3 / jr en per os pdt 7 jrs

- **Muguet ou Candidose buccal**

- **Amphotéricine B (Fungizone Enfant)**
 - ✓ Application par compresse stérile 2 x / jr

- **Antibiotique oculaire** : Conjonctivite bactérienne, chalazion ou orgelet.

- **Rifamycine (Rifamycine)** collyr, pommade

Posologie : 1 gtt/œil x 3 / jr

: 1 application le soir pour pommade

- **Acide fucidique (Fucithalmic)** collyr : 1 gtt/œil x 2 / jr
- + lavage au SSI.

- **Désencombrement nasale**

Eau de mer stérile (**Stérimar**), spray bébé, spray enfant : 1 pulv/narine x 2 à 6 / jr

LES 9 CADRANS DE L'ABDOMEN

<i>Hypochondre droit</i> - Calcul biliaire - Ulcère gastrique - Pancréatite	<i>Epigastre</i> - Ulcère gastrique - Gastrite - Pancréatite - Calculs biliaires - Hernie épigastrique - Indigestion	<i>Hypochondre gauche</i> - Ulcère gastrique - Ulcère duodénal - Coliques biliaires - Pancréatite
<i>Flanc droit</i> - Calcul rénal - Infections urinaires - Constipation - Hernie lombaire	<i>Région ombilicale</i> - Pancréatite - Ulcère gastrique - Hernie ombilicale - Début d'appendicite - Gastro-entérite	<i>Flanc gauche</i> - Calcul rénal - Diverticulose - Constipation - Intestin inflammatoire
<i>Fosse iliaque droite</i> - Appendicite - Constipation - Hernie inguinale	<i>Région hypogastrique</i> - Infection urinaire - Appendicite - Intestin inflammatoire - Diverticulose - Inflammation du pelvis	<i>Fosse iliaque gauche</i> - Diverticulose - Inflammation du pelvis - Hernie inguinale

Valeurs Physiologiques Normales et Pathologiques

Fréquence Respiratoire

Age	Normales (Cycles/minute)	Polypnée (Cycles / Minute)
<i>Naissance à 2 Mois</i>	40 à 60	> 60
<i>3 Mois à 11 Mois</i>	30 à 40	> 50
<i>12 Mois à 5 Ans</i>	20 à 30	> 40
<i>A partir de 5 Ans</i>	12 à 20	> 30

Fréquence Cardiaque (Pouls)

Age	Normale : Battement/minute	Tachycardie : Battement/minute	Bradycardie : Battement/minute
<i>Nouveau-né (0 à 28 jours)</i>	100 à 180	> 180	< 100
<i>1 Mois à 2 Ans</i>	90 à 160	> 160	< 90
<i>2 Ans à 5 Ans</i>	80 à 140	> 140	< 80
<i>5 Ans et 15 Ans</i>	60 à 120	> 120	< 60

Pression artérielle (Tension artérielle)

Age	Pression Artérielle (TA) normale	
	PA Systolique	PA Diastolique
<i>Nouveau-né (0 à 28 jrs)</i>	60 – 85	40 – 60
<i>1 Mois à 12 Mois</i>	70 – 110	50 – 60
<i>1 An à 10 Ans</i>	80 – 110	50 – 70
<i>A partir de 10 Ans</i>	90 – 130	50 – 80

BONUS

1. **L'estomac** est blessé quand tu n'as pas pris ton petit-déjeuner le Matin.
2. **Les reins** sont blessés quand tu n'as même pas bu dix (10) verres d'eau en 24 heures.
3. **Le vésicule biliaire** est blessée quand tu n'as même pas dormi pendant 8 heures du temps et ne t'es pas réveillé au levé du soleil.
4. **Le petit intestin** est blessé lorsque vous mangez froid et des aliments rassis.
5. **Le grand intestin** est blessé lorsque vous mangez plus frit et de la nourriture épicée.
6. **Les poumons** sont blessés lorsque vous respirez la fumée et restez dans un environnement pollué de fumée de cigarettes.
7. **Le foie** est blessé lorsque vous mangez frit, la malbouffe et Fast food.
8. **Le cœur** est blessé lorsque vous mangez votre repas avec plus de sel et cholestérol.
9. **Le pancréas** est blessé quand tu manges les choses sucrées parce qu'ils sont savoureux et disponibles gratuitement.
10. **Les yeux** sont blessés lorsque vous travaillez à la lumière de téléphone portable et écran d'ordinateur foncé.
11. **Le cerveau** est blessé lorsque vous commencez à penser négativement.
12. **L'âme** se sent blessée lorsque vous n'avez pas de famille et amis qui prennent soin de vous et partagent avec vous, dans la vie leur amour, affection, Bonheur, tristesse et joie.

NB : Toutes ces choses ne sont pas disponibles dans le marché. Alors prends bien soin et garde tes parties du corps en bonne santé.

EFFET DE L'EAU

Nous savons que l'eau est importante mais sans savoir les horaires spéciales pour en boire.

Eau potable au bon moment maximise son efficacité sur le Corps humain.

- 1 Verre d'eau après le réveil aide à activer l'intérieure des organes.
- 1 Verre d'eau 30 minutes avant un repas facilite la digestion.
- 1 Verre d'eau avant de prendre un bain aide la baisse de la pression sanguine.
- 1 Verre d'eau avant d'aller au lit évite les AVC ou l'attaque du cœur.

QUELQUES TERMES MÉDICAUX

1. **Anémie** - Déficit en hémoglobine dans le sang
2. **Analgésique** - Médicament qui soulage la douleur
3. **Arthralgie** - Douleur dans une articulation
4. **Céphalée** - Maux de tête
5. **Néphralgie** - Douleur dans les reins
6. **Névralgie** - Douleur nerveuse
7. **Myalgie** - Douleur musculaire
8. **Otalgie** - Douleur à l'oreille
9. **Gastralgie** - Douleur de l'estomac
10. **Pyodermite** - Infection cutanée avec formation de pus
11. **Leucoderma** - Pigmentation cutanée défectueuse
12. **Hystérodynie** - Douleur dans l'utérus
13. **Hystérectomie** - Excision de l'utérus
14. **Néphrectomie** - Excision d'un rein
15. **Adénectomie** - Excision d'une glande
16. **Cholécystectomie** - Excision de la vésicule biliaire
17. **Thyroïdectomie** - Excision de la glande thyroïde
18. **Arthrite** - Inflammation d'une articulation
19. **Bronchite** - Inflammation des bronches
20. **Cardite** - Inflammation du cœur
21. **Cervicite** - Inflammation du col de l'utérus
22. **Colite** - Inflammation du côlon
23. **Colpите** - Inflammation du vagin
24. **Cystite** - Inflammation de la vessie
25. **Entérite** - Inflammation des intestins
26. **Gastrite** - Inflammation de l'estomac

27. **Glossite** - Inflammation de la langue
28. **Hépatite** - Inflammation du foie
29. **Laryngite** - Inflammation du larynx
30. **Métrite** - Inflammation de l'utérus
31. **Myélite** - Inflammation de la moelle épinière
32. **Néphrite** - Inflammation du rein
33. **Pharyngite** - Inflammation du pharynx
34. **Blépharite** - Inflammation des paupières
35. **Lithiase biliaire** - Pierre ou cailloux dans la vésicule biliaire
36. **Néphrolithiase** - Pierre ou cailloux dans le rein
37. **Ostéomalacie** - Adoucissement des os par carence en calcium ou en vitamine D
38. **Adénome** - Tumeur bénigne du tissu glandulaire
39. **Myome** - Tumeur musculaire
40. **Diplopie** - Double vision
41. **Thrombose** - Formation d'un caillot sanguin
42. **Pyloromyotomie** - Incision du muscle du sphincter pylorique
43. **Hydrophobie** - Peur de l'eau
44. **Neuroplastie** - Réparation chirurgicale des nerfs
45. **Pyloraplastie** - Incision du pylore et remplacé par un autre en plastique pour élargir le passage
46. **Hémiplégie** - Paralysie d'un côté du corps
47. **Néphroptose** - Déplacement vers le bas du rein
48. **Aménorrhée** - Absence de pertes menstruelles
49. **Dysménorrhée** - Menstruations douloureuses
50. **Leucorrhée** - Pertes vaginales blanchâtres
51. **Ménorrhée** - Saignements menstruels
52. **Hémorragie** - Fuite de sang d'un vaisseau
53. **Arythmie** - Toute déviation du rythme cardiaque normal
54. **Cholestase** - Diminution du flux de bile
55. **L'hémostase** - Arrêt du saignement

- 56. **Neurasthénie** - Débilité nerveuse
- 57. **Cystostomie** - Ouverture chirurgicale pratiquée dans la vessie
- 58. **Cystotomie** - Incision dans la vessie
- 59. **Hypertrophie** - Augmentation de la taille des tissus
- 60. **Hématurie** - Sang dans les urines
- 61. **Glycosurie** - Présence de sucre dans les urines.
- 62. **Leucémie** - cancer du sang

DEDICATED TO THE GROUP :
TOGETHER , WE'LL BE STRONG.

Prière , vous assurer que vous utilisez ce document à bon escient.