

Contrôle — Santé Infantile L2

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTÉ

Contrôles de connaissance — Santé Infantile — Licence 2 SF-M/IDE (Groupe 2), INFAS Abidjan

CONTRÔLE DE CONNAISSANCE — SANTÉ INFANTILE — VERSION D

Année académique : 2024-2025 | Date : 29 avril 2025 | Durée : 30 min | Version D

I. QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE (QCM)

Cochez la ou les réponses appropriées : Une bonne réponse = 1 point / Une réponse incorrecte = 0 point / Aucune réponse = 0 point

1. Ces critères énumérés sont ceux d'une tétée efficace :

Entourez la réponse exacte

- A. Menton du bébé touche le sein ;
- B. Succion rapide, superficielle sans pause ;
- C. On entend le nouveau-né déglutir le lait maternel ;
- D. La bouche est grandement ouverte et prend largement l'aréole ;

2. Le but de la mesure du périmètre crânien est :

Entourez la réponse juste

- A. D'apprécier le volume du crâne ;
- B. De dépister un spina bifida ;
- C. De dépister un omphalocèle ;
- D. De dépister une macrocéphalie ;

3. Entre 60 et 90 minutes de vie extra-utérine, examiné le nouveau-né à la recherche de :

Cocher les deux réponses exactes

- A. Détresse respiratoire ;
- B. Malformations ;
- C. Réflexes archaïques ;
- D. Score d'APGAR ;
- E. Vernix de caseosa ;

4. A la naissance, la taille est de 50 cm, s'il est correctement nourri

Choisissez la bonne réponse

- A. De 3 à 6 mois, il augmente de 0,5 cm par mois ;
- B. De 0 à 3 mois, il augmente de 2 cm par mois ;
- C. De 6 à 12 mois, il augmente de 0,25 cm par mois
- D. De 12 mois à 4 ans, il augmente d'un 12 cm par mois

5. Les gestes ci-dessous sont effectués pendant 0-1 minute de vie, sauf un, lequel :

Entourez la réponse exacte

- A - Vérifier la respiration du nouveau-né ;
- B - Sécher le nouveau-né avec un linge propre sec et chaud ;
- C - Communiquer avec la mère sur l'importance de la mise au sein précoce
- D - Placer le nouveau-né en contact peau à peau sur le ventre de la mère ;

6. Un intrus s'est inséré dans les précautions à prendre pendant la toilette du nouveau-né, lequel :

Choisissez la réponse correcte

- A. Éviter les courants d'air ;
- B. Assurer la sécurité de l'enfant ;
- C. Éloigner la mère de l'enfant ;
- D. Respecter les règles d'hygiène et d'asepsie ;

7. Il existe plusieurs types de bain :

Choisissez la bonne réponse

- A. Le bain de croissance ;
- B. Le bain éducatif ;
- C. Le bain de propreté ;
- D. Le bain du développement psychomoteur ;

8. De 0-1 minute de vie :

Cocher les deux réponses justes

- A. Ligaturer et sectionner le cordon ombilical du nouveau-né ;
- B. Mesurer la température du nouveau-né ;
- C. Vérifier la respiration du nouveau-né ;
- D. Coter l'APGAR du nouveau-né ;
- E. Porter le bonnet au nouveau-né ;

9. Le pansement du cordon frais se fait pendant :

Choisissez la bonne réponse

- A. Les trois premiers jours de vie
- B. Les deux premiers jours de vie
- C. Jusqu'au 7ème jour de vie
- D. Jusqu'au 10ème jour de vie

10. Disposition de l'agent de santé avant tout soin, est de :

Cocher la bonne réponse

- A. Porter une blouse propre ;
- B. Avoir les ongles coupés, courts et vernis ;
- C. Protéger les cheveux avec une perruque ;
- D. Porter les bijoux : montre, bague, bracelet ;

11. Le pansement du cordon sec se fait à partir du :

Cocher la réponse correcte

- A. 4ème jour jusqu'à la cicatrisation de la plaie ombilicale ;
- B. 4ème jour jusqu'à la chute du cordon ;
- C. 6ème jour jusqu'à la chute du cordon ;

12. Les gestes ci-dessous sont effectués pendant la minute d'or (0-1 minute) :

Choisissez la bonne réponse

- A. Sectionner le cordon ombilical, puis ventiler le bébé ;
- B. Sécher le nouveau-né avec un linge propre et sec tout en le stimulant par des frictions ;
- C. Demander de l'aide et améliorer la ventilation ;
- D. Mesurer le rythme cardiaque par la palpation du moignon du cordon ;

13. Les différentes parties du carnet de santé mère-enfant sont :

Entourez les deux bonnes réponses

- A. Carte d'identité des parents
- B. Les consultations prénatales ;
- C. La vaccination de l'enfant
- D. L'accouchement
- E. Les consultations curatives de l'enfant.

14. Le périmètre brachial permet d'évaluer l'état nutritionnel du nourrisson. Entre 1 et 2 ans il est de :

Choisissez la bonne réponse

- A - 12 à 14 cm
- B - 14 à 16 cm
- C - 16 à 20 cm
- D - 11 à 13 cm

15. Parmi les avantages que tire la mère réalisant l'allaitement s'y trouve un intrus, lequel :

Entourez la réponse exacte

- A. Protège des grossesses précoces ;
- B. Favorise attachement à son enfant ;
- C. Couteux ;
- D. Protège contre l'hémorragie de la délivrance ;

16. Les gestes ci-dessous sont effectués pendant 60 et 90 minutes de vie :

Entourez les deux réponses exactes

- A - Examiner le nouveau-né à la recherche d'éventuelles malformations et des réflexes archaïques ;
- B - Couvrir le nouveau-né avec un linge propre et chaud ;
- C – Sectionner le cordon ombilical ;
- D - Instiller 2 gouttes de collyre antiseptique dans chaque œil une seule fois ;
- E - Communiquer avec la mère sur l'importance de la mise au sein précoce ;
- F – Porter le bonnet au nouveau-né ;

17. Cocher l'élément qui n'appartient pas aux avantages que tire l'enfant lors de l'allaitement maternel :

Entourez la réponse exacte

- A. Développement cognitif optimal
- B. Croissance harmonieuse
- C. Favorise l'attachement à la mère
- D. Favorise l'obésité

18. Cocher seulement les bonnes réponses parmi les facteurs de déclin de l'allaitement

Entourez la réponse exacte

- A. Le congé de maternité avec présence de la mère à la maison ;
- B. Le soutien psychologique de la mère allaitante ;
- C. Promotion et vulgarisation des laits infantiles ;
- D. La montée laiteuse précoce ;

19. Les critères d'une bonne succion sont :

Choisissez la bonne réponse

- A. L'enfant fait le rot au cours de la tétée
- B. La bouche est grandement ouverte et prend largement l'aréole
- C. Une succion lente, profonde et continue
- D. On entend le nouveau-né déglutir le lait maternel

20. Les éléments ci-dessous cités appartiennent aux critères d'une bonne prise de sein

Entourez la réponse exacte

- A. La bouche est légèrement ouverte et prend peu l'aréole
- B. Le menton est éloigné du sein
- C. On entend le nouveau-né déglutir le lait maternel.
- D. La lèvre inférieure est éversée et l'aréole peu visible en haut

II. QUESTIONS A CHOIX DIRECT (QCD)

Énoncé : A = Vrai, B = Faux | Bonne réponse = 1 point / Réponse incorrecte = -1 / Sans réponse = 0

21. L'utilisation de tapis anti-dérapant est conseillée pour la toilette de l'enfant.

& Vrai (A) & Faux (B)

22. Lors de l'examen du nouveau-né en salle de naissance, l'une des précautions à prendre avant le soin est d'installer le bébé sur une lampe chauffante.

& Vrai (A) & Faux (B)

23. Pour préparer le bol de lait d'un enfant âgé de 22 jours à l'Alimentation de Remplacement, il faut quatre mesurettes rases de lait NATIVA 1.

& Vrai (A) & Faux (B)

24. La technique de la toilette consiste à savonner le corps de l'enfant avec un gant et le sécher avec le second gant

& Vrai (A) & Faux (B)

25. Pour préparer le bol de lait d'un enfant âgé de 4 mois à l'Alimentation de Remplacement, il faut six mesurettes rases de lait NURSIE 1

& Vrai (A) & Faux (B)

26. Le sérum bicarbonaté à 14% est utilisé dans le soin de la bouche.

& Vrai (A) & Faux (B)

27. Le terme de conditions AFADS (acceptable, Faisable, Abordable, Durable et sûre) est utilisé lors de l'allaitement pour déceler les difficultés liées à l'allaitement

& Vrai (A) & Faux (B)

28. Le but du soin des orifices est d'assurer sa perméabilité.

& Vrai (A) & Faux (B)

29. Le bain éducatif fait partie des différents types de bain à administrer à un enfant.

& Vrai (A) & Faux (B)

30. La néonatalogie ou néonatalogie désigne la même branche de pédiatrie qui prends en charge l'enfant malade ou en bonne santé de sa naissance jusqu'à 28 jours au plus

& Vrai (A) & Faux (B)

31. Pendant la première minute de vie, il faut placer le nouveau-né en contact peau à peau sur le ventre de la mère.

& Vrai (A) & Faux (B)

32. Pansement du cordon frais se fait pendant les trois premiers jours de vie.

& Vrai (A) & Faux (B)

33. L'enfant âgé de 5 mois a droit à 200 ml de Ration par Repas

& Vrai (A) & Faux (B)

34. La pédiatrie est la médecine chargée de faire principalement la promotion de la santé de l'enfant depuis le sein de sa mère en collaboration avec le gynécologue jusqu'à l'âge de 18 ans

& Vrai (A) & Faux (B)

35. La troisième partie du carnet de santé mère-enfant concerne le suivi de la vaccination.

& Vrai (A) & Faux (B)

36. L'extraction manuelle est plus sûre et comporte plus risque d'infection que l'extraction par pompe :

& Vrai (A) & Faux (B)

37. Pendant la toilette du nouveau-né, l'une des précautions à prendre est d'éloigner la mère du bébé afin d'éviter qu'il ne pleure.

& Vrai (A) & Faux (B)

NB — Une « Version B » de cette même épreuve du 29 avril 2025 figure également dans le document scanné : elle contient exactement les 37 mêmes questions, seulement réordonnées (QCD 1-17 correspondant aux QCD 21-37 ci-dessus, QCM 18-37 correspondant aux QCM 1-20 ci-dessus), et comporte des réponses cochées à la main par le candidat. Pour éviter une double transcription des mêmes questions, elle n'est pas reproduite intégralement ici.

ÉVALUATION SANTÉ INFANTILE — SUJET N°2 — VERSION B

INFAS — Antenne Abidjan | Licence 2 | Date : 15 septembre 2025 | Durée : 60 min |
Version B — Sujet N°2

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE (QCM)

Entourez (cochez) la (les) lettre(s) correspondante(s) à la réponse juste : Bonne réponse = 1 point /
Réponse incorrecte = 0 point / Pas de réponse = 0 point

1. Les causes des vomissements aigus sans fièvre du nouveau-né, sont :

Cochez la bonne réponse

- A. Occlusion ;
- B. Péritonite ;
- C. Infection bactérienne !• réponse cochée
- D. Fièvre

2. La photothérapie est le principal traitement de l'ictère à bilirubine, son but est de :

Cocher la bonne réponse

- A. Réduire le taux de bilirubine conjuguée ;
- B. Exposer de la peau à la lumière rouge ;
- C. Exposer de la peau lumière blanche ;

(mention manuscrite ajoutée) Décomposer la bilirubine en métabolites liposolubles !• réponse cochée

3. Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui concerne un enfant adolescent

Cocher la réponse exacte

- A. Enfant âgé de 12 ans à 15 ans !• réponse cochée
- B. Enfant âgé de 12 ans à 16 ans
- C. Enfant âgé de 12 ans à 17 ans
- D. Enfant âgé de 12 ans à 18 ans

4. Les caractéristiques du nouveau-né hypotrophe harmonieux, sont :

Cocher la bonne réponse

- A. Aspect d'araignée ;

B. Taille en dessous de la normale ;

C. Périmètre crânien normal.

D. Poids au-dessus de la normale !• réponse cochée

5. Parmi les propositions suivantes, s'y trouve les affections couramment rencontrées chez les enfants âgés de 01 à 05 ans :

Cocher la réponse juste

A. Souffrance cérébrale ;

B. Détresse respiratoire !• réponse cochée

C. Accidents ;

D. Pneumonie.

6. Le Plan C est utilisé pour le traitement de la déshydratation, lorsqu'il y a :

A. Pas de signes de déshydratation !• réponse cochée

B. Signes sévères de déshydratation

C. Signes évidents de déshydratation

D. Signes modérés de déshydratation

7. Précautions pendant le soin, consiste à :

Cocher la bonne réponse

A. Se laver à nouveau les mains à l'eau et au savon (ou gel hydro alcoolique) ; !• réponse cochée

B. Assurer la sécurité de l'enfant ;

C. Respecter les règles d'hygiène et d'asepsie ;

D. Essuyer les mains avec du papier essuie-tout ou une serviette individuelle (si lavé)

8. Facteurs favorisant les vomissements liés à l'enfant, sont :

Cocher la bonne réponse

A. Malaises ;

B. Mauvaise technique de mise au sein ; !• réponse cochée

C. Alimentation au biberon ;

D. Existence de conflit entre le père et la mère ;

9. Après le gavage, Il faut surveiller :

Cochez la bonne réponse

A. Les actions du nouveau-né ;

B. La couleur de la peau ; !• réponse cochée

C. Le nombre de vomissements ;

D. La respiration ;

10. Parmi les risques suivants, indiquez les deux qui sont immédiats chez le nouveau-né hypotrophe.

Cocher les deux réponses justes

A. La difficulté d'adaptation à la vie

B. L'hypothermie !• réponse cochée

C. L'hypoglycémie !• réponse cochée

D. Le retard de croissance.

11. Parmi les propositions suivantes, se trouve les facteurs favorisant la Rhinopharyngite liés à l'enfant

Cocher les deux réponses correctes

A. Immaturité du système immunitaire ; !• réponse cochée

B. Alimentation au biberon ;

C. Pollution ;

D. Défaut d'hygiène ; !• réponse cochée

12. L'Indice Poids/Taille est utilisé chez les enfants dont l'âge est compris entre :

Cocher la bonne réponse

A. 0 et Six (06) mois ; !• réponse cochée

B. Six (06) et 59 mois ;

C. Six (06) et 12 mois ;

D. Six (06) et 24 mois ; !• réponse cochée

13. On parle de détresse respiratoire modérée, si le :

Cocher la bonne réponse

A. Score compris entre 4 et 6 ;

B. Score "e 7 ;

C. Score compris entre 3 et 4 ; !• réponse cochée

D. Score < 3 ;

14. Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui signifie une crise d'asthme légère :

Cocher la bonne réponse

A. Une crise par mois ; !• réponse cochée

B. Une crise par semaine ;

C. Une crise : > 1 crise par semaine ; !• réponse cochée

D. Une crise : > 1 crise par mois ;

15. Sur cette liste figurent des signes qui appartiennent au tableau de malnutrition protéino-énergétique. Quelle est l'association qui comporte que des signes du kwashiorkor ?

1. Œdèmes ; 2. Enfant affamé ; 3. Refus de jouer ; 4. Aspect de vieillot ; 5. Cheveux roux, cassants ;

6. Enfant flotte dans sa peau ; 7. Peau : aspect de peinture écaillée ; 8. Cassure majeure de la courbe de poids ;

Cocher la bonne réponse

A. Signes : 4+5+6+7 ;

B. Signes : 1+2+3+4 ;

C. Signes : 2+4+6+8 ;

D. Signes : 1+3+5+7 ;

Note manuscrite : le chiffre « 5 » (cheveux roux, cassants) est entouré dans la liste ci-dessus.

16. Les maladies respiratoires suivantes sont d'origine infectieuses sauf une, laquelle ?

Cocher la bonne réponse

A. La bronchiolite !• réponse cochée

B. L'asthme

C. La pneumonie

D. Drépanocytose

17. Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui n'est pas une inflammation qui siège au niveau du pavillon de l'oreille

Cocher la bonne réponse

- A. L'otite interne
- B. L'otite externe
- C. L'otite moyenne
- D. Bronchite !• réponse cochée

18. Les facteurs favorisant la diarrhée liés à l'enfant sont sous cités :

Cocher la réponse juste

- A. L'alimentation avec les substituts de lait de mère ;
- B. Les erreurs diététiques ;
- C. Le défaut d'hygiène ;
- D. Le jeune âge de moins de 5 ans ;

19. Parmi les propositions suivantes indiquez les deux qui ne sont pas des fonctions de l'incubateur.

Cocher la bonne réponse

- A. Maintenir les habits de l'enfant chauds et secs
- B. Assurer l'alimentation au biberon
- C. Assurer la respiration d'un air filtré et humide !• réponse cochée
- D. Assurer un isolement sur le plan infectieux

20. Le carnet de santé mère-enfant comprend quatre parties à savoir :

Cocher les deux réponses correctes

- A. 1ère partie : suivi de la grossesse ;
- B. 2ème partie : identité et conditions de vie des parents ;
- C. 3ème partie : Vaccination de la mère ;
- D. 4ème partie : suivi de l'enfant (sain ou malade) ;

21. Parmi les propositions suivantes, indiquez la durée moyenne du pansement du cordon ombilical sec chez un enfant

Cocher la réponse correcte

- A. Du 1er jour jusqu'à la cicatrisation de la plaie ombilicale !• réponse cochée
- B. Du 4ème jour jusqu'à la cicatrisation de la plaie ombilicale ;
- C. Du 4ème jour jusqu'à la chute du cordon
- D. Du 6ème jour jusqu'à la chute du cordon

22. Parmi les propositions suivantes, cochez celle qui indique l'anémie microcytaire hypochrome :

Cochez la bonne réponse

- A. Due à la carence en acide folique ;
- B. Due au paludisme ;
- C. Due à la carence martiale ; !• réponse cochée
- D. Due à la drépanocytose ;

23. La phototherapie peut provoquer à court terme :

Cocher la bonne réponse

- A. Une hypoactivité de l'enfant ; !• réponse cochée
- B. Une diminution du transit intestinal ;
- C. Augmentation de la prise de poids ;
- D. Une conjonctivite ;

24. Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui sont les causes immédiates de la

malnutrition ;

Choisissez la réponse correcte

- A. Insécurité alimentaire des ménages ;
- B. Environnement socio-sanitaire ;
- C. Ration alimentaire inadéquate ;
- D. Surpoids

25. Les fonctions principales de l'incubateur sont :

- A. Maintenir l'enfant dans une tension ambiante de neutralité thermique ;
- B. Assurer la respiration d'un air filtré et sec ;
- C. Assurer la surveillance paraclinique ;
- D. Assurer la ventilation assistée ;

QUESTIONS A CHOIX DIRECT (QCD)

Pour toutes les propositions suivantes, cocher la bonne affirmation : A = Vrai, B = Faux | Réponse juste = 1 point / Réponse fausse = -1 point / Aucune réponse = 0 point

26. Un petit prématuré est un enfant né avec un poids de naissance inférieur à 2500g.

A = VRAI B = FAUX

Réponse cochée dans le scan : VRAI

27. L'anémie normocytaire normochrome est due à la carence en acide folique

A = VRAI B = FAUX

Réponse cochée dans le scan : VRAI

28. Un enfant en pleine croissance a besoin de trois repas et deux collations par jour.

A = VRAI B = FAUX

Réponse cochée dans le scan : VRAI

29. La prématurité peut entraîner l'otite aigue

A = VRAI B = FAUX

Réponse cochée dans le scan : VRAI

30. Pendant l'épisode de diarrhée, il faut conseiller à la mère de poursuivre l'alimentation.

A = VRAI B = FAUX

Réponse cochée dans le scan : VRAI

31. La malnutrition est la combinaison d'un régime alimentaire équilibré et une infection.

A = VRAI B = FAUX

Réponse cochée dans le scan : VRAI

32. La technique de téter en décubitus dorsale prolongée peut entraîner une otite aigue

A = VRAI B = FAUX

Réponse cochée dans le scan : FAUX

33. L'augmentation du risque infectieux est un avantage des soins mère-kangourou

A = VRAI B = FAUX

Réponse cochée dans le scan : FAUX

34. Pendant la première minute de vie, il faut placer le nouveau-né au contact du ventre de sa mère.

A = VRAI B = FAUX

Réponse cochée dans le scan : VRAI

35. Un individu âgé de 12 ans 01 semaine est un adolescent

A = VRAI B = FAUX

Aucune réponse cochée clairement visible dans le scan.

36. Il faut utiliser le plan A pour le traitement de l'enfant qui présente les signes évidents de déshydratation

A = VRAI B = FAUX

Aucune réponse cochée clairement visible dans le scan.

37. Dans la kwashiorkor l'enfant conserve l'appétit mais ne prend pas de poids

A = VRAI B = FAUX

Réponse cochée dans le scan : VRAI

38. Le Mérycisme traduit des troubles psychoaffectifs chez l'enfant

A = VRAI B = FAUX

Réponse cochée dans le scan : VRAI

39. Le service de pédiatrie accueille les enfants du début de l'adolescence jusqu'à la fin de l'adolescence

A = VRAI B = FAUX

Réponse cochée dans le scan : FAUX

40. La désobstruction rhinopharyngée est une technique douloureuse

A = VRAI B = FAUX

Réponse cochée dans le scan : VRAI

41. Le score de Silverman permet d'apprécier la gravité de la détresse respiratoire.

A = VRAI B = FAUX

Réponse cochée dans le scan : VRAI

42. Diarrhée aiguë : diarrhée qui dure depuis plus de 14 jours

A = VRAI B = FAUX

Aucune réponse cochée clairement visible dans le scan.

43. Néonatalogie ou Néonatalogie : Étude du nouveau-né pathologique

A = VRAI B = FAUX

Aucune réponse cochée clairement visible dans le scan.

44. Pendant la ponction lombaire de l'enfant, l'agent de santé évalue la douleur

A = VRAI B = FAUX

Aucune réponse cochée clairement visible dans le scan.

45. Nourrisson : 1 mois à 2 mois

A = VRAI B = FAUX

Aucune réponse cochée clairement visible dans le scan.

NB — Les réponses indiquées ci-dessus (« réponse cochée » / « VRAI » ou « FAUX ») sont celles entourées à la main dans le document scanné fourni ; elles sont retranscrites telles quelles, sans vérification ni correction. Pour les questions où aucune marque claire n'était visible sur le scan, aucune réponse n'a été indiquée.