

Durée : 1 heure

Version C

I- ETUDE DE CAS

Vous êtes infirmier major en médecine hospitalière au CHR de BONDOUKOU. Vous avez dû écourter votre congé pour nécessité de service.

Au cours de la visite avec le médecin, un malade du nom de ADJOUMANI Jean vous appelle pour vous présenter ses urines de 24 heures.

Vous remarquez qu'elles sont peu abondantes et foncées. Votre patient vous apprend qu'il n'a pas dormi à cause des démangeaisons qui se sont calmées au petit matin.

Pour avoir de plus amples informations sur cette affection vous vous référez au dossier de Monsieur ADJOUMANI qui révèle le diagnostic d'hépatite virale B, avec une symptomatologie d'asthénie et foie douloureux. On note que M. ADJOUMANI a 35 ans, il pèse 62 Kg avec une taille de 167 centimètres.

Q1 à Q3 : Cochez A pour Vrai et B pour Faux

- Q1. L'hépatite virale B est une maladie à déclaration obligatoire **A p 60 (Doc Med L2)**
 Q2. Le VHB est responsable de 75% des carcinomes hépato-cellulaires dans le monde **A p 60**
 Q3. Le VHB entraîne parfois des manifestations extra hépatiques comme des atteintes cutanées, une périartérite noueuse ou une glomérulonéphrite **A p 60 + 61**

Q4. Précisez la période clinique de la maladie de M. ADJOUMANI parmi les propositions suivantes :

- A Phase d'incubation
 B Phase prodromique
☒ C Phase ictérique **p 59**

Q5. Les trois objectifs de la prévention de la maladie de M. ADJOUMANI sont énoncés dans les propositions suivantes sauf une. Laquelle ? **p 62**

- A Soins sécurisés
 B Mesures individuelle et collectives
 C Vaccination
☒ D Traitement étiologique

on doit
éduquer
notre
malade
dans le
cas
précis

Q6. La formulation du diagnostic infirmier suivant : « Perturbation de l'image corporelle reliée à un changement dans l'apparence personnelle à un changement de rôle et dysfonctionnement alimentaire et sexuel » est en rapport avec un besoin fondamental prioritaire à satisfaire chez M. ADJOUMANI : Cochez- ce besoin parmi les propositions suivantes

- A Eviter le danger
☒ B Apprendre
 C Être propre soigné et protéger ses téguments et phanères

Q7. La valeur de l'IMC de M. ADJOUMANI est évaluée à : indiquez la valeur exacte parmi les propositions suivantes

A 21,23
$$IMC = \frac{Pds}{T^2} = \frac{62}{1,67 \times 1,67} = \frac{62}{2,78} = 22,23$$

☒ B 22, 23

C 23, 23

Pour faire passer les antibiotiques et antalgiques par voie parentérale, le Médecin vous demande de placer un sérum physiologique de 1000 cc à un débit moyen de 37 gouttes par minute.

Sérum sale

Q8. Le soluté prescrit est du... : cochez la bonne réponse

☒ A Serum salé isotonique (SSI : 0,9%)

B Serum glucosé isotonique (SGI : 5%)

C Ringer lactate $\Rightarrow$ *Sérum sale + électrolyte*

Q9. Indiquez la durée moyenne de cette perfusion parmi les propositions suivantes :

A 8 heures

☒ B 9 heures

C 10 heures

$$D = \frac{V \times 20}{T \times 60}$$

$$T = \frac{V \times 20}{D \times 60}$$

$$T = \frac{1000 \times 20}{37 \times 60} = \frac{20.000}{2220} = 9 \text{ heures}$$

QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD)

Consignes

Hachurez l'alvéole A pour les réponses justes et B pour celles qui sont fausses, sachant qu'une bonne réponse = 0,5 et une mauvaise réponse = -0,5, une absence de réponse = 0 point

Q10. L'HTA primaire est encore appelée HTA essentielle *A* ou RAA

Q11. La maladie de Bouillaud est une affection inflammatoire du tissu conjonctif *A*

Q12. Le terme de néphropathie gravidique désigne les troubles rénaux observés en relation avec la grossesse *A*

Q13. « La néphropathie gravidique ajoutée » désigne les accidents gravidiques survenant chez les femmes atteintes d'hypotension ou de néphropathie existante *B* (plutôt d'hypertension)

Q14. Dans la péricardite on note à l'auscultation un assourdissement des bruits du cœur en cas d'épanchement cardiaque *A*

Q15. La spondylarthrite ankylosante est le rhumatisme des articulations axiales, c'est-à-dire vertébrales et sacro-iliaques *A*

Q16. Le virus de l'hépatite B est un virus défectif qui dépend du virus D pour sa multiplication *B*

Q17. Le ténésme désigne une contraction douloureuse de l'anus, accompagnée d'une envie d'aller à la selle *A*

Q18. La polyurie, quelle qu'en soit l'origine, représente une cause de pollakiurie *A* *passer fréquemment à la selle*

Q19. Toute hématurie abondante est totale quelle qu'en soit l'origine *A*

Q20. L'énurésie est l'incontinence nocturne des urines chez l'enfant jusqu'à l'âge de trois ans. *A*

Q21. La fonction endocrine du pancréas est la sécrétion d'hormones régulant la glycémie : l'insuline et le glucagon principalement *A*

Le mal de pott est encore tuberculose osseuse

Q22. La fonction exocrine du pancréas est la sécrétion des enzymes pancréatiques dans le duodénum, par le canal de Wirsung **A**

Q23. Le diagnostic différentiel de la tuberculose uro-génitale est fondé sur la mise en évidence du bacille de Koch dans les urines **B** p 112

Q24. La colique néphrétique est synonyme de lithiase **B**

Q25. La cholé lithiase est encore appelée lithiase biliaire **A**

Q26. La pression artérielle diastolique correspond à la pression qui continue de s'exercer sur les artères entre chaque contraction **A**

Q27. La pression artérielle systolique correspond à la pression du sang quand le cœur se contracte et envoie le sang dans les artères **A**

Q28. Dans l'insuffisance cardiaque gauche la TA est basse ou normale **A**

Q29. Le syndrome dysentérique est provoqué par des germes entéro-invasifs **A**

ce sont des germes qui envahissent l'estomac

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM)

Hachurez les alvéoles correspondant aux bonnes réponses sachant qu'une bonne réponse vaut 0,5 et une mauvaise réponse 0 point.

Q30. L'Hypertension artérielle secondaire résulte soit : cochez l'intrus p 03

- ☐ A de mauvaise hygiène de vie
- ☒ B de tares héréditaires ✓
- ☐ C d'un effet secondaire de certains médicaments
- ☐ D d'une maladie préexistante

Q31. Les principales complications de la Glomérulo-néphrite sont : Cochez l'intrus p 25

- ☐ A l'encéphalopathie hypertensive
- ☒ B la tuberculose uro-génitale
- ☐ C l'insuffisance cardiaque
- ☐ D l'œdème pulmonaire
- ☐ E l'insuffisance rénale terminale.

Q32. Les Polyarthrites inflammatoires Chroniques (PAIC) sont caractérisés par les éléments suivants sauf un : Lequel ? p 132

- ☐ A Une topographie systématisée
- ☐ B La recrudescence nocturne et au réveil de la douleur
- ☐ C La fixation définitive sur des articulations qui vont devenir raide
- ☒ D une claudication intermittente
- ☐ E Une évolution par poussée

Q33. Les trois formes essentielles des PAIC sont : Cochez l'intrus ? p 132

- ☐ A La PAIC évolutive
- ☐ B La spondylarthrite ankylosante
- ☒ C Le rhumatisme dégénératif

D La PAIC rhumatoïde

Q34. Dans la PAIC évolutive les signes radiologiques sont en retard par rapport aux signes cliniques et présentent : cochez la bonne proposition p 133

A 1 stade unique

B 2 stades d'évolution :

C 3 stades d'évolution

☒ D 4 stades d'évolution

Q35. En rhumatologie les principaux signes fonctionnels rencontrés sont : Cochez l'intrus p 126

☒ A La paralysie ✓

B La douleur

C La raideur

D L'instabilité

E La boiterie ou claudication intermittente

Q36. Dans l'OAP, la prise en charge infirmière se résume à "ALORS" : c'est à dire : Cochez la bonne proposition p 24

☒ A Assise ou demi-assise jambes pendantes -Lasilix-Oxygénation-Risordan -Surveillance

B : Assise ou demi-assise jambes pendantes -Libération des voies aériennes-Oxygénation-Rééducation-Surveillance

C : Assise ou demi-assise jambes pendantes -Liquide (apport par perfusion) —Oxygénation - Repas chaud-Surveillance

Q37. Il existe 3 signes cliniques fondamentaux d'atteinte de l'appareil respiratoire qui doivent être connus de l'infirmière : Cochez-les L1

☒ A la sueur

B la dyspnée

C la toux

☒ D la cyanose

E les râles bronchiques

☒ F l'hippocratisme digitales sueurs.

Q38. Parmi les propositions suivantes indiquez deux étiologies de l'OAP p 22 (dans la del)

☒ A Surcharge volémique

B Chute de la TA

☒ C Lésion de la membrane alvéolo-capillaire

D Insuffisance cardiaque droite

Q39. Associez la série de termes a,b,c,d à leur définitions respectives (1,2,3,4) puis sélectionnez la bonne proposition d'association en ABCD

- a- Hématémèse
- b- L'hémoptysie
- c- La pollakiurie
- d- La polyurie


- 1 Emission d'urine d'abondance excessive
- 2 Rejet de sang rouge vif par la bouche, au cours d'un effort de toux
- 3 Extériorisation de sang rouge ou noir par la bouche lors d'effort de vomissement
- 4 Trouble portant sur la fréquence anormalement élevée des mictions.

A : (a-1)_(b-2)_(c-3)_(d-4)

B : (a-2)_(b-1)_(c-4)_(d-3)

C : (a-3)_(b-2)_(c-4)_(d-1)

D : (a-4)_(b-3)_(c-2)_(d-1)



a-3, b-2, c-4, d-1

Q40. Associez les hépatites virales A,B,C,E (en série 1,2,3,4) à leur mode de contamination (a ou b) puis sélectionnez la bonne proposition d'association en ABCD

- 1 HVA
- 2 HVB
- 3 HVC
- 4 HVE


- a- Contamination entérale (féco-orale)
- b- Contamination parentérale (sanguine, sexuelle, périnatale)

A : (a-1-2)_(b-3-4)

B : (a-3-4)_(b-1-2)

C : (a-1-3)_(b-2-4)

D : (a-1-4)_(b-2-3)



a-1-4

b-2-3

L'UNITE PEDAGOGIQUE DE MEDECINE VOUS SOUHAITE BONNE CHANCE !