

Épreuve — Néonatalogie/Pédiatrie L2

INFAS ABIDJAN

ÉPREUVE ÉCRITE DE NÉONATOLOGIE ET PÉDIATRIE

LICENCE 2 - INFIRMIER DIPLÔMÉ D'ÉTAT (IDE) / SAGE-FEMME (SFM)

Étudiant(e) : _____

Date : _____

Durée : 60 minutes Total : 60 points Nombre de questions : 60

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Cochez la ou les réponses correctes selon le type de question (QCM ou QCD)
- QCD = Question à Choix Double (Vrai/Faux) | QCM = Question à Choix Multiple
- Respectez le nombre maximal de choix indiqué pour chaque question
- Le temps imparti est de 60 minutes

QUESTIONS D'EXAMEN

Question 1 — QCM +1 pt

BJ, 2 ans, intoxication accidentelle au pétrole. La mère lui donne de l'huile de palme à boire avant la consultation. Le lipide contenu dans l'huile de palme (cochez la bonne réponse)

Choix unique

- & Favorise l'élimination du toxique
- & Retarde l'élimination du toxique
- & Je ne connais pas la réponse
- & Je suis sans avis sur le problème

Question 2 — QCD +1 pt

Le seuil définissant une hypoglycémie chez le nouveau-né est $< 0,40$ g/L

Choix unique (Vrai/Faux)

- & Vrai
- & Faux

Étude de cas — CAS CLINIQUE 1

Madame Wayou vient d'accoucher au CHR de Daloa d'un garçon. Le dossier obstétrical indique qu'elle a bien suivi sa grossesse. Elle n'était pas malade. Le nouveau-né est né à 43 semaines d'aménorrhée. Sa peau est froissée (fripée) et recouverte de méconium. Les ongles sont longs, cassants et empreints de méconium. Le poids, la taille et le périmètre crânien sont respectivement de 2450 g, 49 cm et 35 cm. Le regard est vif et le visage ressemble à celui d'un petit vieux.

Question 3 — QCM +1 pt

Les examens suivants font partie du bilan prénatal recommandé en Côte d'Ivoire, sauf un. Cochez-le.

Max 4 choix

- & Groupe sanguin ABO Rh
- & Ionogramme sanguin
- & Électrophorèse de l'hémoglobine
- & Glycémie
- & Sérologies VIH, VHB, Toxo, rubéole, syphilis

Question 4 — QCM +1 pt

Quelle est votre conclusion au terme de l'analyse de l'observation du nouveau-né de Madame Wayou ? Son nouveau-né est-il :

Choix unique

- & Post-terme hypotrophe
- & À terme eutrophe
- & Préterme hypotrophe
- & Prématurisme hypotrophe

Question 5 — QCM +1 pt

Indiquez les interventions potentielles à réaliser chez ce nouveau-né.

Max 3 choix

- & Aspirer systématiquement
- & Habiller chaudement
- & Mettre précocement au sein
- & Faire tomber rapidement le cordon ombilical
- & Faire les soins habituels (Vit K1, soins du cordon, soins oculaires)

Question 6 — QCM +1 pt

Un enfant léthargique, incapable de boire et présentant un pli cutané très lent à s'effacer est classé :

Choix unique

- & Sans déshydratation
- & En déshydratation modérée
- & En déshydratation sévère
- & En état nutritionnel normal

Question 7 — QCM +1 pt

Le rôle propre de l'infirmier(ère) dans la prise en charge d'un enfant diarrhéique comprend :

Choix unique

- & La réhydratation selon les plans A, B ou C
- & La prescription des antibiotiques
- & La demande d'examens radiologiques sans avis médical
- & Le diagnostic étiologique définitif

Question 8 — QCM +1 pt

Les principales causes de morbidité et de mortalité chez le nouveau-né sont :

Max 3 choix

- & Infection sévère
- & Prématurité
- & Paludisme
- & IRA (pneumonie)
- & Souffrance cérébrale

Question 9 — QCM +1 pt

Après la naissance, l'hypoglycémie du nouveau-né de mère diabétique est due à :

Max 2 choix

- & Une persistance de l'hyperinsulinisme
- & Une hyperglycémie maternelle persistante

- & Une augmentation du glucagon
- & L'arrêt de l'apport maternel en glucose

Question 10 — QCM +1 pt

Les soins infirmiers chez un enfant qui vomit comprennent :

Max 3 choix

- & Nettoyer l'enfant
- & Surveiller l'état clinique
- & Administrer un antiémétique sur prescription
- & Donner systématiquement un antibiotique

Question 11 — QCM +1 pt

Les besoins prioritaires de l'enfant qui vomit sont :

Max 3 choix

- & Alimentation
- & Hygiène
- & Surveillance
- & Immobilisation

Question 12 — QCM +1 pt

Les maladies cibles de la PCIME sont les suivantes, sauf une. Cochez-la.

Choix unique

- & Malnutrition
- & Poliomyélite
- & Pneumonie
- & Paludisme

Question 13 — QCM +1 pt

La période de l'adolescence varie entre :

Choix unique

- & 10 – 18 ans
- & 12 – 21 ans
- & 13 – 18 ans
- & 13 – 21 ans

Question 14 — QCM +1 pt

Cochez les situations à risque de détresse respiratoire chez le nouveau-né.

Max 3 choix

- & Souffrance cérébrale
- & Malformation
- & Pré maturité
- & Nouveau-né de mère asthmatique

Question 15 — QCM +1 pt

Cochez les facteurs de risque de la maladie hémorragique du nouveau-né.

Max 3 choix

- & Hypotrophie

- & Asphyxie périnatale
- & Certains médicaments
- & Hépatite aiguë
- & Macrosomie

Question 16 — QCM +1 pt

Au cours de la réanimation d'un nouveau-né en salle de naissance, il y a des gestes à faire. Lesquels ?

Max 2 choix

- & Mettre la tête en position neutre
- & Stimuler le nouveau-né en pinçant le mamelon
- & Aspirer la cavité buccale avant les narines
- & Commencer à faire un massage cardiaque

Question 17 — QCM +1 pt

Le traitement de l'anémie par carence en fer se fait avec (cocher la bonne affirmation) :

Choix unique

- & Fer + vitamine C + déparasitant
- & Fer + acide folique + déparasitant
- & Fer + vitamine A + déparasitant
- & Fer + Calcium + déparasitant

Question 18 — QCD +1 pt

Le vomissement est un rejet passif du lait sans effort, fréquent après les tétées.

Choix unique (Vrai/Faux)

- & Vrai
- & Faux

Question 19 — QCD +1 pt

L'anorexie du nourrisson est un trouble du comportement alimentaire caractérisé par un refus de s'alimenter par manque d'appétit.

Choix unique (Vrai/Faux)

- & Vrai
- & Faux

Question 20 — QCM +1 pt

La diarrhée aiguë du nourrisson est définie par l'émission, par jour et depuis moins de 14 jours, d'au moins :

Choix unique

- & 4 selles molles et liquides
- & 3 selles molles et liquides
- & 6 selles molles et liquides
- & 5 selles molles et liquides

Question 21 — QCD +1 pt

L'hygiène n'est pas essentielle dans la prévention de la diarrhée aiguë.

Choix unique (Vrai/Faux)

- & Vrai

& Faux

Question 22 — QCD +1 pt

Chez l'enfant, les infections respiratoires aiguës sont souvent virales avant l'âge de 3 ans.

Choix unique (Vrai/Faux)

& Vrai

& Faux

Question 23 — QCD +1 pt

L'asthme de l'enfant est une maladie inflammatoire chronique des bronches se manifestant par des crises de dyspnée avec respiration sifflante.

Choix unique (Vrai/Faux)

& Vrai

& Faux

Question 24 — QCD +1 pt

Il faut éviter les courants d'air pendant l'examen d'un nouveau-né hypotrophe.

Choix unique (Vrai/Faux)

& Vrai

& Faux

Question 25 — QCD +1 pt

Plasmodium falciparum est l'espèce responsable des formes graves du paludisme.

Choix unique (Vrai/Faux)

& Vrai

& Faux

Question 26 — QCM +1 pt

Parmi les facteurs ci-dessous, quels sont ceux qui favorisent la survenue d'une otite moyenne aiguë chez l'enfant ?

Max 3 choix

& Les rhinites

& La rougeole

& La saison de pluie

& La malnutrition

Question 27 — QCD +1 pt

La surveillance de la glycémie n'est pas nécessaire chez un nouveau-né hypotrophe.

Choix unique (Vrai/Faux)

& Vrai

& Faux

Question 28 — QCD +1 pt

Une alimentation adaptée doit être poursuivie chez un enfant diarrhéique.

Choix unique (Vrai/Faux)

& Vrai

& Faux

Question 29 — QCM +1 pt

Les complications à long terme de l'asthme sont (cochez la bonne réponse) :

Choix unique

- & Le retard scolaire
- & La tuberculose
- & La pneumonie
- & L'insuffisance respiratoire

Question 30 — QCD +1 pt

Les selles semi-liquides d'un nourrisson allaité ne doivent pas être confondues avec une diarrhée.

Choix unique (Vrai/Faux)

- & Vrai
- & Faux

Étude de cas — CAS CLINIQUE 2

Un nourrisson de 20 mois, né prématuré, pesant 8 kg, est amené au centre de santé pour fatigue importante et respiration rapide. Il a été sevré précocement et reçoit surtout du riz blanc avec une sauce pauvre en protéines. Les parents vivent dans des conditions socio-économiques défavorisées. À l'examen, l'enfant est très pâle, notamment au niveau des paumes et des plantes des pieds. Il est asthénique et polypnéique (FR 76/mn).

Question 31 — QCM +1 pt

Le diagnostic clinique le plus probable est :

Max 2 choix

- & Anémie clinique décompensée
- & Diarrhée aiguë avec déshydratation
- & Paludisme simple sans signe de gravité
- & Anémie sévère de l'enfant
- & Malnutrition aiguë sans retentissement clinique

Question 32 — QCM +1 pt

Les éléments du cas qui orientent vers une anémie sévère sont :

Max 4 choix

- & Sevrage précoce
- & Fatigue importante
- & Respiration rapide
- & Pâleur marquée des paumes et des plantes des pieds
- & Hémoglobine à 5,8 g/dl

Question 33 — QCM +1 pt

Les facteurs favorisant de l'anémie sévère, présents dans l'observation, sont :

Max 3 choix

- & Prématurité
- & Sevrage précoce
- & Alimentation pauvre en protéines animales
- & Conditions socio-économiques défavorisées
- & Vaccination complète

Question 34 — QCM +1 pt

Les trois examens complémentaires utiles pour rechercher la cause sont :

Max 3 choix

- & Hémogramme / NFS
- & Goutte épaisse ou frottis sanguin
- & Électrophorèse de l'hémoglobine
- & Radiographie du thorax systématique
- & Examen cytot bactériologique des urines systématique

Question 35 — QCM +1 pt

Les résultats attendus de l'hémogramme / NFS dans ce contexte peuvent être :

Max 3 choix

- & Anémie sévère car Hb < 7 g/dl
- & Anémie hypochrome microcytaire
- & Hémoglobine normale supérieure à 11 g/dl
- & La NFS ne permet pas de classer l'anémie

Question 36 — QCM +1 pt

Les causes possibles de cette anémie sévère chez l'enfant sont :

Max 3 choix

- & Carence en fer
- & Paludisme
- & Saignement
- & Drépanocytose

Question 37 — QCM +1 pt

Parmi les problèmes ou risques liés à cette anémie sévère, on peut craindre :

Max 3 choix

- & Défaillance des organes nobles
- & Défaillance cardiaque ou respiratoire
- & Troubles neurologiques par mauvaise oxygénation
- & Troubles de la coagulation
- & Absence totale de risque vital

Question 38 — QCM +1 pt

Quelle intervention urgente relève du rôle propre de l'agent de santé devant cet enfant au centre de santé ?

Max 4 choix

- & Accueillir l'enfant en urgence et l'installer en priorité
- & Organiser la référence urgente si l'enfant est vu en ESPC
- & Appeler le médecin si l'enfant est dans un hôpital de référence
- & Prescrire seul une transfusion sanguine immédiate
- & Surveiller les constantes

Question 39 — QCM +1 pt

Les complications ou problèmes associés à la malnutrition de l'enfant peuvent être :

Max 4 choix

- & Infections respiratoires répétées
- & Obésité uniquement
- & Hypoglycémie

& Anémie sévère

& Déshydratation

Question 40 — QCM +1 pt

Concernant l'asthme de l'enfant, l'une des réponses suivantes est fausse. Laquelle ? Cochez-la.

Choix unique

& C'est une maladie inflammatoire chronique des bronches

& Il se manifeste par des crises de dyspnée avec respiration sifflante

& L'exercice physique ne peut jamais déclencher une crise

& L'atopie familiale peut être un facteur intrinsèque

& Sa physiopathologie associe bronchospasme, inflammation et hypersécrétion

Question 41 — QCM +1 pt

Les principaux germes responsables de la méningite purulente sont :

Max 3 choix

& Pneumocoque

& Haemophilus influenzae

& Méningocoque

& Rotavirus

& Plasmodium falciparum

Question 42 — QCM +1 pt

Chez le nourrisson, les signes évocateurs de méningite purulente sont :

Max 4 choix

& Fièvre

& Refus de téter

& Raideur méningée

& Convulsions

& Fontanelle antérieure bombée

Question 43 — QCM +1 pt

Les facteurs de mauvais pronostic sont :

Max 4 choix

& Très jeune âge

& Retard diagnostique

& Retard de prise en charge

& Présence de complications

& Fièvre très élevée

Question 44 — QCM +1 pt

Les éléments de mauvaise tolérance de la fièvre chez l'enfant sont :

Max 3 choix

& Visage vultueux

& Cyanose péribuccale

& Cri plaintif

& Extrémités chaudes

& Conscience altérée

Question 45 — QCM +1 pt

Les facteurs favorisant de l'anémie de l'enfant comprennent :

Max 3 choix

& Prématurité ou faible poids de naissance

& Alimentation riche en fer et en vitamine C

& Bronchite aiguë

& Paludisme

& Parasitoses intestinales

Question 46 — QCD +1 pt

Le nouveau-né hypotrophe a un poids de naissance inférieur à 2500 g.

Choix unique (Vrai/Faux)

& Vrai

& Faux

Question 47 — QCM +1 pt

La principale complication métabolique du nouveau-né de mère diabétique est (cocher la bonne affirmation) :

Choix unique

& Hypokaliémie

& Hypocalcémie

& Hyponatrémie

& Hypoglycémie

Question 48 — QCD +1 pt

Les intoxications de l'enfant surviennent surtout au domicile et concernent fréquemment les enfants âgés de 1 à 5 ans.

Choix unique (Vrai/Faux)

& Vrai

& Faux

Question 49 — QCD +1 pt

La fièvre de l'enfant est toujours bien tolérée.

Choix unique (Vrai/Faux)

& Vrai

& Faux

Question 50 — QCM +1 pt

Parmi les éléments suivants, cochez les problèmes à redouter chez ce nouveau-né.

Max 3 choix

& Souffrance cérébrale

& Hypoglycémie

& Hypercalcémie

& Hypothermie

& Anémie

Question 51 — QCM +1 pt

En cas d'inhalation d'un toxique, il faut cocher la bonne réponse :

Choix unique

- & Enlever les vêtements
- & Donner du lait ou de l'huile
- & Donner du charbon végétal
- & Donner de l'oxygène

Question 52 — QCM +1 pt

Les problèmes liés à la diarrhée aiguë sont :

Max 3 choix

- & Déshydratation
- & Dénutrition
- & Problèmes d'hygiène
- & Hypoglycémie systématique

Question 53 — QCD +1 pt

Le cycle exo-érythrocytaire se fait au niveau des globules rouges.

Choix unique (Vrai/Faux)

- & Vrai
- & Faux

Question 54 — QCD +1 pt

Au cours de la malnutrition, on observe un déficit global et homogène en nutriments.

Choix unique (Vrai/Faux)

- & Vrai
- & Faux

Question 55 — QCD +1 pt

La déshydratation est une complication rare de la diarrhée aiguë.

Choix unique (Vrai/Faux)

- & Vrai
- & Faux

Question 56 — QCD +1 pt

Le paludisme est une maladie virale due à des hématozoaires du genre Plasmodium.

Choix unique (Vrai/Faux)

- & Vrai
- & Faux

Question 57 — QCM +1 pt

Les facteurs ci-dessous sont des facteurs environnementaux de l'asthme, sauf un. Lequel ?

Choix unique

- & Exposition aux allergènes
- & Occidentalisation du mode de vie
- & Asthme chez les parents
- & Tabagisme passif

Question 58 — QCM +1 pt

Les facteurs favorisant de l'anorexie du nourrisson peuvent être :

Max 4 choix

- & Hospitalisation récente de l'enfant
- & Enfant unique
- & Début de la diversification alimentaire
- & Mère autoritaire et rigide
- & Allaitement exclusif correctement conduit, sans difficulté

Question 59 — QCD +1 pt

Les infections respiratoires aiguës touchent uniquement le tractus respiratoire inférieur.

Choix unique (Vrai/Faux)

- & Vrai
- & Faux

Question 60 — QCD +1 pt

Le terme est généralement "e 37 SA chez le nouveau-né hypotrophe.

Choix unique (Vrai/Faux)

- & Vrai
- & Faux

FIN DE L'EXAMEN

Nombre de questions : 60 | Total : 60 points | Durée : 60 minutes