

APPAREIL GÉNITAL FÉMININ

QCM 1

A propos de l'artère utérine, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Elle est longue et sinueuse
- B. Elle croise l'uretère en passant au-dessus de lui
- C. Elle croise l'artère vaginale en passant en avant
- D. Elle vascularise le bord latéral de l'utérus par le paramètre
- E. Elle se termine par l'artère tubaire et l'artère ovarique médiales

QCM 2

A propos de l'ovaire, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il est relié à l'utérus par le ligament suspenseur de l'ovaire
- B. Il est relié à l'utérus par le ligament propre de l'ovaire
- C. Il est relié à la trompe utérine par le ligament suspenseur de l'ovaire
- D. Il est relié à la trompe utérine par le ligament propre de l'ovaire
- E. Il est relié au sacrum par le ligament propre de l'ovaire

QCM 3

A propos de la vulve, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le ligament rond se termine au niveau des grandes lèvres
- B. Les grandes lèvres sont situées latéralement aux petites lèvres
- C. Les corps caverneux, chez la femme, se réunissent en avant et forment le corps du clitoris
- D. La vulve est vascularisée en avant par les vaisseaux pudendaux internes
- E. Les glandes para-urétrales sont aussi appelées glandes de Skene

QCM 4

A propos des moyens de fixité de l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Les ligaments ronds, le ligament large, les ligaments utéro-sacraux et le paramètre fixent l'utérus à la paroi du corps
- B. Le ligament rond chemine dans le canal inguinal
- C. Le ligament large et le péritoine correspondent à une seule et même entité
- D. Le ligament large recouvre la face antéro-inférieure de l'utérus

QCM 5

A propos des ovaires, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Chez la nullipare, ils reposent dans la fosse infra-ovarique
- B. Les veines ovariennes naissent en L1-L2
- C. Le ligament infundibulo-ovarien les relie à l'utérus
- D. Leur face latérale répond en avant et en bas, chez la nullipare, à la trompe utérine
- E. Le mésovarium comprend les arcades vasculaires infra-ovariques

QCM 6

A propos du ligament large de l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. C'est une structure médiane et impaire
- B. Il comprend, entre autres, le mésosalpynx et le mésomètre
- C. Le paracervix en est la portion la plus caudale
- D. C'est une formation séreuse
- E. Son bord supérieur correspond au mésofuniculaire

QCM 7

A propos de la trompe utérine, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Elle forme avec le ligament rond de l'ovaire la fosse ovarique.
- B. C'est le lieu de la fécondation.
- C. Elle sous-tend le mésovarium.
- D. Elle comprend quatre parties : intra-utérine, l'isthme, le pavillon et l'infundibulum.
- E. Elle correspond au bord supérieur du ligament large.

QCM 8

A propos des annexes de l'utérus, indiquez la ou les réponse(s) exacte(s)

- A. L'ovaire est uniquement lié à la trompe par le mésovarium.
- B. La vascularisation des trompes vient des artères utérines et ovarique.
- C. Le ligament rond de l'utérus se perd dans le fascia pelvien pariétal.
- D. L'artère utérine se termine en deux branches vascularisant les annexes de l'utérus : les artères ovarique médiale et tubaire médiale.
- E. La trompe utérine est entièrement péritonisée.

QCM 9

A propos de l'ovaire, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'ovaire est la glande sexuelle paire, uniquement endocrine, de la femme.
- B. Il est situé dans la fosse ovarique, limitée par la trompe utérine et le ligament rond de l'utérus.
- C. Il est intra-péritonéal.
- D. Il mesure, chez l'adulte, 4 cm de long, 2 cm de large, 1 cm d'épaisseur.
- E. Sa structure comporte un épithélium superficiel, un cortex périphérique comportant les follicules ovariens, et une médulla centrale laissant passer les vaisseaux et neurofibres destinés à l'ovaire.

QCM 10

A propos des moyens de fixité de l'ovaire, indiquez la ou les proposition(s) fausse(s)

- A. Sans compter son mésovarium, l'ovaire donne insertion à 2 ligaments.
- B. Le ligament suspenseur de l'ovaire contient l'artère et les veines ovariennes.
- C. L'extrémité tubaire de l'ovaire donne insertion au ligament propre de l'ovaire.
- D. Les vaisseaux de l'ovaire sont situés dans le mésovarium, où ils forment des arcades infra-ovariennes.

QCM 11

A propos des rapports de l'ovaire, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La face latérale de l'ovaire répond, en haut, aux vaisseaux iliaques externes.
- B. La face médiale répond, en avant, à la trompe utérine.
- C. L'extrémité tubaire est proche des vaisseaux iliaques internes.
- D. L'extrémité tubaire donne insertion au ligament propre de l'ovaire.
- E. La face latérale de l'ovaire répond, à droite et en dehors, au cæcum et à l'appendice.

QCM 12

A propos de la vascularisation de l'ovaire, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La vascularisation artérielle de l'ovaire provient à 50% de l'artère utérine, et à 50% de l'artère ovarique.
- B. L'artère ovarique participe uniquement à la vascularisation de l'ovaire.
- C. Les veinules ovariennes forment dans le mésovarium un plexus veineux pampiniforme.
- D. L'artère ovarique donne également une branche pour l'uretère.
- E. Les veines ovariennes se jettent dans la VCI à droite, et dans la veine rénale gauche à gauche.

QCM 13

A propos de l'ovaire, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Chez la multipare, du fait de la grossesse, l'ovaire bascule dans la fosse infra-ovarique.
- B. D'une façon générale maintenant, l'ovaire présente une surface de couleur blanchâtre.
- C. Son bord mésovarique est situé légèrement en dessous du niveau de la trompe utérine.
- D. L'ovaire répond, en bas, au passage de l'uretère pelvien pariétal.
- E. Le hile de l'ovaire est contenu dans son bord libre.

QCM 14

A propos de la trompe utérine, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Elle forme, avec le ligament rond de l'ovaire, la fosse ovarique.
- B. C'est le lieu de la fécondation.
- C. Elle sous-tend le mésosalpynx.
- D. Elle présente 4 parties : la partie intra-utérine, l'isthme, le pavillon et l'infundibulum.
- E. Elle correspond au bord supérieur du ligament large.

QCM 15

A propos des annexes de l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'ovaire est uniquement lié à la trompe par le mésovarium.
- B. Leur vascularisation vient des artères utérines, ovariennes et ombilicale.
- C. La vascularisation de la trompe utérine provient à 50 % de l'artère ovarienne, à 50 % de l'artère utérine.
- D. L'artère utérine se termine en deux branches, vascularisant les annexes de l'utérus : les artères ovarienne et tubaire antérieures.
- E. La trompe utérine est presque entièrement péritonisée.

QCM 16

A propos du ligament large, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le ligament large est composé de 6 unités : mésomètre, mésosalpynx, mésofuniculaire, mésovarium, paramètre et paracervix.
- B. Le mésofuniculaire est soulevé par le ligament rond de l'utérus, et se dirige en avant et en dehors.
- C. Le ligament large est une structure impaire, correspondant à un voile de péritoine posé sur l'utérus et ses annexes.
- D. Le ligament large recouvre toutes les structures annexes de l'utérus.
- E. Le bord supérieur du ligament large est représenté par la trompe utérine dans son mésosalpynx.

QCM 17

A propos du ligament large, indiquez la ou les proposition(s) fausse(s)

- A. Le ligament large est discontinu, au niveau de ce qu'on appelle la "ligne limitante du ligament large".
- B. Le mésofuniculaire est situé dans un plan plus haut que celui du mésosalpynx.
- C. La fosse préovarienne est limitée en dehors par le passage des vaisseaux iliaques externes.
- D. Le ligament large est une lame péritonéale à double feuillet.
- E. Sous le ligament large passent des vaisseaux, nerfs et ligaments pelviens.

QCM 18

A propos du vagin, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le vagin est le centre biomécanique principal de soutien des viscères uro-génitaux pelviens.
- B. Le fornix vaginal antérieur s'insère au tiers supérieur, le fornix vaginal postérieur au tiers inférieur du col utérin.
- C. Sa face antérieure répond à la vessie, à une partie de l'uretère et à l'urètre.
- D. Sa face postérieure est convexe en bas et en arrière.

E. Le vagin est extrêmement solidaire, en avant, de la vessie et de l'urètre ; le clivage chirurgical entre ces organes sera ainsi très fastidieux.

QCM 19

A propos de la vascularisation du vagin, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le vagin est vascularisé, de haut en bas et de chaque côté, par les artères utérine, vaginale et rectale inférieure.
- B. Hors variations anatomiques, le vagin reçoit uniquement sa vascularisation de branches de l'artère iliaque interne.
- C. Les artères vaginales vascularisent le tiers supérieur du vagin.
- D. Les artères vaginales cheminent dans le paramètre.
- E. Le réseau veineux du vagin se draine dans la veine pudendale interne.

QCM 20

A propos du vagin, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le trigone vaginal répond directement au trigone vésical.
- B. La paroi postérieure du vagin présente un segment rectal, un segment anal et un segment périnéal.
- C. Sur les faces latérales du vagin se terminent les ligaments vaginaux latéraux.
- D. Une portion du muscle sphincter de l'urètre se termine sur le vagin.

QCM 21

A propos de l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il est physiologiquement antéversé et rétrofléchi
- B. Il est physiologiquement palpable chez la femme mince
- C. Sa taille et son aspect sont indépendants de la parité
- D. On lui décrit 2 parties : un corps et un col
- E. Le col est séparé en 2 parties : supra-vaginale et vaginale

QCM 22

Concernant l'ovaire, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Durant la période d'activité génitale les follicules de De Graaf font saillie à la surface de l'ovaire
- B. Le mésosalpynx s'ouvre au bord ant de l'ovaire en suivant une ligne sinueuse
- C. Le hile contient les vaisseaux ovariens à son pôle inférieur
- D. Sa vascularisation est assurée par l'artère ovarienne, branche génitale accessoire de l'artère hypogastrique

QCM 23

A propos de l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La cavité utérine est une cavité virtuelle
- B. La cavité utérine se poursuit par le canal cervical par l'ostium utérin
- C. Le canal cervical est une cavité virtuelle
- D. Les parois antérieure et postérieure du canal cervical sont marquées par les plis palmés
- E. Le canal cervical se poursuit par le vagin par l'ostium utérin

QCM 24

A propos des rapports de l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La face antéro-inférieure du corps repose sur la vessie
- B. La face antéro-inférieure du corps est péritonisée
- C. Le cul-de-sac vésico-utérin descend jusqu'à l'isthme
- D. Le cul-de-sac de Douglas descend jusqu'à l'isthme
- E. Le col utérin répond en avant au fundus vésical

QCM 25

A propos des moyens de fixité de l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Les ligaments utéro-sacraux délimitent latéralement le cul-de-sac de Douglas
- B. Le ligament utéro-sacral se termine sur les faces antérieures de S2, S3, S4
- C. Le ligament vésico-utérin naît du fundus vésical
- D. Le ligament vésico-utérin se termine sur l'isthme
- E. Le ligament rond naît en bas et en avant de la trompe utérine

QCM 26

A propos de la vascularisation de l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'utérus est principalement vascularisé par les artères utérines
- B. L'utérus est principalement drainé d'un point de vue veineux par les plexus latéro-utérins
- C. Les plexus latéro-utérins sont drainés par les veines pudendales internes
- D. L'utérus se draine dans les chaînes iliaques, inguinale et sacrale accessoire

QCM 27

A propos de l'embryologie de l'appareil génital féminin, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'appareil urinaire et l'appareil génital dérivent du mésoblaste intermédiaire
- B. Le pronéphros, le mésonéphros et le métanéphros apparaissent en même temps
- C. Le rein est issu du mésonéphros
- D. Le canal de Wolf est issu du mésonéphros
- E. Le canal de Muller croise dorsalement le canal de Wolf

QCM 28

A propos de l'embryologie de l'appareil génital féminin, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La crête génitale reste indifférenciée jusque S7
- B. Les cordons sexuels primitifs sont en contact avec l'épithélium coelomique
- C. L'épithélium coelomique n'est pas épaissi en période indifférenciée
- D. Le canal de Wolff se développe et le canal de Müller involue

QCM 29

A propos de l'embryologie de l'appareil génital féminin, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le canal utérovaginal donne l'utérus et la partie supérieure du vagin
- B. La plaque vaginale donne la partie inférieure du vagin
- C. L'éperon uro-rectal sépare le sinus urogénital du canal ano-rectal
- D. L'ouverture du pavillon de l'oviducte est permise par la mobilité de la trompe
- E. Le tubercule génital donne les petites et grandes lèvres

QCM 30

A propos des organes génitaux internes féminins, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'ovaire est un véritable organe intra-péritonéal: sa face médiale est donc en rapport direct avec le colon sigmoïde à gauche, et avec les anses grêles à droite.
- B. Chez la multipare, l'ovaire bascule en arrière et en dedans de l'uretère dans la fossette rétro-ovarienne.
- C. La fossette ovarienne est délimitée en haut par le passage des vaisseaux hypogastriques, et en arrière par les vaisseaux iliaques externes.
- D. Le ligament suspenseur de l'ovaire ainsi que le ligament infundibulo-ovarien se fixent au pôle tubaire de l'ovaire.
- E. La vascularisation de l'ovaire se fait au niveau de son bord mésovarique par l'intermédiaire du mésovarium.

QCM 31

A propos du petit bassin féminin, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La vessie est entièrement recouverte de péritoine
- B. Le paramètre est une portion de ligament large
- C. L'utérus est entièrement recouvert de péritoine
- D. La trompe est totalement extra-péritonéale
- E. Le bord mésoovarique de l'ovaire correspond au bord antérieur

QCM 32

A propos du ligament large, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. C'est du péritoine
- B. Il se coude sur les structures du petit bassin pour former des lames porte-vaisseaux
- C. Le mésofuniculaire correspond à l'accolement du ligament large sous la trompe de Fallope
- D. La fosse préovarique est située entre le mésofuniculaire et le mésovarium
- E. Chez la multipare, l'ovaire est repoussé dans la fosse rétro-ovarique, en arrière du pli soulevé par l'uretère

QCM 33

A propos de l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Fait partie des organes génitaux internes de la femme.
- B. Sa muqueuse subit des modifications cycliques tout au long de la vie de la femme.
- C. L'angle d'antéversion représente l'utérus qui s'appuie sur la vessie.
- D. L'isthme est en rapport direct avec le bord postérieur de la vessie.
- E. Le ligament rond de l'utérus se perd dans la grande lèvre ipsilatérale.

QCM 34

A propos du ligament large, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'aileron antérieur du ligament large est représenté par le mésosalpynx qui recouvre la trompe.
- B. La fosse préovarique est délimitée antérieurement par le mésofuniculaire en avant et le mésosalpynx en arrière.
- C. Le ligament large se poursuit antérieurement, latéralement et postérieurement par le péritoine pariétal de la cavité abdominale.
- D. Le feuillet antérieur du ligament large se poursuit par la fosse para-vésicale.

QCM 35

A propos des moyens de fixité de l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le ligament rond prend son origine en avant et en haut de l'origine de la trompe utérine
- B. Le paramètre s'organise autour de l'artère vaginale et s'attache le corps utérin
- C. Le ligament large est un moyen de fixité de l'utérus
- D. Il comprend des épaissements comme les paramètres et les paracervix
- E. La fosse ovarique contient l'ovaire chez la nullipare

QCM 36

A propos de l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le corps utérin repose sur le dôme vésical
- B. L'utérus est entièrement sous-péritonéal
- C. Son corps est antéversé selon un angle de 130°
- D. Il fait saillie dans le vagin
- E. Il est en rapport ventralement avec le noyau fibreux central du périnée

QCM 37

A propos de l'ovaire, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il s'agit d'une glande mixte
- B. Il est intra-péritonéal mais quasiment non péritonisé
- C. Le ligament propre de l'ovaire le solidarise à la paroi latérale du pelvis
- D. Sa face médiale est en regard des viscères abdominaux
- E. Il repose en arrière du mésopunculaire

QCM 38

A propos de la vascularisation de l'ovaire, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'artère ovarique médiale chemine en arrière de l'artère tubaire médiale
- B. L'ovaire est en partie tributaire de collatérales de l'artère hypogastrique
- C. La veine ovarique droite naît de la veine rénale droite en regard de L2
- D. L'artère ovarique droite naît de la veine cave inférieure en regard de L2
- E. Le drainage lymphatique de l'ovaire est aortico-cave

QCM 39

Parmi les artères suivantes, laquelle (lesquelles) ne vascularise(nt) pas le vagin ?

- A. L'artère hypogastrique
- B. L'artère ombilicale
- C. L'artère utérine
- D. L'artère rectale moyenne
- E. L'artère rectale inférieure
- F. L'artère vaginale

QCM 40

A propos du vagin, indiquez la ou les proposition(s) fausse(s)

- A. Son axe principal réalise un axe d'environ 140° ouvert dorsalement et caudalement
- B. Le cul de sac vaginal antérieur est plus profond que le cul de sac vaginal postérieur
- C. La portion crâniale des bords latéraux du vagin sont en rapport avec les paracervix
- D. La portion crâniale de la face ventrale du vagin est en rapport avec le trigone vésical
- E. La portion crâniale de la face dorsale du vagin est en rapport avec le cul de sac de Douglas

QCM 41

Concernant l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. C'est un organe musculo-membraneux
- B. Il est antéfléchi parce que le corps est incliné sur le col avec un angle de 130°
- C. Les insertions des ligaments utéro sacraux se font au niveau de la face postérieure de l'isthme utérin et la partie supra vaginale du col
- D. L'artère utérine a un segment pariétal, puis mésométrial, puis paramétrial
- E. Le paramètre est tendu latéralement du fornix vaginal à la paroi postéro latérale du pelvis
- F. L'insertion vaginale est oblique en bas et en avant

QCM 42

Concernant le ligament large, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il maintient l'utérus, les trompes et les ovaires
- B. Le mésomètre est formé par le prolongement du péritoine des faces ant et post de l'utérus
- C. Le méso soulevé par le ligament rond est le mésosalpynx
- D. Le mésovarium sépare le récessus tubo ovarique en bas de la fosse ovarique en haut
- E. La face antéro inférieure du ligament large est marquée par le mésopunculaire qui sépare les fosses paravésicales et pré ovariennes

QCM 43

Concernant les ovaires et la trompe, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le ligament propre de l'ovaire correspond au ligament utéro-ovarien
- B. Les ovaires ont la même position chez la nullipare et chez la multipare
- C. La face médiale est en rapport à gauche avec le colon sigmoïde et à droite avec le caecum
- D. La trompe possède 4 parties différentes : utérine puis isthmique puis infundibulaire puis ampullaire
- E. La portion isthmique mesure 5 à 6 mm de long

QCM 44

A propos de l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il s'agit d'un organe antéversé selon un angle de 130°
- B. Il est principalement maintenu par le ligament large
- C. Les ligaments ronds de l'utérus s'insèrent en avant des trompes utérines
- D. Les ligaments utéro-sacrés répondent en dedans au cul de sac de Douglas
- E. L'artère utérine s'infléchit de bas en haut au niveau du col utérin

QCM 45

A propos de l'ovaire, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il s'agit d'un organe intrapéritonéal non péritonisé.
- B. Le ligament propre de l'ovaire suspend ce dernier à la paroi lombaire
- C. La ligne limitante du péritoine suit le bord mésovarique de l'ovaire.
- D. Le mésosalpynx se replie sur la face médiale de l'ovaire.
- E. La veine ovarique droite naît de la veine cave inférieure

QCM 46

A propos du ligament large, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il s'agit d'un repli caudal de péritoine
- B. Les anses grêles reposent sur sa face postéro-supérieure
- C. Ses replis forment, de haut en bas, les paramètres, puis mésomètres et enfin paracervix
- D. Le paramètre est une formation conjonctive où chemine notamment l'uretère
- E. La fossette préovarique se positionne en avant du mésosalpynx

QCM 47

L'artère utérine a pour collatérales les artères

- A. vésico-vaginale
- B. urétrale
- C. fundique
- D. tubaire latérale
- E. tubaire médiale

QCM 48

A propos de la trompe utérine, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. est aussi appelée mésosalpynx
- B. est usuellement séquencée en 4 portions, dont la première est la portion isthmique
- C. est en rapport, dans sa portion ampullaire, avec le côlon sigmoïde à droite
- D. se termine par le ligament infundibulo-ovarique

QCM 49

L'ovaire est relié (indiquez la ou les proposition(s) exacte(s))

- A. à l'utérus par le ligament suspenseur de l'ovaire
- B. à l'utérus par le ligament propre de l'ovaire
- C. à la trompe utérine par le ligament suspenseur de l'ovaire

- D. à la trompe utérine par le ligament propre de l'ovaire
- E. au sacrum par le ligament propre de l'ovaire

QCM 50

A propos de l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il s'agit d'un organe antéversé selon un angle de 120°.
- B. Il répond latéralement, selon un axe cranio-caudal, au paramètre, au mésomètre puis au paracervix.
- C. Le ligament large est un repli caudal du péritoine pariétal.
- D. La partie vaginale du col est séparée du vagin par un cul de sac annulaire plus profond dorsalement.
- E. L'uretère surcroise l'artère utérine 2 cm en dehors du col utérin.

QCM 51

A propos de l'ovaire, indiquez la ou les proposition(s) fausse(s)

- A. Il s'agit d'un organe intrapéritonéal non péritonisé.
- B. Chez la nullipare, il repose dans une fosse limitée dorsalement par les vaisseaux hypogastriques et l'uretère.
- C. La ligne limitante du péritoine suit le bord mésovarique de l'ovaire.
- D. Le mésosalpynx se replie sur la face médiale de l'ovaire.
- E. La veine ovarique droite naît de la veine rénale droite.

QCM 52

A propos du vagin, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il décrit dans un plan sagittal une concavité dorsale.
- B. Il est en rapport caudalement avec le cul de sac de Douglas.
- C. Le paramètre assure entre autre sa fixité aux parois pelviennes.
- D. L'orifice externe du vagin est en rapport latéralement avec les bulbes vestibulaires.
- E. Le muscle compresseur de l'urètre s'insère entre autre sur ses faces latérales.

QCM 53

A propos de l'appareil génital féminin, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'utérus est antéfléchi sur le vagin selon un angle de 120° environ.
- B. La face postéro-supérieure du col utérin répond au cul-de-sac de Douglas.
- C. L'infundibulum de la trompe perfore le péritoine par des franges irrégulières.
- D. L'artère utérine croise l'uretère puis s'engage dans le mésomètre pour sillonner le long du bord latéral de l'utérus.
- E. La vascularisation de l'ovaire est double : un réseau externe courant sous le ligament lombo-ovarien et un réseau interne courant sous le mésovarium.

QCM 54

Concernant l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. C'est un organe musculo-membraneux
- B. La base de l'utérus est concave
- C. L'isthme utérin se divise en une partie supra vaginale et en une partie vaginale
- D. L'utérus est antéversé parce que l'orifice du col regarde en arrière
- E. Il est antéfléchi parce que le corps est incliné sur le col avec un angle de 120°

QCM 55

Concernant l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Les insertions des ligaments utéro sacraux se font au niveau de la face postérieure de l'isthme utérin et la partie supra vaginale du col
- B. L'insertion vaginale est oblique en bas et en avant
- C. Dans la tunique musculaire, la couche sous muqueuse est faite de faisceaux circulaires

- D. Le ligament rond naît à la partie antérolatérale de la corne utérine en avant et en haut de la trompe
- E. Le paramètre est tendu latéralement du fornix vaginal à la paroi postéro latérale du pelvis

QCM 56

Concernant le ligament large, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il maintient l'utérus, les trompes et les ovaires
- B. Le mésomètre est formé par le prolongement du péritoine des faces ant et post de l'utérus
- C. Le méso soulevé par le ligament rond est le mésosalpynx
- D. Le mésovarium sépare le récessus tubo ovarique en bas de la fosse ovarique en haut
- E. La face antéro inférieure du ligament large est marquée par le mésofuniculaire qui sépare les fosses paravésicales et pré ovariennes

QCM 57

A propos de l'appareil génital féminin, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'antéversion éloigne particulièrement le corps de l'utérus du rectum.
- B. Chez la multipare, le fond utérin est concave en bas.
- C. L'uretère croise l'artère Utérine en avant à 2,5 cm du col utérin dans le mésométrium.
- D. Le vagin s'insère selon une ligne oblique en bas et en arrière et constitue par ses cul-de-sac vaginaux le museau de tanche.
- E. Le myomètre comprend 4 couches musculaires mal-définies : de dehors en dedans, longitudinale, circulaire externe, moyenne plexiforme et circulaire interne.

QCM 58

A propos de l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il est constitué d'un corps et d'une base réunis par un col
- B. Il est antéversé et antéfléchi
- C. Le ligament utéro-sacré s'insère sur le corps utérin en arrière de la trompe
- D. En avant de l'isthme on trouve le cul de sac vésico-utérin
- E. Le museau de Tanche est séparé du vagin par les culs de sac vaginaux médial et latéral

QCM 59

Concernant le ligament large, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il s'agit d'une expansion latérale du péritoine
- B. La face antéro-inférieure s'ouvre au contact de l'ovaire au niveau du mésovarium
- C. Le bord interne est en rapport avec l'artère utérine
- D. Le mésosalpynx contient la trompe utérine et le ligament rond
- E. Le bord inférieur est séparé du périnée par l'espace pelvi-rectal sup

QCM 60

Concernant les moyens de fixité de l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le ligament rond relie l'angle supérieur de l'utérus à la région inguinale
- B. Le ligament rond soulève le ligament large formant l'aileron antérieur
- C. La concavité délimitée par les 2 ligaments utéro-sacrés contient le cul de sac vésico-utérin de Douglas
- D. Le ligament large est soulevé par les ligaments utéro-sacrés formant l'aileron post
- E. Le ligament propre de l'ovaire se termine au pôle supérieur de l'ovaire

QCM 61

Concernant l'artère utérine, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)


- A. C'est la branche génitale principale de l'artère épigastrique
- B. Elle croise l'uretère par en dessous 2 cm en dehors du col utérin
- C. Elle donne des branches : cervicales, cervico-diaphysaires ainsi qu'une branche fundique

- D. Elle se continue au bord inférieur de la trompe par l'artère tubaire médiale
- E. L'artère tubaire médiale se termine en s'anastomosant avec l'artère tubaire latérale, branche de l'artère ovarienne

QCM 62

Concernant les trompes utérines, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Elles sont constituées de 4 portions
- B. La fécondation s'effectue dans le pavillon de la trompe
- C. La portion interstitielle s'ouvre dans le col utérin par l'ostium utérin
- D. Chez la nullipare l'ampoule est horizontale
- E. La muqueuse déborde des franges du pavillon



FACULTE DE MEDECINE & MAIEUTIQUE
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE

CORRECTION

1	ABCDE	31	E	61	DE
2	B	32	ABE	62	AE
3	ABCE	33	ACE		
4	ABC	34	BCD		
5	BE	35	CE		
6	BD	36	ABD		
7	BE	37	ABDE		
8	BD	38	ABE		
9	C	39	BE		
10	ACD	40	AB		
11	B	41	BCF		
12	ACE	42	AB		
13	ABC	43	AC		
14	BCE	44	CDE		
15	E	45	ACD		
16	BDE	46	ADE		
17	ABCD	47	AE		
18	CE	48	D		
19	B	49	B		
20	D	50	CD		
21	BE	51	BE		
22	A	52	ABD		
23	AD	53	BC		
24	ABDE	54	DE		
25	BE	55	BC		
26	ABD	56	AB		
27	AD	57	BE		
28	B	58	BD		
29	ABCD	59	ACE		
30	BDE	60	AB		

FACULTE DE MEDECINE & MAIEUTIQUE
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE