

## **ANNEE ACADEMIQUE 2020**

### **SUET DE MEDECINE L2 (NEPHRO- UROLOGIE) I**

#### **VERSION A**

**QCD : 1 Réponse juste = + 1 ; 1 Réponse fausse = - 1 ; sans Réponse = 0**

**QCD : Cochez par : A = VRAI ; B = FAUX**

**Q01-** La néphrologie étudie le rein. A

**Q02-** L'unité fonctionnelle du rein est le néphron. A

**Q03-** Les voies urinaires commencent à partir des petits calices. A

**Q04-** Le bassinnet émerge du rein au niveau du hile. A

**Q05-** Le maintien de l'équilibre au milieu intérieur comprend l'équilibre hydrique et électrolytique. B

**Q06-** Il existe trois formes d'insuffisance aigue. B

**Q07-** L'ischémie est une des causes de l'insuffisance rénale. B

**Q08-** L'anurie est l'un des symptômes de l'insuffisance rénale aigue. A

**Q09-** Le diabète sucré peut être responsable d'une insuffisance rénale chronique. A

**Q10-** La glomérulonéphrite aiguë est due à une infection à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. A

**Q11-** La restriction hydrique et la modification du PH sont responsables de la lithiase urinaire. A

**Q12-** La colique néphrétique est caractérisée par une douleur bilatérale. B

**Q13-** Le rôle de l'IDE dans prévention de la lithiase urinaire est de dire à la population de boire au moins 1500ml d'eau par 24heures. **A**

**Q14-** Les objectifs de soins de la lithiase urinaire consistent à soulager la douleur, prévenir l'infection et éviter les récives. **A**

**Q15-** La néphropathie gravidique touche 5% des gestantes. **A**

**Q16-** La néphropathie gravidique guérit avec la grossesse sans séquelle. **A**

**Q17-** La néphropathie gravidique ne récidive pas lors de grossesses ultérieures. **A**

**Q18-** L'hypertension artérielle seule au troisième trimestre de grossesse suffit pour poser le diagnostic de néphropathie gravidique. **A**

**Q19-** La complication majeure est l'éclampsie. **A**

**Q20-** Dans la néphropathie gravidique ajoutée la guérison n'est pas complète après l'accouchement. **A**

**Q21-** La néphropathie gravidique ajoutée s'aggrave lors des grossesses ultérieures. **A**

**Q22-** La tuberculose peut se développer au dépend de la trompe. **A**

**Q23-** Dans l'épreuve des trois verres, s'il y a du sang dans trois verres, l'hématurie est vésicale. **B**

**Q24-** Une des complications du sondage vésicale est l'infection. **A**

**Q25-** Dans les tubulo-néphrite aigues, l'atteinte du tube proximal entraine un diabète rénal. **A**

**Q26-** La diurèse urinaire se mesure en 24heures. **A**

**Q27-** La rétention vésicale est l'impossibilité complète ou partielle d'obtenir l'évacuation vésicale. **A**

**Q28-** L'énurésie est une forme d'incontinence fonctionnelle chez l'enfant jusqu'à l'âge de trois ans. **A**

**Q29-** L'albuminurie est la présence de protéines dans les urines. **A**

**Q30-** Chaque homme possède deux uretères. **A**

## ANNEE ACADEMIQUE 2020

### SUET DE MEDECINE L2 (NEPHRO- UROLOGIE) I

#### VERSION B

**QCD : 1 Réponse juste = + 1 ; 1 Réponse fausse = - 1 ; sans Réponse = 0**

**QCD : Cochez par : A = VRAI ; B = FAUX**

**Q01-** La néphropathie gravidique ajoutée s'aggrave lors des grossesses ultérieures. **A**

**Q02-** La tuberculose peut se développer au dépend de la trompe. **A**

**Q03-** Dans l'épreuve des trois verres, s'il y a du sang dans trois verres, l'hématurie est vésicale. **B**

**Q04-** Une des complications du sondage vésicale est l'infection. **A**

**Q05-** Dans les tubulo-néphrite aiguës, l'atteinte du tube proximal entraîne un diabète rénal. **A**

**Q06-** La diurèse urinaire se mesure en 24heures. **A**

**Q07-** La rétention vésicale est l'impossibilité complète ou partielle d'obtenir l'évacuation vésicale. **A**

**Q08-** L'énurésie est une forme d'incontinence fonctionnelle chez l'enfant jusqu'à l'âge de trois ans. **A**

**Q09-** L'albuminurie est la présence de protéines dans les urines. **A**

**Q10-** Chaque homme possède deux uretères. **A**

**Q11-** La néphrologie étudie le rein. **A**

**Q12-** L'unité fonctionnelle du rein est le néphron. **A**

**Q13-** Les voies urinaires commencent à partir des petites calices. **A**

- Q14-** Le bassinet émerge du rein au niveau du hile. **A**
- Q15-** Le maintien de l'équilibre au milieu intérieur comprend l'équilibre hydrique et électrolytique. **B**
- Q16-** Il existe trois formes d'insuffisance aigue. **B**
- Q17-** L'ischémie est une des causes de l'insuffisance rénale. **B**
- Q18-** L'anurie est l'un des symptômes de l'insuffisance rénale aigue. **A**
- Q19-** Le diabète sucré peut être responsable d'une insuffisance rénale chronique. **A**
- Q20-** La glomérulonéphrite aiguë est due à une infection à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. **A**
- Q21-** La restriction hydrique et la modification du PH sont responsables de la lithiase urinaire. **A**
- Q22-** La colique néphrétique est caractérisée par une douleur bilatérale. **B**
- Q23-** Le rôle de l'IDE dans prévention de la lithiase urinaire est de dire à la population de boire au moins 1500ml d'eau par 24heures. **A**
- Q24-** Les objectifs de soins de la lithiase urinaire consistent à soulager la douleur, prévenir l'infection et éviter les récives. **A**
- Q25-** La néphropathie gravidique touche 5% des gestantes. **A**
- Q26-** La néphropathie gravidique guérit avec la grossesse sans séquelle. **A**
- Q27-** La néphropathie gravidique ne récidive pas lors de grossesses ultérieures. **A**
- Q28-** L'hypertension artérielle seule au troisième trimestre de grossesse suffit pour poser le diagnostic de néphropathie gravidique. **A**
- Q29-** La complication majeure est l'éclampsie. **A**
- Q30-** Dans la néphropathie gravidique ajoutée la guérison n'est pas complète après l'accouchement. **A**

## ANNEE ACADEMIQUE 2020

### SUET DE MEDECINE L2 (NEPHRO- UROLOGIE) I

#### VERSION C

**QCD : 1 Réponse juste = + 1 ; 1 Réponse fausse = - 1 ; sans Réponse = 0**

**QCD : Cochez par : A = VRAI ; B = FAUX**

**Q01-** La néphropathie gravidique touche 5% des gestantes. A

**Q02-** La néphropathie gravidique guérit avec la grossesse sans séquelle. A

**Q03-** La néphropathie gravidique ne récidive pas lors de grossesses ultérieures. A

**Q04-** L'hypertension artérielle seule au troisième trimestre de grossesse suffit pour poser le diagnostic de néphropathie gravidique. A

**Q05-** La complication majeure est l'éclampsie. A

**Q06-** Dans la néphropathie gravidique ajoutée la guérison n'est pas complète après l'accouchement. A

**Q07-** La néphropathie gravidique ajoutée s'aggrave lors des grossesses ultérieures. A

**Q08-** La tuberculose peut se développer au dépend de la trompe. A

**Q09-** Dans l'épreuve des trois verres, s'il y a du sang dans trois verres, l'hématurie est vésicale. B

**Q10-** Une des complications du sondage vésicale est l'infection. A

**Q11-** Dans les tubulo-néphrite aiguës, l'atteinte du tube proximal entraîne un diabète rénal. A

**Q12-** La diurèse urinaire se mesure en 24heures. A

**Q13-** La rétention vésicale est l'impossibilité complète ou partielle d'obtenir l'évacuation vésicale. **A**

**Q14-** L'énurésie est une forme d'incontinence fonctionnelle chez l'enfant jusqu'à l'âge de trois ans. **A**

**Q15-** L'albuminurie est la présence de protéines dans les urines. **A**

**Q16-** Chaque homme possède deux uretères. **A**

**Q17-** La néphrologie étudie le rein. **A**

**Q18-** L'unité fonctionnelle du rein est le néphron. **A**

**Q19-** Les voies urinaires commencent à partir des petites calices. **A**

**Q20-** Le bassinnet émerge du rein au niveau du hile. **A**

**Q21-** Le maintien de l'équilibre au milieu intérieur comprend l'équilibre hydrique et électrolytique. **B**

**Q22-** Il existe trois formes d'insuffisance aigue. **B**

**Q23-** L'ischémie est une des causes de l'insuffisance rénale. **B**

**Q24-** L'anurie est l'un des symptômes de l'insuffisance rénale aigue. **A**

**Q25-** Le diabète sucré peut être responsable d'une insuffisance rénale chronique. **A**

**Q26-** La glomérulonéphrite aiguë est due à une infection à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. **A**

**Q27-** La restriction hydrique et la modification du PH sont responsables de la lithiase urinaire. **A**

**Q28-** La colique néphrétique est caractérisée par une douleur bilatérale. **B**

**Q29-** Le rôle de l'IDE dans prévention de la lithiase urinaire est de dire à la population de boire au moins 1500ml d'eau par 24heures. **A**

**Q30-** Les objectifs de soins de la lithiase urinaire consistent à soulager la douleur, prévenir l'infection et éviter les récives. **A**

## ANNEE ACADEMIQUE 2020

### SUET DE MEDECINE L2 (NEPHRO- UROLOGIE) II

#### VERSION A

**QCD : 1 Réponse juste = + 1 ; 1 Réponse fausse = - 1 ; sans Réponse = 0**

**QCD : Cochez par : A = VRAI ; B = FAUX**

**Q01-** L'urologie est la science médicale qui étudie l'arbre urinaire. **A**

**Q02-** La capsule de *Bowman* est la membrane basale qui entoure le glomérule de *MALPIGHI*. **A**

**Q03-** L'urètre fait suite aux bassinets. **B**

**Q04-** L'urée est le déchet du métabolisme des protides. **B**

**Q05-** L'insuffisance rénale est une défaillance soudaine, souvent transitoire de la fonction excrétrice rénale. **A**

**Q06-** L'hypovolémie est une des causes de l'insuffisance rénale. **A**

**Q07-** L'oligurie est l'un des symptômes de l'insuffisance rénale chronique. **A**

**Q08-** L'anémie est l'une des caractéristiques hématologique de l'insuffisance rénale. **A**

**Q09-** La glomérulonéphrite aiguë survient chez l'enfant de 5 à 12 ans. **A**

**Q10-** La lithiase urinaire est la formation de caillots de sang dans les voies excrétrices. **B**

**Q11-** La colique néphrétique est caractérisée par une douleur unilatérale. **A**

**Q12-** La douleur de la colique irradie de l'uretère vers la vessie et organe génitaux. **A**

**Q13-** La néphrectomie percutanée est le traitement dans 90% de la lithiase urinaire. **B**

**Q14-** La néphropathie gravidique désigne les troubles rénaux observés au cours de la grossesse. **A**

**Q15-** La néphropathie gravidique survient chez les multipares. **B**

**Q16-** La néphropathie gravidique apparait au troisième trimestre de la grossesse. **A**

**Q17-** La protéinurie seule au troisième trimestre de grossesse suffit pour poser le diagnostic de néphropathie gravidique. **A**

**Q18-** La complication majeure est la mort fœtale. **A**

**Q19-** La néphropathie gravidique ajoutée survient dès les premiers mois de grossesse. **A**

**Q20-** La néphropathie gravidique ajoutée peu réapparaître lors de grossesse ultérieure. **A**

**Q21-** La tuberculose peut se développer au dépend de la vésicule séminale. **A**

**Q22-** L'ASP montre les calcifications dans la tuberculose urinaire. **A**

**Q23-** Le traitement de la tuberculose quelque soit sa localisation est identique à celui de la tuberculose pulmonaire. **A**

**Q24-** Dans l'épreuve des trois verres, s'il y a du sang dans deux verres, l'hématurie est vésicale. **A**

**Q25-** Le sondage urinaire se pratique en cas de traumatisme de l'urètre. **B**

**Q26-** Dans les tubulo-néphrites aiguës, l'atteinte du tube distal entraîne une acidose rénale. **A**

**Q27-** La valeur normale de la diurèse est d'environ 1500ml. **A**

**Q28-** L'hématurie est la présence de sang dans les urines. **A**

**Q29-** La dysurie est l'expression d'un obstacle sur les voies urinaires. **A**

**Q30-** Les reins sont des organes abdominaux. **A**

## ANNEE ACADEMIQUE 2020

### SUET DE MEDECINE L2 (NEPHRO- UROLOGIE) II

#### VERSION B

**QCD : 1 Réponse juste = + 1 ; 1 Réponse fausse = - 1 ; sans Réponse = 0**

**QCD : Cochez par : A = VRAI ; B = FAUX**

**Q01-** La tuberculose peut se développer au dépend de la vésicule séminale. **A**

**Q02-** L'ASP montre les calcifications dans la tuberculose urinaire. **A**

**Q03-** Le traitement de la tuberculose quelque soit sa localisation est identique à celui de la tuberculose pulmonaire. **A**

**Q04-** Dans l'épreuve des trois verres, s'il y a du sang dans deux verres, l'hématurie est vésicale. **A**

**Q05-** Le sondage urinaire se pratique en cas de traumatisme de l'urètre. **A**

**Q06-** Dans les tubulo-néphrites aiguës, l'atteinte du tube distal entraîne une acidose rénale. **A**

**Q07-** La valeur normale de la diurèse est d'environ 1500ml. **A**

**Q08-** L'hématurie est la présence de sang dans les urines. **A**

**Q09-** La dysurie est l'expression d'un obstacle sur les voies urinaires. **A**

**Q10-** Les reins sont des organes abdominaux. **A**

**Q11-** L'urologie est la science médicale qui étudie l'arbre urinaire. **A**

**Q12-** La capsule de *Bowman* est la membrane basale qui entoure le glomérule de *MALPIGHI*. **A**

**Q13-** L'urètre fait suite aux bassinets. **B**

- Q14-** L'urée est le déchet du métabolisme des protides. **A**
- Q15-** L'insuffisance rénale défaillance soudaine, souvent transitoire de la fonction excrétrice rénale. **A**
- Q16-** L'hypovolémie est une des causes de l'insuffisance rénale. **A**
- Q17-** L'oligurie est l'un des symptômes de l'insuffisance rénale chronique. **A**
- Q18-** L'anémie est l'une des caractéristiques hématologique de l'insuffisance rénale. **A**
- Q19-** La glomérulonéphrite aiguë survient chez l'enfant de 5 à 12 ans. **A**
- Q20-** La lithiase urinaire est la formation de caillots de sang dans les voies excrétrices. **B**
- Q21-** La colique néphrétique est caractérisée par une douleur unilatérale. **A**
- Q22-** La douleur de la colique irradie de l'uretère vers la vessie et organe génitaux. **A**
- Q23-** La néphrectomie percutanée est le traitement dans 90% de la lithiase urinaire. **B**
- Q24-** La néphropathie gravidique désigne les troubles rénaux observés au cours de la grossesse. **A**
- Q25-** La néphropathie gravidique survient chez les multipares. **B**
- Q26-** La néphropathie gravidique apparaît au troisième trimestre de la grossesse. **A**
- Q27-** La protéinurie seule au troisième trimestre de grossesse suffit pour poser le diagnostic de néphropathie gravidique. **A**
- Q28-** La complication majeure est la mort fœtale. **A**
- Q29-** La néphropathie gravidique ajoutée survient dès les premiers mois de grossesse. **A**
- Q30-** La néphropathie gravidique ajoutée peu réapparaître lors de grossesse ultérieure. **A**

## ANNEE ACADEMIQUE 2020

### SUET DE MEDECINE L2 (NEPHRO- UROLOGIE) II

#### VERSION C

**QCD : 1 Réponse juste = + 1 ; 1 Réponse fausse = - 1 ; sans Réponse = 0**

**QCD : Cochez par : A = VRAI ; B = FAUX**

**Q01-** La colique néphrétique est caractérisée par une douleur unilatérale. **A**

**Q02-** La douleur de la colique irradie de l'uretère vers la vessie et organe génitaux. **A**

**Q03-** La néphrectomie percutanée est le traitement dans 90% de la lithiase urinaire. **B**

**Q04-** La néphropathie gravidique désigne les troubles rénaux observés au cours de la grossesse. **A**

**Q05-** La néphropathie gravidique survient chez les multipares. **B**

**Q06-** La néphropathie gravidique apparait au troisième trimestre de la grossesse. **A**

**Q07-** La protéinurie seule au troisième trimestre de grossesse suffit pour poser le diagnostic de néphropathie gravidique. **A**

**Q08-** La complication majeure est la mort fœtale. **A**

**Q09-** La néphropathie gravidique ajoutée survient dès les premiers mois de grossesse. **A**

**Q10-** La néphropathie gravidique ajoutée peu réapparaître lors de grossesse ultérieure. **A**

**Q11-** La néphropathie gravidique ajoutée peu réapparaître lors de grossesse ultérieure. **A**

**Q12-** La tuberculose peut se développer au dépend de la vésicule séminale. **A**

**Q13-** L'ASP montre les calcifications dans la tuberculose urinaire. **A**

**Q14-** Le traitement de la tuberculose quelque soit sa localisation est identique à celui de la tuberculose pulmonaire. **A**

**Q15-** Dans l'épreuve des trois verres, s'il y a du sang dans deux verres, l'hématurie est vésicale. **A**

**Q16-** Le sondage urinaire se pratique en cas de traumatisme de l'urètre. **B**

**Q17-** Dans les tubulo-néphrites aiguës, l'atteinte du tube distal entraîne une acidose rénale. **A**

**Q18-** La valeur normale de la diurèse est d'environ 1500ml. **A**

**Q19-** L'hématurie est la présence de sang dans les urines. **A**

**Q29-** La dysurie est l'expression d'un obstacle sur les voies urinaires. **A**

**Q20-** Les reins sont des organes abdominaux. **A**

**Q21-** L'urologie est la science médicale qui étudie l'arbre urinaire. **A**

**Q22-** La capsule de *Bowman* est la membrane basale qui entoure le glomérule de *MALPIGHI*. **A**

**Q23-** L'urètre fait suite aux bassinets. **B**

**Q24-** L'urée est le déchet du métabolisme des protéides. **B**

**Q25-** L'insuffisance rénale est une défaillance soudaine, souvent transitoire de la fonction excrétrice rénale. **A**

**Q26-** L'hypovolémie est une des causes de l'insuffisance rénale. **A**

**Q27-** L'oligurie est l'un des symptômes de l'insuffisance rénale chronique. **A**

**Q28-** L'anémie est l'une des caractéristiques hématologique de l'insuffisance rénale. **A**

**Q29-** La glomérulonéphrite aiguë survient chez l'enfant de 5 à 12 ans. **A**

**Q30-** La lithiase urinaire est la formation de caillots de sang dans les voies excrétrices.