

TD PEC Pathologies médicales (IST-VIH-SIDA-OEV) — L2

TRAVAUX DIRIGÉS

Prise en charge des pathologies médicales

IST · VIH/SIDA · OEV

Filière : Licence 2 — Infirmier(ère) Diplômé(e) d'État (IDE)

Discipline : PEC des Pathologies Médicales

40 questions — 40 points

Nom : _____ Date : _____

Document TD — sans corrigé

PARTIE I — QUESTIONS GÉNÉRALES (1 à 21)

Consigne : pour chaque question, cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

Question 1 QCD · Vrai / Faux

Si l'HTA du patient entraîne une dyspnée, il sera nécessaire de l'installer en position latérale de sécurité.

A. Vrai

B. Faux

Question 2 QCD · Vrai / Faux

Lorsque la PAS < 140 mmHg et la PAD < 90 mmHg, on parle d'HTA isolée selon la classification de l'OMS.

A. Vrai

B. Faux

Question 3 QCM · Max 2 choix

Les principales complications de la glomérulonéphrite sont : cochez les deux intrus.

A. l'encéphalopathie hypertensive

B. l'insuffisance cardiaque

C. La lithiase urinaire

D. l'œdème pulmonaire

E. l'insuffisance rénale terminale

F. La prostatite

Question 4 QCM · Choix unique

La physiopathologie de l'UGD est marquée par trois éléments : cochez l'intrus.

A. Forte production de sécrétions acides (pepsine et acide chlorhydrique) permettant la digestion au sein de l'estomac.

B. Production de mucus par l'estomac pour se protéger de ces éléments chimiques puissants qui s'opposent à l'action de la pepsine et de l'acide chlorhydrique.

C. Lorsque la production de mucus n'est pas excessive ou adéquate, il s'ensuit alors la formation d'un ulcère.

D. L'UGD résulte donc du déséquilibre entre l'agression chlorhydropeptique et les mécanismes de défense (barrière muqueuse) en un point précis de la muqueuse.

Question 5 QCD · Vrai / Faux

Dans la crise d'OAP, la position demi-assise, jambes pendantes, réduit le retour veineux périphérique.

- A. Vrai
- B. Faux

Question 6 QCM · Choix unique

Dans le syndrome œdémato-ascitique, la ponction d'ascite montre qu'il s'agit généralement d'un transsudat avec :

- A. liquide clair eau de roche
- B. liquide citrin
- C. liquide hématique
- D. liquide séreuse

Question 7 QCM · Max 2 choix

Parmi les propositions suivantes concernant la PrEP, deux sont fausses. Lesquelles ?

- A. C'est un outil de traitement de l'infection à VIH.
- B. C'est un outil de prévention de l'infection à VIH.
- C. Elle consiste en la prise d'antirétroviraux par une personne non infectée exposée utilisant des préservatifs.
- D. Elle consiste en la prise d'antirétroviraux par une personne non infectée exposée à un haut risque de contracter le VIH.
- E. La voie d'administration de ces antirétroviraux est uniquement orale.

Question 8 QCM · Choix unique

Le traitement HAART signifie :

- A. High Active Antiretroviral Therapy
- B. High Antiretroviral Active Therapy
- C. High Therapy Active Antiretroviral
- D. High Active Therapy Antiretroviral

Question 9 QCM · Max 2 choix

Les 4 principaux symptômes en rhumatologie sont : cochez les deux intrus.

- A. l'instabilité
- B. l'arthrose
- C. la douleur
- D. la boiterie
- E. la raideur
- F. la scoliose

Question 10 QCM · Max 2 choix

Il existe deux formes de cirrhose fréquemment rencontrées. Lesquelles ?

- A. les cirrhoses alcooliques
- B. les cirrhoses biliaires
- C. les cirrhoses hépatiques
- D. les cirrhoses de causes inconnues

Question 11 QCM · Choix unique

Le plus souvent, la crise d'asthme est annoncée par les prodromes suivants, sauf un. Lequel ?

- A. éternuements
- B. toux

- C. céphalées
- D. prurit
- E. rhinorrhée
- F. état d'anxiété

Question 12 QCD · Vrai / Faux

Le traitement antirétroviral doit être adapté au type de virus.

- A. Vrai
- B. Faux

Question 13 QCD · Vrai / Faux

Les contraceptifs hormonaux par voie orale sont à proscrire chez la femme avec antécédents de thrombose veineuse.

- A. Vrai
- B. Faux

Question 14 QCD · Vrai / Faux

Le virus D est un virus défectif qui dépend du virus B pour sa multiplication, et il n'existe pas d'infection par le VHD sans infection par le VHB.

- A. Vrai
- B. Faux

Question 15 QCD · Vrai / Faux

L'OAP est l'inondation lente des alvéoles pulmonaires et du tissu pulmonaire interstitiel par transsudation de plasma provenant d'une diminution de la pression capillaire pulmonaire.

- A. Vrai
- B. Faux

Question 16 QCM · Max 2 choix

Le traitement HAART implique :

- A. Une association efficace de trois médicaments ou plus
- B. Une association efficace de deux médicaments ou plus
- C. Qui appartiennent à au moins deux classes différentes
- D. Qui appartiennent à au moins trois classes différentes

Question 17 QCD · Vrai / Faux

L'OAP est la forme aiguë de l'insuffisance cardiaque droite.

- A. Vrai
- B. Faux

Question 18 QCD · Vrai / Faux

L'expression « toxémie gravidique » désigne la néphropathie gravidique.

- A. Vrai
- B. Faux

Question 19 QCM · Max 2 choix

À quelles classes et familles de médicaments appartient l'association TDF-3TC-DTG (2 réponses sont bonnes) ?

- A. les sulfamides
- B. INNTI
- C. INTI

D. IG

E. IP

F. antituberculeux

Question 20 QCM · Choix unique

Reliez les 4 types d'hépatites infectieuses à leur voie de contamination, puis cochez la bonne proposition :

1 – Hépatite A a – contamination féco-orale

2 – Hépatite B b – voie parentérale

3 – Hépatite C

4 – Hépatite E

A. (1,2-a) _ (3,4-b)

B. (1,3-a) _ (2,4-b)

C. (1,2-a) _ (3,4-b)

D. (1,4-a) _ (2,3-b)

Question 21 QCD · Vrai / Faux

L'utilisation du HAART a considérablement révolutionné la prise en charge de l'infection à VIH en la faisant passer d'une maladie chronique à une maladie pestilentielle constamment mortelle.

A. Vrai

B. Faux

PARTIE II — ÉTUDE DE CAS CLINIQUE (22 à 30)

Cas clinique — Dame FK

À votre permanence à l'EPHR de Katiola, vous, IDE, recevez avec le médecin Dame FK, vendeuse de poisson fumé et grande consommatrice de noix de cola et de tchapalo, se plaignant de céphalées occipitales matinales, d'acouphènes et de phosphènes. Mise au repos, vous prenez ses constantes qui indiquent les données suivantes : T° : 38,6 °C – Poids : 76 kg – Taille : 167 cm – Pouls : 111 pulsations/min – FR : 33 cycles/min – TA : 162/101 mmHg (même valeur après plus de trois reprises).

L'entrevue avec la patiente révèle que Dame FK est hypertendue connue. Il y a deux semaines, elle a été reçue au service avec presque les mêmes signes associés à une hémorragie sous-conjonctivale et un épistaxis. À l'examen, on note : une hémiplégie, une paraplégie et une déviation axiale de la bouche.

Le médecin décide de garder la malade. Une sonde urinaire est placée. Le lendemain, on note une diurèse à 3000 ml. La goutte épaissie est négative.

Question 22 QCM · Choix unique

Le diagnostic de Dame FK retenu par le médecin est :

A. HTA primaire

B. HTA secondaire

C. AVC ischémique transitoire

Question 23 QCM · Choix unique

Le phosphène de Dame FK est :

A. vertiges persistants

B. une sensation d'éclairs lumineux devant les yeux

C. les forts bourdonnements d'oreille

Question 24 QCM · Choix unique

Le tableau clinique indique que l'HTA de Dame FK est compliquée. Identifiez la complication :

- A. AVC hémorragique ou AVC ischémique
- B. Infarctus du myocarde (IDM)
- C. Dissection de l'aorte
- D. Œdème aigu du poumon (OAP)

Question 25 QCM · Choix unique

Il vous est demandé de calculer l'IMC de votre patiente :

- A. 27,250
- B. 28,250
- C. 29,250

Question 26 QCM · Choix unique

L'IMC calculé suggère que la patiente est :

- A. dénutrie
- B. à poids normal
- C. en surpoids
- D. obèse

Question 27 QCM · Choix unique

La diurèse de la patiente indique :

- A. une anurie
- B. une polyurie
- C. une oligurie
- D. une pollakiurie

Question 28 QCM · Choix unique

Pour l'accompagnement d'un patient en phase terminale de vie, le médecin a prescrit une perfusion de 600 ml de sérum glucosé 10 % sur 8 h. Calculez le débit de la perfusion :

- A. gouttes/min par excès
- B. 20 gouttes/min
- C. 25 gouttes/min

Question 29 QCM · Choix unique

Le débit de cette perfusion en maintien est de 20 gouttes par minute pendant 4 h. Indiquez le volume de soluté passé dans ce temps :

- A. 220 ml
- B. 230 ml
- C. 240 ml
- D. 250 ml

Question 30 QCM · Choix unique

Votre patiente, du groupe AB-, nécessite une transfusion sanguine. Quelle poche de sang utiliserez-vous ?

- A. La poche de sang AB+
- B. La poche de sang A-
- C. La poche de sang B-
- D. La poche de sang O+
- E. Aucune poche n'est compatible

F. Toutes les poches sont compatibles

PARTIE III — QUESTIONS GÉNÉRALES (31 à 40)

Question 31 QCD · Vrai / Faux

La thrombose veineuse profonde des membres inférieurs est définie comme l'oblitération plus ou moins complète d'une veine profonde par un thrombus résultant d'une coagulation intravasculaire localisée.

A. Vrai

B. Faux

Question 32 QCD · Vrai / Faux

Le risque de l'échec thérapeutique est le développement de virus résistants.

A. Vrai

B. Faux

Question 33 QCM · Choix unique

Lorsqu'un PVVIH prend l'association TDF-3TC-EFV et qu'il a des vertiges, quel est le médicament mis en cause ?

A. TDF

B. 3TC

C. EFV

D. bactrim forte

E. rifampicine

Question 34 QCD · Vrai / Faux

Il est conseillé de prendre une dose supplémentaire de 50 mg de Dolutégravir 12 heures de temps après la prise d'un comprimé de TLD lors de l'association avec la rifampicine.

A. Vrai

B. Faux

Question 35 QCD · Vrai / Faux

Le traitement Trizivir (AZT+3TC+ABC) appartient à la même classe thérapeutique.

A. Vrai

B. Faux

Question 36 QCM · Choix unique

Indiquez le rôle des inhibiteurs de protéase :

A. bloquer la pénétration du virus VIH dans la cellule

B. bloquer la production de l'ADN du virus VIH

C. bloquer l'intégration de l'ADN proviral

D. bloquer la réplication virale

E. bloquer la phagocytose de la cellule

Question 37 QCM · Max 2 choix

Dans le principe de base d'éviter la résistance virale au traitement ARV, l'échec au traitement est dû à deux facteurs. Lesquels ?

A. Une mauvaise association des ARV

B. Une mauvaise prévention sexuelle

C. Une mauvaise observance

D. Une mauvaise alimentation

Question 38 QCM · Max 2 choix

Les médicaments agissant sur le VIH-1 appartiennent aux classes et familles de médicaments ci-dessous (2 sont mauvaises) :

- A. sulfamides
- B. INNTI
- C. INTI
- D. IG
- E. IP
- F. antituberculeux

Question 39 QCM · Choix unique

Parmi les classes d'ARV suivantes, une n'existe pas en Côte d'Ivoire :

- A. les inhibiteurs de l'intégrase
- B. les inhibiteurs de protéase
- C. les inhibiteurs de fusion et d'entrée
- D. les inhibiteurs de la transcriptase inverse

Question 40 QCD · Vrai / Faux

L'hypertension artérielle primaire est encore appelée hypertension essentielle.

- A. Vrai
- B. Faux