



Abengourou

EXAMEN BLANC DU DIPLOME D'ETAT-2020**POPULATION CIBLE : ETUDIANTS DE LA LICENCE 3, OPTION INFIRMIERE****MATIERE A EVALUER : PATHOLOGIES CHIRURGICALES****NOM DU PROFESSEUR : M. KOUASSI N'GUESSAN ALAIN****EVALUATION : le 22 juillet 2020****DUREE DE L'EVALUATION : 01 H 30 MN****DIRECTIVES**

Pour les QCD : 1 réponse juste = 1 point, 1 réponse fausse = -1 point, sans réponse = 0 point

Pour les QCM : 1 réponse juste = 1 point, 1 réponse fausse ou 1 absence de réponse = 0 point

Vous êtes infirmier (ère) diplômé(e) d'Etat au service des urgences du Centre Hospitalier Régional (CHR) de GAGNOA. Au cours de votre permanence du mercredi 22 juillet 2020, vous avez reçu M. DIGBEU Charles, 63 ans, mesurant 1,72 m et pesant 74 kg et présentait les signes suivants :

- des vomissements alimentaires
- des douleurs à la fosse iliaque droite
- des nausées
- une constipation depuis 3 jours
- une température à 38°5
- une accélération modérée du pouls
- un état général conservé
- les conjonctives colorées
- une langue saburrale.

A l'inspection, vous avez noté une diminution d'amplitude des mouvements respiratoires à la fosse iliaque droite une douleur provoquée et une contracture à la fosse iliaque droite.

Vous suspectez une appendicite aiguë de l'adulte jeune en position iliaque droite et vous informez le chirurgien de l'équipe de permanence.

Questions de type B**I QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD)**

Cochez la case correspondant à l'élément de réponse juste.

1- Le pronostic au cours d'une appendicite aiguë dépend de la précocité diagnostique.

Vrai ☐ Faux ☐

2- Le polymorphisme clinique de l'appendicite aiguë rend son diagnostic facile

Vrai ☐ Faux ☐

3- La position rétrocoecale est l'une des positions anatomiques de l'appendice.

Vrai ☐ Faux ☒

4- L'appendicite aiguë de l'adulte jeune est celle où l'appendice est en position iliaque droite

Vrai ☒ Faux ☐

5- A l'inspection de l'abdomen lors d'une appendicite aiguë, il y a une augmentation de l'amplitude des mouvements respiratoires dans la fosse iliaque droite.

Vrai ☐ Faux ☐

6- Le toucher rectal au cours d'une appendicite aiguë provoque une douleur dans le cul-de-sac de Douglas.

Vrai ☐ Faux ☐

7- L'abdomen sans préparation au cours d'une appendicite aiguë révèle des images hydro-aériques dans la fosse iliaque droite quand un stercolithe est la cause de la maladie.

Vrai ☐ Faux ☐

8- Le plastron appendiculaire est une complication de l'appendicite aiguë.

Vrai ☒ Faux ☐

II QUESTION A REPONSES DIRECTES ET COURTES

9- Au regard des signes cliniques présentés par M. DIGBEU Charles à son arrivée au CHR et, selon le modèle conceptuel de Virginia Henderson, quels sont les besoins fondamentaux prioritaires non satisfaits par ce patient ?

- a-
- Eliminer
 - maintenir la température du corps dans les limites normales,
 - Eviter le danger

- b-
- Manger et boire
 - maintenir la température du corps dans les limites normales
 - Eviter le danger

- c-
- Respirer
 - maintenir la température du corps dans les limites normales
 - Eviter le danger

10- En cas d'appendicectomie sans drainage, dans quelle position installe-t-on l'opéré immédiatement après son réveil ?

- a- En position de Trendelenburg
 b- En position de Fowler
 c- En décubitus dorsal.

11- A quel moment donne-t-on l'alimentation liquidienne à un malade qui a subi une appendicectomie ?

- a- juste après le réveil anesthésique
 b- aussitôt que le client peut la tolérer, à moins qu'il ne soit déshydraté pour passer par voie I.V.
 c- Si la température est normale et s'il ne ressent pas de douleur trop forte dans la région opérée.

12- Quand enlève-t-on les points de suture après une appendicectomie ?

- a- entre le 5^e et le 7^e jour après l'opération
 b- entre le 5^{ème} et le 8^{ème} jour
 c- entre le 6^{ème} et le 9^{ème} jour.

13- Que fait-on après avoir installé un patient ayant subi une appendicectomie avec drainage en position de Fowler dès son réveil ?

- a- accélérer les perfusions en cours
 b- instituer le traitement pour la péritonite
 c- demander au client d'uriner.

14- Quel type d'antibiothérapie donne-t-on à un opéré d'appendicite avec drainage ?

- a- tous les antibiotiques
 b- amoxicilline seule
 c- antibiothérapie à large spectre.

II QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM)

Entourez la ou les lettres correspondant à l'élément ou aux éléments de réponse justes

15- Quelles sont les différentes positions que peut occuper l'appendice au plan anatomique ?

- a- sus hépatique
 b- rétrocoecale

- ☐ c- latérocoecale
- d- rétro-sternale
- e- pelvienne
- ☐ f- mésocoeliale

16- Quelles les causes endogènes de l'appendicite aigüe ?

- ☐ a- stercolithe
- b- hyperplasie du tissu lymphoïde
- c- hypertrophie appendiculaire
- d- atteinte par voie sanguine
- ☐ e- corps étrangers

17- Quelles les différentes formes anatomopathologiques que peut présenter une appendicite aigüe ?

- ☐ a- appendicite catarrhale
- b- appendicite oedémateuse
- c- appendicite phlegmoneuse
- ☐ d- appendicite gangréneuse
- e- appendicite péritonéale
- f- appendicite postopératoire.

18- Quels sont les résultats d'examens biologiques parmi ceux qui suivent pouvant être obtenus en cas d'appendicite aigüe ?

- ☐ a- N.F.S Hyperleucocytose sup 10.000 éléments/mm³ à polynucléaire neutrophile.
- ☐ b- élévation de CRP
- c- hyperglycémie
- d- hyponatrémie
- e- accélération de la vitesse de sédimentation
- f- PSA élevé.

19- Quels sont les signes fonctionnels de l'appendicite aigüe contenus dans ce texte ?

- ☐ a- des vomissements alimentaires
- b- une langue saburrale
- c- une accélération modérée du pouls
- ☐ d- une constipation depuis 3 jours
- e- une température à 38°5
- ☐ f- des nausées.

20- Quels sont mes signes généraux qui apparaissent au cours de l'appendicite aigüe parmi ceux énumérés ci-après ?

- ☐ a- des vomissements alimentaires
- b- une langue saburrale.
- ☐ c- une constipation depuis 3 jours
- ☐ d- nausées
- ☐ e- une température à 38°5
- f- une accélération modérée du pouls.

21- Quelles sont les formes évolutives de l'appendicite aigüe ?

- ☐ a- plastron appendiculaire
- b- appendicite péritonéale
- ☐ c- abcès appendiculaire
- ☐ d- péritonites appendiculaires
- e- appendicite tuberculeuse
- f- appendice rétrocoecal.

22- Quels sont les signes cliniques parmi les suivants pouvant permettre de poser le diagnostic positif de l'appendicite aigüe ?

- ☐ a- douleur provoquée à la fosse iliaque droite
- b- fièvre à 38°5 C
- c- état général altéré
- ☐ d- nausées

e- défense

f- Pyélonéphrite droite

23- Certaines affections chirurgicales ne doivent pas être confondues avec l'appendicite aiguë devant une douleur, lesquelles ?

a- Grossesse extra-utérine droite

b- Péritonite post typhique

c- torsion du cordon spermatique

d- cholécystite aiguë

e- salpingite aiguë

f- Torsion kyste ovarien droit

24- A quelles affections doit-on penser, outre l'appendicite aiguë, face à une contracture abdominale ?

a- perforation gastrique

b- perforation duodénale

c- perforation iléale

d- perforation du pancréas

e- perforation biliaire

f- perforation colique

25- Les interventions ci-après sont effectuées dans le traitement du plastron appendiculaire.

a- antalgique

b- laparotomie

c- prélèvement de liquide péritonéal

d- vessie de glace

e- antibiotiques

f- drainage

26- Quelles sont les complications post-opératoires qui peuvent survenir suite à une appendicite aiguë ?

a- complications infectieuses

b- rupture des points de suture

c- abcès de paroi

d- abcès appendiculaire

e- abcès Douglas

f- pyosalpinx.

27- Les objectifs des soins infirmiers pour le client qui doit subir une appendicectomie sont les suivants :

a- calmer la douleur de la fosse iliaque droite

b- réduire l'anxiété ou le stress précédant l'opération en fournissant des informations au client sur la période péri opératoire.

c- apporter un soulagement physique pendant la période péri opératoire.

d- rétablir la continuité du transit intestinal.

e- arrêter l'évolution de l'appendicite aiguë.

28- Pour préparer un malade souffrant d'appendicite aiguë, il lui est administré les soins suivants :

a- perfusion I.V. pour établir un bon débit urinaire et remplacer la perte de liquides.

b- prescrire un antipyrétique en cas de fièvre.

c- proscrire une antibiothérapie pour prévenir l'infection.

d- s'il y a présence ou probabilité d'iléus paralytique, on installe une sonde nasogastrique.

e- on demande au client d'uriner, on lui rase l'abdomen et on lui donne la médication préopératoire prescrite.

f- apporter un soulagement physique pendant la période péri opératoire.

BONNE CHANCE A TOUTES ET A TOUS !