

EVALUATION DE SOINS INFIRMIERS EN CHIRURGIE PEDIATRIQUE

LICENCE 2 –INFIRMIERE

ANNEE ACADEMIQUE 2022-2023

I. QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE (QCM)

Consignes : Choisir la ou les bonnes réponses

- Une réponse équivaut à 1 pt
- Une réponse équivaut à 0 pt
- Une absence de réponse équivaut à 0 pt

- 1. Parmi les malformations ci-dessous citées, une seule relève d'un défaut de soudure des arcs vertébraux postérieurs, laquelle ?**
 - A. L'omphalocèle
 - B. Le spina-bifida
 - C. La malformation ano-rectale
- 2. Dans la luxation congénitale de la hanche, l'on retrouve :**
 - A. La tête du fémur en abduction
 - B. La tête du fémur en rotation externe
 - C. La tête du fémur hors de la cavité cotyloïde
 - D. La tête du fémur en adduction
- 3. Parmi les symptômes suivants, deux (02) relèvent de l'hydrocéphalie en cas de méningocèle :**
 - A. Retard mental
 - B. Insensibilité
 - C. Faiblesse générale
 - D. Excitabilité
 - E. Asthénie physique
- 4. Toutes ces affections peuvent occasionner la fente labio-palatine, sauf deux (02), lesquelles ?**
 - A. La syphilis
 - B. La toxoplasmose
 - C. La drépanocytose
 - D. La typhoïde
 - E. La rubéole
- 5. Deux examens paracliniques sont effectués dans le bilan préopératoire de l'enfant qui doit être opéré de fente labio-palatine :**
 - A. Urée – créatinémie
 - B. Groupe sanguin + Rh
 - C. Bilan ORL
 - D. Transaminases
 - E. Protides totaux
- 6. Les soins de la plaie opératoire après réparation de la lèvre pour une bonne prise charge de l'enfant consistent à :**
 - A. Déceler les saignements
 - B. Faire un pansement humide
 - C. Oxygéner l'enfant jusqu'à normalisation de la respiration
 - D. Appliquer une pommade antibiotique après avoir nourri l'enfant

- E. Peser l'enfant chaque jour.
7. Parmi les variétés de spina bifida ci-dessous citées, indiquer celle qui ne nécessite pas une intervention chirurgicale.
- A. Le méningocèle
 - B. Le spina-bifida occulta
 - C. La myéloméningocèle
8. Une complication neurologique accompagne toujours la myéloméningocèle ; laquelle ?
- A. Le retard mental
 - B. Les yeux couchés en soleil
 - C. L'hydrocéphalie
 - D. La convulsion
9. Un seul examen est indiqué dans le diagnostic de l'appendicite aiguë, parmi ceux énumérés ci-dessous.
- A. La radio de l'abdomen sans préparation
 - B. L'échographie abdominale
 - C. L'urée sanguine
10. Dans les omphalocèles, il existe deux (02) principaux risques.
- A. La rupture de la poche herniaire
 - B. La desquamation
 - C. La nécrose
 - D. La ligature
 - E. L'infection
11. Deux (02) activités sont menées par l'agent de santé pour déceler une anomalie de migration du testicule à la palpation ; parmi celles indiquées ci-dessous :
- A. Il faut rechercher une douleur testiculaire
 - B. Il faut rechercher une anomalie associée
 - C. Il faut apprécier la taille de ce testicule
 - D. Il faut faire une palpation douce
 - E. Le testicule est perçu dans la bourse

QCD

12. La cote cervicale fait partie des difformités du membre supérieur atteignant la racine du membre.
- A. VRAI
 - B. FAUX
13. Le testicule récurrent est caractérisé par sa localisation dans l'abdomen, le périnée, le pubis.
- A. VRAI
 - B. FAUX
14. Toute hernie de la paroi abdominale est constituée par trois (03) éléments anatomiques : le trajet pariétal, les enveloppes, et le contenu.
- A. VRAI
 - B. FAUX
15. La fente labio-palatine doit être opérée vers l'âge de 18 mois.
- A. VRAI
 - B. FAUX
16. Certaines difformités du membre supérieur atteignent la racine du membre.
- A. VRAI

- B. FAUX
17. Le traitement des malformations ano-rectales est chirurgical.
A. VRAI
B. FAUX
18. Dans les occlusions aiguës néo-natales, le premier signe qui attire l'attention est l'évacuation du méconium.
A. VRAI
B. FAUX
19. La surélévation congénitale de l'omoplate est due à l'emplacement de l'angle inférieur de l'omoplate au niveau de la 6ème, 5ème ou 4ème côte au lieu de la 7ème.
A. VRAI
B. FAUX
20. Le traitement de spina-bifida occulta est une intervention chirurgicale d'urgence dans les 24h après la naissance.
A. VRAI
B. FAUX
21. La myéloméningocèle se manifeste généralement en dessous de la région lombo-sacrée
A. VRAI
B. FAUX
22. La luxation congénitale de la hanche se rencontre souvent chez les enfants nés pas le siège.
A. VRAI
B. FAUX
23. Le diagnostic du spina-bifida est fait au cours de la grande enfance.
A. VRAI
B. FAUX
24. Dans les paralysies obstétricales, le bras du nourrisson pend inerte le long du corps et en forte rotation interne.
A. VRAI
B. FAUX
25. On parle de syndactylie lorsque deux ou plusieurs doigts sont palmés sur toute ou une partie de leur longueur, comparable aux Pattes de canard.
A. VRAIX
B. FAUX
26. La hernie ombilicale du nouveau-né ou omphalocèle est une hernie acquise qui guérit spontanément avant l'âge de 4 à 5 ans.
A. VRAI
B. FAUX
27. Le Spina-Bifida est le défaut de soudure des vertèbres dorsales.
A. VRAI
B. FAUX
28. Le méningocèle est corrigé chirurgicalement dans les 24 heures après la naissance,
A. VRAI
B. FAUX
29. La myéloméningocèle une hernie des méninges, sans anomalie connexes de la moelle épinière et des racines des nerfs
A. VRAI
B. FAUX
30. L'anorectale est une malformation régionale qui n'intéresse que le rectum et l'anus
A. VRAI

B. FAUX

31. L'opération de la fente labio-palatine se pratique à l'âge de douze (12) mois

A. VRAI

B. FAUX

32. L'ectopie se définit comme une aplasie des testicules

A. VRAI

B. FAUX

33. La cryptorchidie est caractérisée par un testicule qui se situe sur son trajet normal mais qui n'a pas achevé sa migration

A. VRAI

B. FAUX