

SUJET D'ENTRAINEMENT N° 2

Médecine L2 pathologies digestives et urinaires

DATE : 23/04/2022

DUREE : 45mn

- Choisir A = Vrai si l'affirmation est vraie
- Choisir B = Faux si l'affirmation est fausse
- Une réponse exacte = +1 pt
- Une réponse fausse = -1 pt
- Aucune réponse = 0 pt

LISEZ ATTENTIVEMENT LES QUESTIONNAIRES ET SOYEZ VIGILANTS

NB: L'étudiant verra sa note automatiquement après validation de la composition, bonne chance à tous

...

* Obligatoire

1. NOM *

2. PRENOMS *

3. MATRICULE *

4. GROUPE *

☐ A

☐ B

5. L'estomac a pour rôles essentiels :
(1 point)

☐ A- Digerer les aliments

- ☐ B- recevoir les aliments pour les stocker provisoirement et les mélanger
- ☐ C- assurer la digestion protéique
- ☐ D- Évacuer les aliments vers le foie
- ☐ E- Evacuer les aliments vers l'intestin grêle
- ☐ F- Distribuer les aliments vers les autres organes

6. Les manifestations typiques du reflux gastro-œsophagien sont:
(1 point)

- ☐ A- pyrosis post prandial
- ☐ B- Syndrome respiratoire
- ☐ C- Brûlures épigastriques isolées
- ☐ D- pyrosis postural
- ☐ E- régurgitation
- ☐ F- Douleur thoracique pseudo-angineuse

7. L'ulcère gastro-duodénal peut être liée :
(1 point)

- ☐ A- A une infection hélicobactère pylori
- ☐ B- A une infection du staphylocoque doré
- ☐ C- Aux anti-inflammatoires non stéroïdiens
- ☐ D- A une altération des mécanismes de défense de la muqueuse gastroduodénale
- ☐ E- Aux tabacs

☐ F- A une hémochromatose

8. Les 4 principaux modes de contamination par le virus de l'hépatite B sont :
(1 point)

☐ A- transmission sexuelle

☐ B- Les contacts avec le sang ou dérivés du sang

☐ C- transmission Mère-Enfant

☐ D- contacts dans la famille ou dans une collectivité

☐ E- La malnutrition

☐ F- L'obésité

9. Trois des éléments suivants décrivent la douleur d'origine gastrique ou duodénale, lesquels :
(1 point)

☐ A- déclenché par certaines positions, certains médicaments

☐ B- Calmée par l'alimentation, les produits alcalins

☐ C- Contracture abdominale

☐ D- brûlure, crampes ou torsion

☐ E- Colite

10. La ponction d'ascite se fait dans : Choisir la bonne réponse.
(1 point)

☐ A- La fosse iliaque droite

☐ B- L'hypochondre droit

- ☐ C- L'hypochondre gauche
- ☐ D- La fosse iliaque gauche

11. La gastrite est l'inflammation aiguë ou chronique de:
Choisir la bonne réponse.

(1 point)

- ☐ A- La muqueuse de l'œsophage
- ☐ B- La muqueuse du duodénum
- ☐ C- La muqueuse de l'estomac
- ☐ D- La muqueuse du foie

12. La cause la plus fréquente du cancer primitif du foie en Afrique est :

(1 point)

- ☐ Cirrhose alcoolique
- ☐ Hématochromatose
- ☐ Cirrhose virale
- ☐ Cirrhose bactérienne

13. Le rôle de l'infirmier dans l'hépatite virale repose sur :

(1 point)

- ☐ A- L'accueil
- ☐ B- La surveillance du malade
- ☐ C- La prescription
- ☐ D- La prophylaxie

☐ E- La préinscription

☐ F- La prévention

14. Parmi les éléments suivants, un ne fait pas parti des complications des UGD, lequel :

(1 point)

☐ A- perforation du côlon

☐ B- Hémorragie digestive

☐ C- Perforation ulcéreuse

☐ D- Sténose ulcéreuse

☐ E- Transformation cancéreuse

15. Les causes les plus fréquentes de l'hépatite aiguë sont :

(1 point)

☐ A- Infections bactériennes

☐ B- Médicaments

☐ C- Virus de l'hépatite B et C

☐ D- Infections virales

☐ E- L'alcool

☐ F- Syndrome métabolique

16. Le syndrome dyspeptique se manifeste en associant les symptômes suivants, sauf deux, lesquels :

(1 point)

☐ A- Sensation d'inconfort, de pesanteur

- ☐ B- Impression de plénitude gastrique, de digestion
- ☐ C- Ballonnement
- ☐ D- Fièvre
- ☐ E- Douleur de la région épigastrique, le plus souvent post prandiale
- ☐ F- Céphalées

17. En cas d'ascite le régime alimentaire du patient doit être :
(1 point)

- ☐ A- Normosodé
- ☐ B- Hyposodé
- ☐ C- Hypersodé
- ☐ D- Désodé

18. La cirrhose est une pathologie :
(1 point)

- ☐ A- De la rate
- ☐ B- Du coeur
- ☐ C- De l'intestin
- ☐ D- Du foie

19. Les accidents de la ponction d'ascite sont :
(1 point)

- ☐ A- Piqure de la plèvre

- ☐ B- Piqûres de la paroi des vaisseaux
- ☐ C- Accident vasculaire cérébraux
- ☐ D- Collapsus cardio-vasculaire
- ☐ E- Ecoulement persistant

20. Les signes cliniques du cancer du foie sont:
(1 point)

- ☐ A- Foie mobile
- ☐ B- Gros foie
- ☐ C- Foie de dureté pleurreuse
- ☐ D- Pas d'ictère obstructif
- ☐ E- Foie moins mobile qu'il est plus gros

21. Les médicaments prescrits en cas de gastrique sont:
(1 point)

- ☐ A- Les antiacides
- ☐ B- les AINS
- ☐ C- Les digitales
- ☐ D- Les antispasmodiques

22. L'inspection de la marge anale se fait à la recherche des éléments suivants, sauf un, lequel :
(1 point)

- ☐ A- Orifice fistuleux

- ☐ B- Hémorroïdes
- ☐ C- Tumeur
- ☐ D- Péristaltisme intestinal
- ☐ E- Prolapsus

23. En cas d'hépatite, le principe de la vaccination consiste :
(1 point)

- ☐ A- A faire 3 injections à 1 mois d'intervalle puis rappel à 6 mois
- ☐ B- A faire 1 injection à 1 mois d'intervalle puis rappel à 3 mois
- ☐ C- A faire 2 injections à 1 mois d'intervalle puis rappel à 6 mois
- ☐ D- A faire 2 injections à 3 mois d'intervalle puis rappel à 6 mois
- ☐ E- A faire 1 injection à 3 mois d'intervalle puis rappel à 6 mois
- ☐ F- A faire 3 injections à 2 mois d'intervalle puis rappel à 3 mois

24. Le facteur favorisant la survenue de l'ulcère gastro-duodénal est:
(1 point)

- ☐ A- Le citron
- ☐ B- L'alcool
- ☐ C- Le lait
- ☐ D- Le miel

25. L'intestin grêle mesure 7 mètres
(1 point)

- ☐ A- VRAI

☐ B- FAUX

26. Ténésme désigne une contraction douloureuse de l'anus
(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

27. Lictère est une coloration rose de la peau et des muqueuses
(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

28. Une ascite est un épanchement liquidien intra-péritonéal
(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

29. L'hématémèse traduit une hémorragie digestive basse
(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

30. La complication la plus fréquente des Ulcères Gastro-duodénaux est
l'hémorragie digestive
(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

31. Le terme hépatite désigne tout processus inflammatoire de la rate
(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

32. La colique intestinale désigne une inflammation du côlon
(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

33. Pour un patient poignardé à l'hypochondre gauche par arme blanche, il faut craindre le traumatisme du foie.
(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

34. L'hépatite B est une maladie à déclaration obligatoire.
(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

35. Méléna est l'émission par l'anus de sang noir digéré et fétide.
(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

36. L'œsophage est un organe tubulaire dont la structure permet la propulsion des aliments du pharynx directement vers le côlon.

(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

37. L'intestin grêle est formé d'un segment mobile, le duodénum , suivi de deux segments fixes, le jéjunum puis l'iléon.

(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

38. L'hépatite B fait partie des infections sexuellement transmissible.

(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

39. La rectorragie est l'émission par la bouche de sang rouge non digéré

(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

40. L'auscultation abdominale permet normalement d'entendre les bruits hydroaériques correspondants au transit intestinal normal.

(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

41. Le pancréas est une glande exocrine et endocrine.

(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

42. La palpation abdominale peut s'effectuer avec les deux mains l'une sur l'autre (la main du dessus guidant la main du dessous) ou avec une seule main.

(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

43. L'abdomen est découpé en 9 régions distinctes permettant de faciliter l'examen clinique et l'interprétation des symptômes en fonction de leur topographie.

(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

44. L'hématémèse est du sang rouge ou noir rejeté par la bouche et provenant des voies digestives hautes.

(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

45. Pour percuter l'abdomen, l'index d'une main frappe celui de l'autre main posée à plat en regard de la zone du corps à examiner.

(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

46. Le régime sans sel est préconisé en cas de cirrhose du foie.

(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

47. La ponction d'ascite se fait dans la fosse iliaque droite pour éviter une blessure du foie.

(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

48. Une hémoptysie est un rejet de sang par la bouche au cours d'un effort de vomissement.

(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

49. Le duodénum est un organe de la partie haute du tube digestif

(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

50. La douleur de la colique hépatique siège au niveau de l'hypocondre droit et dans l'épigastre.

(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

51. Les aspirations digestives sont proscrites dans les cancers l'estomac.

(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

52. En cas d'ulcère non compliqué, le traitement d'éradication de l'ulcère à *Helicobacter* positif repose sur une trithérapie orale de 7 jours.

(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

53. La méléna est une expulsion du sang digéré par l'anus dont l'origine est le rectum.

(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

54. Le reflux gastro-œsophagien est la remontée intermittente du contenu gastrique dans l'estomac

(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

55. Les anomalies de la miction sont :

(1 point)

☐ A- L'énurésie

☐ B- L'oligurie

☐ C- L'incontinence

☐ D- La pollakiurie

☐ E- La dysurie

☐ F- L'hématurie

56. Il y a anurie si la diurèse est :

(1 point)

☐ A- Inférieur à 150 ml par 24h

☐ B- Inférieur à 100 ml par 24h

☐ C- Supérieur à 150 ml par 24h

☐ D- Inférieur à 75 ml par 24h

☐ E- Inférieur à 50 ml par 24h

57. Les actes posés par l'infirmier en cas de lithiase biliaire sont juste sauf un, laquelle :

(1 point)

☐ A- Le soulagement de la douleur et du malaise

☐ B- La prévention de l'infection et de l'obstruction

- ☐ C- L'acquisition de connaissance sur la prévention des récides
- ☐ D- Identifier les diagnostics différentiels

58. Les signes et symptômes d'infection des voies urinaires supérieures sont :
(1 point)

- ☐ A- Fièvre
- ☐ B- La toux
- ☐ C- Les frissons
- ☐ D- La toux
- ☐ E- Vomissement
- ☐ F- Douleur au flanc

59. La tuberculose uro génitale est :
(1 point)

- ☐ A- Une infection tuberculose du rein par voie hématogène à partir d'un foyer pulmonaire, pleural,
- ☐ lymphatique ou indéterminé
- ☐ B- Une affection tuberculose du rein par voie hématogène à partir d'un foyer pulmonaire, pleural,
- ☐ lymphatique ou indéterminé
- ☐ C- Une infection tuberculose du rein par voie lymphatique à partir d'un foyer souvent pulmonaire,
- ☐ pleural , lymphatique ou indéterminé
- ☐ D- Une infection tuberculose du rein à partir d'un foyer lymphatique

60. Les causes pré-rénales dans l'insuffisance rénale aiguë sont:

(1 point)

- ☐ A- Obstruction des voies urinaires
- ☐ B- Hypovolémie
- ☐ C- Schémie
- ☐ D- Pyélonéphrite aiguë
- ☐ E- Septicémie

61. Lurographie intraveineuse UIV est l'examen capital qui permet le diagnostic positif de la lithiase urinaire.

(1 point)

- ☐ A- Vrai
- ☐ B- Faux

62. La dysurie est une anomalie de la miction qui traduit un obstacle vésicale, prostatique ou urétral.

(1 point)

- ☐ A- Vrai
- ☐ B- Faux

63. La lithiase urinaire est une complication de la lithiase biliaire.

(1 point)

- ☐ A- Vrai
- ☐ B- Faux

64. Chez la femme, la fréquence de l'infection urinaire augmente après 50 ans ,
du fait de l'hypertrophie de la prostate.

(1 point)

☐ A- Vrai

☐ B- Faux

Envoyer

Ne communiquez jamais votre mot de passe. [Signaler un abus](#)

Ce contenu est créé par le propriétaire du formulaire. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire. Microsoft n'est pas responsable des pratiques de confidentialité ou de sécurité de ses clients, y compris celles de ce propriétaire de formulaire. Ne donnez jamais votre mot de passe.

Avec Microsoft Forms | [Confidentialité et cookies](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Accessibilité](#)