

ÉVALUATION DE PEC DES PATHOLOGIES MÉDICALES / IST / VIH / SIDA

Niveau : L2 IDE — INFAS

Date : 16/07/2026

Année Académique : 2025-2026

Épreuve : Sujet d'Examen (Sans Correction)

Nom et Prénoms

:

Matricule :

Groupe / Section

:

Note : / 40

Question 1 (Choix unique)

Lorsqu'un PVVIH prend l'association TDF-3TC-EFV et qu'il a le vertige, quel est le médicament mis en cause ?

- ☐ A. TDF
- ☐ B. 3TC
- ☐ C. EFV
- ☐ D. Bactrim forte
- ☐ E. Rifampicine

Question 2

L'OAP est l'inondation lente des alvéoles pulmonaires et du tissu pulmonaire interstitiel par transudation de plasma provenant d'une diminution de la pression capillaire pulmonaire.

- ☐ A. Vrai
- ☐ B. Faux

Question 3

Le risque de l'échec thérapeutique et virologique est le développement de virus.

- ☐ A. Vrai
- ☐ B. Faux

Question 4 (Choix unique)

Parmi les classes d'ARV suivantes, une n'existe pas en Côte d'Ivoire :

- ☐ A. Les inhibiteurs de l'intégrase
- ☐ B. Les inhibiteurs de protéase
- ☐ C. Les inhibiteurs de fusion et d'entrée
- ☐ D. Les inhibiteurs de la transcriptase inverse

Question 5

L'OAP est la forme aiguë de l'insuffisance cardiaque droite.

- ☐ A. Vrai
- ☐ B. Faux

Question 6

Reliez les 4 types d'hépatites infectieuses 1, 2, 3, 4 selon leur voie de contamination (a: féco-orale, b: parentérale), puis cochez la bonne proposition :

1- Hépatite A, 2- Hépatite B, 3- Hépatite C, 4- Hépatite D

- ☐ A. (1-a) ; (2, 3, 4-b)
- ☐ B. (1, 3-a) ; (2, 4-b)
- ☐ C. (1, 2-a) ; (3, 4-b)
- ☐ D. (1, 4-a) ; (2, 3-b)

Question 7 (Max 2 choix)

Il existe deux formes de cirrhose fréquemment rencontrées qui sont lesquelles ?

- ☐ A. Les cirrhoses alcooliques
- ☐ B. Les cirrhoses biliaires
- ☐ C. Les cirrhoses hépatiques
- ☐ D. Les cirrhoses de causes inconnues

Question 8 (Max 2 choix)

Les médicaments agissant sur le VIH appartenant aux classes et familles de médicaments ci-dessous sont mauvais :

- ☐ A. Sulfamides
- ☐ B. INRTI
- ☐ C. INTI
- ☐ D. IG
- ☐ E. IP
- ☐ F. Antituberculeux

Question 9

Lorsque la **PAS** < 140 mmHg et **PAD** < 90 mmHg, on parle d'HTA isolée selon la classification de l'OMS.

- ☐ A. Vrai
- ☐ B. Faux

Question 10 (Max 2 choix)

À quelles classes et familles de médicaments appartient l'association TDF-3TC-DTG ?

- ☐ A. Les sulfamides
- ☐ B. INNTI
- ☐ C. INTI
- ☐ D. IG
- ☐ E. IP
- ☐ F. Antituberculeux

Question 11 (Choix unique)

Le plus souvent, la crise d'asthme est annoncée par les prodromes suivants sauf un, lequel ?

- ☐ A. Éternuements
- ☐ B. Toux
- ☐ C. Céphalées
- ☐ D. Prurit
- ☐ E. Rhinorrhée
- ☐ F. État d'anxiété

Question 12 (Max 2 choix)

Le traitement HAART implique :

- ☐ A. Une association efficace de trois médicaments ou plus
- ☐ B. Une association efficace de deux médicaments ou plus
- ☐ C. Qui appartiennent à au moins deux classes différentes
- ☐ D. Qui appartiennent à au moins trois classes différentes

Question 13

L'expression toxémie gravidique désigne la néphropathie gravidique.

- ☐ A. Vrai
- ☐ B. Faux

Question 14

Le traitement antirétroviral doit être adapté au type de virus : VIH 1, VIH 2, VIH 1+2.

- ☐ A. Vrai
- ☐ B. Faux

Question 15

Le virus D est un virus défectif qui dépend du VHB pour sa multiplication et il n'écarte pas d'infection par le VHB sans infection par le VHB.

- ☐ A. Vrai
- ☐ B. Faux

Question 16

Il est conseillé de prendre une dose supplémentaire de 50 mg de Dolutégravir 12 heures de temps après la prise d'un comprimé de TLD lors de l'association avec la rifampicine.

- ☐ A. Vrai
- ☐ B. Faux

Question 17

Le traitement trithérapie (AZT+3TC+ABC) appartient à la même classe thérapeutique.

- ☐ A. Vrai
- ☐ B. Faux

Question 18 (Choix unique)

La physiopathologie de l'UGO est marquée par trois éléments. Cochez l'intrus :

- ☐ A. Forte production de sécrétions acides (pepsine et acide chlorhydrique) permettant la digestion au sein de l'estomac
- ☐ B. Production de mucus par l'estomac pour protéger de ces éléments chimiques puissants qui s'oppose à l'action de la pepsine et de l'acide chlorhydrique
- ☐ C. Lorsque la production de mucus est excessive ou adéquate, il s'ensuit alors la formation d'un ulcère gastrique
- ☐ D. L'UGB résulte donc d'un déséquilibre entre l'agression chlorhydropeptique et les mécanismes de défense de la muqueuse

Question 19

Si l'HFA du patient entraîne une dyspnée, il sera nécessaire de l'installer en position latérale de sécurité.

- ☐ A. Vrai
- ☐ B. Faux

Question 20

Dans la crise d'OAP, la position demi-assise jambes pendantes réduit le retour veineux périphérique.

- ☐ A. Vrai
- ☐ B. Faux

Question 21 (Choix unique)

Dans le syndrome d'hémato-ascite, la ponction d'ascite montre qu'il s'agit généralement d'un transudat avec :

- ☐ A. Liquide clair eau de roche
- ☐ B. Liquide citrin
- ☐ C. Liquide rhumatoïde
- ☐ D. Liquide séreux

Question 22

La TVP des membres inférieurs est définie comme l'oblitération plus ou moins complète d'une veine profonde par un thrombus résultant d'une coagulation intra-vasculaire localisée.

- ☐ A. Vrai
- ☐ B. Faux

Question 23 (Max 2 choix)

Parmi les propositions suivantes concernant la PrEP, deux sont justes : lesquelles ?

- ☐ A. C'est un outil de traitement de l'infection au VIH
- ☐ B. C'est un outil de prévention de l'infection à VIH
- ☐ C. Elle consiste en la prise d'un antirétroviral par une personne non infectée exposée à un haut risque de contracter le VIH
- ☐ D. Elle consiste en la prise d'antirétroviraux par une personne non infectée exposée à un haut risque de contracter le VIH
- ☐ E. La voie d'administration de ces antirétroviraux est uniquement orale

Question 24 (Max 2 choix)

Dans le principe de base de l'évaluation de la résistance virale au traitement ARV, l'échec au traitement est dû à deux facteurs : lesquels ?

- ☐ A. Une mauvaise prescription des ARV
- ☐ B. Une mauvaise prévention visuelle
- ☐ C. Une mauvaise observance
- ☐ D. Une mauvaise alimentation

Question 25 (Choix unique)

Indiquer le rôle des inhibiteurs de protéase :

- ☐ A. Bloquer la pénétration du virus VIH dans la cellule
- ☐ B. Bloquer la production de l'ADN du virus VIH
- ☐ C. Bloquer l'intégration de l'ADN proviral
- ☐ D. Bloquer la réplication virale
- ☐ E. Bloquer la phagocytose de la cellule

Question 26

L'HTA primaire est encore appelée hypertension essentielle.

- ☐ A. Vrai
- ☐ B. Faux

Question 27

L'utilisation du HAART a considérablement révolutionné la prise en charge de l'infection à VIH en la faisant passer d'une maladie chronique en une maladie potentiellement mortelle.

- ☐ A. Vrai
- ☐ B. Faux

ÉTUDE DE CAS — CAS CLINIQUE (QUESTIONS 28 À 36)

À votre permanence à l'EPR de Kalieba, vous êtes recevant avec le médecin. Dame FK, vendeuse de poisson fumé et grande consommatrice de noix de cola et de tchapalo, se plaint de céphalées occipitales matinales, acouphènes et de phosphènes. Mise au repos, vous prenez ses constantes qui vous indiquent :

T° : 38,6 °C — **Poids** : 76 kg — **Taille** : 167 cm — **Pouls** : 111 puls/min — **FR** : 33 cycles/min — **TA** : 162/101 mmHg (même valeur après plus de trois reprises).

L'entretien avec votre patiente vous révèle que Dame FK est hypertensive connue. Il y a deux semaines, elle a été reçue dans votre service avec presque les mêmes signes associés à une hémorragie sous-conjonctivale, épistaxis et une déviation axiale de la bouche. À l'examen neuro : une hémiplégie, une paraplégie et une déviation axiale de la bouche. Le médecin décide de garder la malade. Une sonde urinaire est placée. Le lendemain, on note une diurèse de 300 mL, la goutte épaisse est négative. Tenant compte des informations précédentes, répondez aux questions ci-après :

Question 28 (Choix unique)

Le diagnostic de Dame FK retenu par le médecin est :

- ☐ A. HTA primaire
- ☐ B. HTA secondaire
- ☐ C. AVC ischémique transitoire
- ☐ D. Autre affection cardiovasculaire

Question 29 (Choix unique)

Le phosphène de Dame FK est :

- ☐ A. Des vertiges persistants
- ☐ B. Une sensation de lumières luisantes devant les yeux
- ☐ C. Des forts bourdonnements d'oreille

Question 30 (Choix unique)

Le tableau clinique indique que l'HTA de Dame FK présente une complication. Indiquez la complication de l'HTA de l'ordre de :

- ☐ A. AVC hémorragique ou d'un AVC ischémique
- ☐ B. Infarctus du myocarde (IDM)
- ☐ C. Dissection de l'aorte
- ☐ D. Œdème aigu du poumon (OAP)

Question 31 (Choix unique)

Il vous est demandé de calculer l'IMC de votre patiente. Quel est cet IMC ?

- ☐ A. 27,25 kg/m²
- ☐ B. 28,25 kg/m²
- ☐ C. 29,20 kg/m²

Question 32 (Choix unique)

L'IMC calculé suggère que la patiente est :

- ☐ A. Dénutrie
- ☐ B. À poids normal
- ☐ C. En surpoids
- ☐ D. Obèse

Question 33 (Choix unique)

La diurèse de la patiente (300 mL/24h) indique :

- ☐ A. Une anurie
- ☐ B. Une polyurie
- ☐ C. Une oligurie
- ☐ D. Une pollakiurie

Question 34 (Choix unique)

Pour l'accompagnement d'un patient en phase terminale de vie, le médecin prescrit une perfusion de sérum glucosé 5% pour 8h (volume total 500 mL). Calculez le débit de la perfusion :

- ☐ A. 10 gouttes/min par excès
- ☐ B. 20 gouttes/min
- ☐ C. 25 gouttes/min

Question 35 (Choix unique)

Le but de cette perfusion en maintien est réglé en gouttes/min. Indiquez le volume de soluté administré pour une durée totale prescrite de 8h :

- ☐ A. 220 mL
- ☐ B. 250 mL
- ☐ C. 500 mL
- ☐ D. 280 mL

Question 36 (Choix unique)

Votre patiente est du groupe AB rhésus négatif (AB-) et nécessite une transfusion sanguine. Quelle poche de sang parmi les propositions suivantes pouvez-vous lui administrer en toute sécurité ?

- ☐ A. Les poches de sang AB+
- ☐ B. Les poches de sang A-
- ☐ C. Les poches de sang B-
- ☐ D. La poche de sang O+
- ☐ E. Aucune poche n'est compatible
- ☐ F. Toutes les poches sont compatibles

Question 37 (Choix unique)

Le traitement HAART signifie :

- ☐ A. Highly Active Antiretroviral Therapy
- ☐ B. High Antiretroviral Actule Therapy
- ☐ C. High Therapy Active Antiretroviral
- ☐ D. High Active Antiretroviral

Question 38 (Max 2 choix)

Concernant les 4 principaux symptômes en rhumatologie, cochez les deux intrus :

- ☐ A. L'asthénie
- ☐ B. La douleur
- ☐ C. La boiterie
- ☐ D. La raideur

Question 39 (Max 2 choix)

Parmi les propositions suivantes, cochez les deux intrus qui ne sont PAS des complications principales de la glomérulonéphrite :

- ☐ A. L'encéphalopathie hypertensive
- ☐ B. L'insuffisance cardiaque
- ☐ C. La lithiase urinaire
- ☐ D. L'œdème pulmonaire
- ☐ E. L'insuffisance rénale terminale
- ☐ F. La prostatite

Question 40

Les contraceptifs hormonaux par voie orale sont à proscrire chez la femme ayant des antécédents de thrombose veineuse profonde (TVP).

- ☐ A. Vrai
- ☐ B. Faux