

ÉVALUATION DE MÉDECINE

1. Lors d'insuffisance cardiaque droit, il y a accumulation des fluides au niveau des jambes et des chevilles provoquant ainsi leur gonflement (œdème)

- Vrai
- Faux

2. Le coma stade 1 est appelé coma carus.

- Vrai
- Faux

3. Le lavage de vessie ne se fait qu'à la seringue.

- Vrai
- Faux

4. L'incontinence urinaire est est l'émission volontaire des urines.

- Vrai
- Faux

5. L'aspirine est formellement contre-indiquée chez un patient atteint de la dengue.

- Vrai
- Faux

6. Les lésions cutanées quel que soit le type de lèpre sont prurigineuses.

- Vrai
- Faux

7. Le vaccin contre la fièvre jaune est un vaccin vivant atténué.

- Vrai
- Faux

8. La syphilis congénitale se transmet de la mère à l'enfant à travers le placenta et se fait dans la deuxième semaine de grossesse.

- Vrai
- Faux

9. La lésion dite GANGOZA dans le pian survient à la phase de tertiaire de la maladie.

- Vrai
- Faux

10. La cirrhose est une pathologie de la rate en réponse à des agressions de nature variée, caractérisée par un bouleversement de l'architecture splénique.

- Vrai
- Faux

11. L'helicobacter pilori est à 100% responsable de l'ulcère.

- Vrai
- Faux

12. En cas de lithiase urinaire, une urographie intraveineuse en urgence est pratiquée en période douloureuse. C'est l'examen capital.

- Vrai
- Faux

13. La lithiase urinaire se définit comme la formation de calculs ou précipitations dans les cavités excrétrices rénales, urétérales ou vésicales, de différents composés organiques.

- Vrai
- Faux

14. L'abdomen est découpé en neuf (9) régions distinctes.

- Vrai
- Faux

15. La douleur post priandale est une douleur survient après une distension douloureuse très violente.

- Vrai
- Faux

16. Pour détecter un méléna, il faut observer la coloration, la consistance et la quantité de chaque selle du malade.

- Vrai
- Faux

17. Le reflux gastro œsophagien est la remontée de liquide gastrique acide dans l'œsophage.

- Vrai
- Faux

18. L'intestin grêle est formé d'un segment fixe, le duodénum, suivi dans l'ordre de deux segments mobiles, l'iléon puis le jéjunum.

- Vrai
- Faux

19. Il existe encore des cas de dracunculose en côte d'ivoire.

- Vrai
- Faux

20. L'hémoglobininurie se reconnaît à la couleur rouge vif des urines.

- Vrai
- Faux

21. Cochez les caractéristiques de la dysurie franche.

- Douleurs pelviennes
- Globe vésicale

- Lenteur de la miction
- Impossibilité de pisser
- Faiblesse de jet

22. Dans la prise en charge des patients atteints du glomérulonéphrite, l'infirmier mène des activités suivantes : cochez les deux réponses nécessaires.

- Expliquer au patient et à sa famille ce qui se passe
- Multiplier les actions de dépistage
- Soutenir le patient et sa famille tout au cours de la maladie
- Faire marcher régulièrement

23. En cas d'hématurie, l'infirmier surveille :

- Cystite
- Constantes
- Anticoagulants

24. Dans le bilan de retentissement de l'hypertension artérielle chez un malade hypertendu. Un des examens suivants se fait en première intention au plan rénal :

- Urée créatinine
- Triglycérides
- ECBU
- NFS

25. Dès l'admission d'une personne victime d'une insuffisance cardiaque à l'hôpital, les actions principales que doit accomplir l'équipe soignante non médicale sont citées ci-dessous, sauf une; laquelle ?

- Installer le patient en position couchée
- Oxygénation
- Prendre une bonne voie veineuse de bon calibre
- Dépister les signes de choc et œdème aigu du poumon
- Prendre les constantes

26. Une hémoculture est positive avec un bacille gram négatif à l'examen direct. Quel diagnostic retenir-vous ?

- Septicémie
- Fièvre typhoïde
- Paludisme

27. Les molécules recommandées par l'OMS dans le traitement de la lèpre sont :

- Rifampicine
- Azithromicine
- Dapsone
- Beta lactamine

28. L'amibiase dans sa localisation extra hépatique peut atteindre par voie sanguine :

- Les reins
- Le cerveau
- Les pancréas

29. La voie de contamination du VIH la plus répandue est :

- Voie mère enfant
- Voie sanguine
- Voie sexuelle

30. La transmission de l'ankylostomose se fait :

- Voie transcutanée
- Voie digestive
- Voie sexuelle

31. Selon les directives de prise en charge du paludisme grave en vigueur en côte d'Ivoire, un enfant de 10 kg doit recevoir au premier jour du traitement une dose d'artesunate injectable à raison de :

- 24 mg à H0, H12 et H24
- 2,4 mg à H0, H12 et H24
- 24 mg à H0, H12 et H24
- 24 mg à H0, H12 et H24

32. Les signes évocateurs d'une infection à schistosoma mansoni

- Hématurie
- Asthénie
- Diarrhée
- Ascite
- Graculomes dans les tissus à la radiographie

33. Les causes post rénales de l'insuffisance rénale aiguë sont entre autres l'obstruction des voies urinaires à savoir :

- Tumeur
- Une hypertrophie à la glande thyroïde
- Un rétrécissement
- Une canicule
- Une béance
- Un calcul

34. Les complications de l'ulcère gastro duodénal sont les suivantes :

- Perforation gastrique
- Sténose
- Rétention aiguë d'urine
- Occlusion intestinale
- Hémorragique digestive

■ Stase gastrique

35. Quand l'hépatite aiguë est symptomatique, elle peut se manifester par des signes spécifiques ; lesquels ?

■ Urticaire

■ Somnolence

■ Asthénie

■ Obésité

■ Nausées

36. Vous recevez M. Ben Magloire pour reflux gastro œsophagien. Le médecin vous indique les moyens thérapeutiques médicaux suivants. Lequel d'entre eux est votre rôle ?

■ Mettre le malade en position déclive en surelevant de la tête du lit de 15 cm

■ Supprimer l'alcool chez le malade

■ Diminuer le volume des repas et des graisses alimentaires

■ Lui donner un régime amaigrissant en cas de surcharge pondérale

37. L'une des complications de l'ulcère gastro duodénal est indiquée parmi celle qui vous sont proposées; laquelle ?

■ Transformation cancéreuse

■ Hépatite

■ Hernie hiatale

38. Parmi les éléments suivants, les deux grands principes du traitement des hépatites.

■ Éviter la consommation de médicament non indispensable

■ Vacciner le malade puis faire un rappel à 6 mois

■ Conseiller d'arrêter l'élevage de porcs pendant les périodes non endémiques

■ Éviter la consommation d'alcool

39. Devant une douleur abdominale, deux symptômes sont cruciaux à connaître, lesquels ?

■ La défense

■ La matité

■ Le tympanisme

■ La contracture

40. Quelle est la quantité maximale de liquide à ne jamais dépasser par ponction ?

■ 500 cc

■ 1500 cc

■ 1200 cc