

Chaîne du froid — Licence 2

Diapositive 1

YAO Aya Philomène Epouse KONAN

Infirmière Spécialiste/Inspecteur de soins infirmiers/Enseignante à l'INFAS d'Abidjan

Contact téléphonique :

0757230065/0101568989

email :

ayaphilo2013@gmail.com

Diapositive 2

CHAINE DU FROID

2023-2024, Semestre 5

Cellule pédagogique de Santé Publique

Abidjan, le 08/07/2024

Diapositive 3

Plan de la présentation

(1/2)

I. Définition

II. Importance de la chaîne du froid

III. Matériels de la chaîne du froid

IV. Dispositions à prendre pour obtenir constamment du froid dans le réfrigérateur

V. Entretien préventif du réfrigérateur

VI. Précautions à prendre pour éviter de rompre la chaîne de froid

Diapositive 4

Plan de la présentation

(2/2)

VII. Suivi de la température de conservation des vaccins sur un lieu de stockage

VIII. Conduite à tenir en cas de rupture de la chaîne de froid

IX. Test d'agitation des anatoxines

X. Pastille de Contrôle des Vaccins (PCV)

XI. Indicateurs de congélation

XII. Plan de sauvetage des vaccins ou

prévision

des situations d'urgence

Conclusion

Diapositive 5

Définition

La chaîne du froid (CDF)

consiste en:

une série de

modalités de conservation et de transport

toutes

destinées à conserver les vaccins à une température acceptable

jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'utilisateur

Diapositive 6

Importance de la chaîne du froid

Importance du Maintien de la chaîne du froid
dans le cadre des activités de vaccination pour
trois raisons fondamentales

:

Vaccins thermosensibles

Altération des vaccins irréversible

Effets successifs des altérations s'additionnent

Diapositive 7

Matériels de la chaîne du froid

(1/3)

Matériels produisant du froid

Chambres froides

Congélateurs

Réfrigérateurs

Diapositive 8

Matériels de la chaîne du froid

(2/3)

Matériels conservant le froid

Emballages isothermes

Glacières

proprement dites

Porte-vaccins ou glacières portatives

Coussinets en mousse

Accumulateurs de froid

Diapositive 9

Matériels de la chaîne du froid

(3/3)

Matériels de monitoring de la CDF utilisés au centre de santé

Fiche de température du réfrigérateur

Thermomètre

Pastille de Contrôle des Vaccins (PCV)

Indicateurs de congélation

Diapositive 10

Dispositions à prendre pour obtenir constamment du froid dans le réfrigérateur

Veiller à installer correctement le réfrigérateur

à l'abri du soleil et de la chaleur

dans un local frais à

une distance de 15 à 30 cm du mur

Surélever

le réfrigérateur sur des

cales hautes de 5 cm

Veiller à

limiter les pertes de froid

; pour se faire,

ne l'ouvrir qu'en cas de nécessité de service

Entretenir régulièrement en

nettoyant

et en

dégivrant

le réfrigérateur

Diapositive 11

Entretien préventif du réfrigérateur

Dégivrage fréquent et régulier

dès que la couche de glace atteint 0,5 cm

Dépoussiérage de la tuyauterie à l'arrière avec une brosse à poils souples

Contrôle de l'étanchéité du joint de la porte par
le test de la feuille de papier

Diapositive 12

Précautions à prendre pour éviter de rompre la chaîne de froid (1/3)

Réceptionner les vaccins

chez le fabricant ou à l'aéroport dès que possible et

les déplacer toujours

à une

température comprise entre +2°C et +8°C

Conserver les vaccins

entre

+2°C et +8°C

dans les magasins principaux, centraux et intermédiaires, ainsi que dans les centres de santé

Diapositive 13

Précautions à prendre pour éviter de rompre la chaîne de froid (2/3)

Transporter les vaccins dans une glacière

à une

température comprise entre +2°C et +8°C

jusqu'au postes avancés et au cours des déplacements des équipes mobiles

Conserver les vaccins

à la

température comprise entre +2°C et +8°C

pendant les séances de vaccination

Diapositive 14

Précautions à prendre pour éviter de rompre la chaîne de froid (3/3)

Assurer un suivi régulier des températures de stockage des vaccins
dans les différentes structures de vaccination

Eviter les ouvertures intempestives

du réfrigérateur

Diapositive 15

Suivi de la température de conservation des vaccins sur un lieu de stockage

Assurer le relevé biquotidien de la température du réfrigérateur

(matin et soir), si possible à des

heures précises

et

la noter sur la fiche de température

collée sur le réfrigérateur

Vérifier régulièrement l'état des pastilles de contrôle des vaccins

pour s'assurer qu'ils sont bien conservés à la bonne température

Diapositive 16

Conduite à tenir en cas de rupture de la chaîne de froid (1/4)

Si les vaccins sont exposés à la chaleur

:

Regarder les pastilles de contrôle des
vaccins qui en possèdent

-

Si les pastilles virent

,

on ne peut plus les utiliser

Diapositive 17

Conduite à tenir en cas de rupture de la chaîne de froid (2/4)

Si les vaccins sont exposés à la chaleur

:

Pour les

vaccins sans pastilles

, il faut

vérifier s'il reste de la glace dans le réfrigérateur ou dans les accumulateurs

Si oui

, les

vaccins sont probablement intacts;

dans ces conditions,

il faut:

les

ranger en sécurité dans une glacière

avec les accumulateurs contenant de la glace

et

les utiliser jusqu'à la fonte totale de la glace

Diapositive 18

Conduite à tenir en cas de rupture de la chaîne de froid (3/4)

Si les vaccins sont exposés à la chaleur

:

Pour les

vaccins sans pastilles

, il faut

vérifier s'il reste de la glace dans le réfrigérateur ou dans les accumulateurs

Si non

,

ils sont probablement altérés

. Il faut donc:

les rendre

au Coordinateur du Programme Elargi de Vaccination (CPEV) du district

en échange d'un nouveau stock

et

accompagner les vaccins d'un document écrit

(portant les

références

et la

quantité des vaccins altérés

)

Diapositive 19

Conduite à tenir en cas de rupture de la chaîne de froid (4/4)

En cas d'une panne du réfrigérateur

, il faut

stocker les vaccins dans le réfrigérateur d'une localité voisine

Si les vaccins sont exposés à la congélation,

il faut

pratiquer le

test d'agitation

des anatoxines

Diapositive 20

Test d'agitation des anatoxines

Lorsqu'un

stock d'anatoxine est suspecté d'avoir été congelé

, il faut

le

comparer avec un flacon non suspect du même fabricant

en procédant comme suit :

Les agiter

au moins 5 mn,

les disposer sur un plan horizontal pendant et laisser reposer pendant

15 à 20 minutes

Dans le

flacon congelé,

la sédimentation est plus rapide

alors que le

flacon indemne reste homogène

Diapositive 21

Pastille de contrôle des vaccins (PCV) (1/2)

Il s'agit d'un

indicateur composé d'un carré blanc contenu dans un cercle bleu

et qui

vire en cas de variation anormale de la température du réfrigérateur

Elle est placée

sur l'étiquette

des

flacons de vaccin liquide

et

sur la fermeture en plastique

des

flacons de vaccin en poudre ou à reconstituer

Diapositive 22

Pastille de contrôle des vaccins (PCV) (1/2)

Interprétation de la PCV

Différents stades de la pastille de contrôle de vaccin

Stade 1

Stade 2

Stade 3

Stade 4

Diapositive 23

Indicateurs de congélation

Ils permettent de

vérifier si les vaccins non congelables ne sont pas exposés à la congélation

Diapositive 24

Plan de sauvetage des vaccins ou prévision des situations d'urgence

Il faut afficher sur le réfrigérateur, une

étiquette

avec:

le

nom

l'

adresse

et

toutes les coordonnées du responsable des vaccins

Diapositive 25

Conclusion (1/3)

Effets bénéfiques

des programmes Elargis de vaccination

plus à démontrer

dans le monde en général et en Côte d'Ivoire en particulier

Diapositive 26

Conclusion (2/3)

Grâce à la vaccination

:

Variole éradiquée

de notre planète

Maladies comme

la poliomyélite, la coqueluche et la diphtérie

ont

connu un net recul

pour certaines (coqueluche, diphtérie)

et pour d'autre

en phase de pré éradication

(poliomyélite)

Diapositive 27

Conclusion (3/3)

Aussi, souhaitons-nous que

les étudiants de la Licence 2

s'approprient le contenu de ce cours

pour

participer la vaccination pendant le stage clinique

Diapositive 28

MERCI POUR VOTRE
QUALITE D'ÉCOUTE