

AEPA INFAS 2023 SIO PEDIATRIE -DIETETIQUE**NFAS DIMANCHE 20 AOUT DE 13H00 - 16H00**

1. La photothérapie est toxique pour les gonades et la rétine

A

B

2. Dans l'exécution des soins essentiels du nouveau-né, j'explique l'importance de l'allaitement et aide la mère à mettre son enfant au sein dans 60 à 90 minutes suivant l'accouchement

A

B

3. Les légumes apportent à l'enfant des sels minéraux, des vitamines et de la cellulose

A

B

4. L'enfant âgé de 0 à 4 mois nourri au lait de substitution ou remplacement adroit à 6 repas par jour

A

B

5. La bouillotte est un moyen efficace pour lutter contre le refroidissement

A

B

6. L'infection néonatale tardive ou post-natale se traite en première intention avec l'association antibiotique ampicilline + aminoside

A

B

7. La règle d'APPERT me donne une ration journalière inférieure ou égale à 750 ml de lait. Je conclus que le nourrisson a droit à 6 repas dans la journée.

A

B

8. Pour calculer la ration de lait journalière d'un enfant que je ne connais pas le poids j'utilise la règle d'APPERT

A

B

QCM

une réponse juste : 1 point une réponse fausse : 0 point aucune réponse : 0 point

POUR TOUTES LES PROPOSITIONS SUIVANTES COCHER LA BONNE AFFIRMATION

9. LP est né avec un poids (P) de 3250g et un périmètre crânien (PC) de 35 cm. A l'âge de 5 mois, LP a un poids et un périmètre crânien respectif de :

A- P=5000g et PC= 37 cm

C- P=6500g et PC= 43 cm

B- P=5500g et PC= 41 cm

D- P=7000g et PC= 43 cm

10. Le nouveau-né BC a une infection materno-fetale. Pour confirmer le diagnostic de cette infection je collabore avec le médecin qui prescrit

A- Hémogramme

C- Hémoculture

B- C réactive protéine

D- Urée/créatinine

11. La nouvelle performance psychomotrice attendue chez le nourrisson de 12 mois dans les affirmations suivantes est

A- Marcher à 4 pattes

C- Monter seul un escalier

B- Porte l'objet à la bouche

D- Dire « papa- maman »

12. LP est âgé de 72 mois et pèse 20 kg. Il a une diarrhée aiguë avec signes évidents de déshydratation. La quantité de SRO à administrer durant les quatre premières heures est

A- 500 ml

C- 1500 ml

B- 1000 ml

D- 2000 ml

13. KV est âgé de 10 mois et pèse 10 kg. Il a une diarrhée avec signes sévères de déshydratation. La quantité de soluté de réhydratation par voie parentérale a perfusé en 1 heure est :

A- 460 ml

C- 390 ml

B- 360 ml

D- 300 ml

14. Les moyens physiques suivants sont utilisés pour traiter la fièvre de l'enfant. Le moyen physique dont l'efficacité est prouvée recommandée est.

A- Bain d'eau tiède

C- Enveloppement humide

B- Ventiler l'enfant

D- Aérer la pièce

15. FF a 3 jours de vie et a hématurie par avitaminose K. Pour le traiter j'administre en intraveineuse

A- 5 mg de vitamine K1

C- 2 mg de vitamine K1

B- 1 mg de vitamine K1

D- 10 mg de vitamine K1

16. BN, 9 mois, a une température chiffrée 40°Celsius. Le médecin vous informe que le centre de régulation thermique situé au niveau de l'hypothalamus est modifié. Cochez la seule proposition qui est en accord avec l'information du médecin.

- A- Agent infectieux présent dans l'organisme
- B- Réduction de la thermolyse de l'organisme
- C- Mécanisme d'adaptation de l'organisme dépassé
- D- Augmentation de la température extérieure

17. La nouvelle performance psychomotrice attendue chez le nourrisson de 6-8 mois dans les affirmations suivantes est

- A- Marcher à reculons
- B- Eviter les obstacles
- C- Emettre des syllabes
- D- Marcher à quatre pattes

18. Pour se défendre contre l'infection bactérienne, le nouveau-né utilise les moyens suivant sauf un. Lequel ?

- A- Anticorps materno-transmis
- B- Globules blancs
- A- C- Peau et muqueuse
- C- Plaquettes

19. Dans la liste suivante, le signe absent des critères cliniques du paludisme grave est :

- A- Coma
- B- Saignement anormal
- C- Convulsions répétées
- D- Hypoglycémie

20. GG, 11 mois, a un paludisme simple avec une anémie modérée. L'anémie GG occasionnée par le paludisme est de type :

- A- Normochrome normocytaire
- B- Normochrome microcytaire
- C- Normochrome macrocytaire
- D- Hypochrome microcytaire

21. FH est âgé de 9 mois et mesure 76 cm. Son périmètre crânien est de :

- A- 37 cm
- B- 38 cm
- C- 39 cm
- D- 40 cm

22. La nouvelle performance psychomotrice attendue chez le l'enfant de 24 mois dans les affirmations suivantes est

- A- Monter l'escalier en alternant les pieds
- B- Monter et descendre l'escalier en tenant la rame
- C- Monter et descendre l'escalier en mettant les 2 pieds sur chaque marche
- D- Monter l'escalier à quatre pattes

23. Parmi les propositions d'association de signes suivante, l'association qui comporte plus de signes du paludisme grave

- A- Fièvre, Céphalées + Courbatures
- B- Frissons + Vomissements + Splénomégalie

C- Fatigue + Obnubilation + collapsus

D- Diarrhée + Claquement des dents + sueurs abondantes

24. La nouvelle performance psychomotrice attendue chez le l'enfant de 60 mois dans les affirmations suivantes est

A- Être propre la nuit

B- Attacher les lacets de ses chaussures

C- Participer aux jeux de compétitions

D- Connaître toutes les couleurs

25. Les causes suivantes favorisent la perte de poids physiologique du nouveau-né durant les premiers jours de vie sauf une. Laquelle ?

A- Fonte des œdèmes

B- Montée laiteuse tardive

C- Alimentation au colostrum

D- Elimination du méconium et des urines

26. RT est né prématuré et hospitalisé depuis la naissance. Parmi les signes suivants, un seul ne permet pas au médecin de décider de sa sortie. Lequel ?

A- Fréquence respiratoire à 55 cycles / minute

B- Prise pondérale régulière et suffisante

C- Succion-déglutition présente

D- Fréquence cardiaque à 80 battements/minute

27. Le nourrisson CB est âgé de 5 mois et vie avec sa mère à DIPE. Il est au sein exclusif et vacciné. La mère est inquiète car CB régurgite plusieurs fois dans la journée et perd du poids. Le médecin pense à un reflux gastroœsophagien. L'analyse des données de CB relève

A- 2 DI + 3DD

B- 5 DI + 5DD

C- 6 DI + 5DD

D- 3 DI + 4DD

28. Les facteurs suivants favorisent le bon développement psychomoteur sauf un. Lequel ?

A- Sécrétion hormonale satisfaisante

B- Dotation génétique normale

C- Système nerveux intègre

D- Environnement familial satisfaisant

29. Dans le processus des soins essentiels du nouveau-né, l'agent de santé prend la température du nouveau-né

A- 4 fois durant la première heure de vie

B- 2 fois durant la première heure de vie

C- 3 fois durant la première heure de vie

D- 5 fois durant la première heure de vie

30. Le nourrisson CB est âgé de 5 mois et vie avec sa mère à DIPE. Il est au sein exclusif et vacciné. La mère est inquiète car CB régurgite plusieurs fois dans la journée et perd du poids. Le médecin pense à un reflux gastroœsophagien. L'exploration de la réalité personnelle de CB comprend :

- A. 1 variable
- B. 2 variables
- C. 3 variables
- D. 4 variables

- **DD : données de dépendance**

- **DI : données D'indépendance**

31. Pour déterminer la ration de lait journalière (ml/Jour), j'utilise la formule suivante

- A- Poids de l'enfant en gramme/250-10
- B- Poids de l'enfant en gramme + 10/250
- C- Poids de l'enfant en gramme+250/10
- D- Poids de l'enfant en gramme/10+250

32. Le nourrisson CB est âgé de 5 mois et vie avec sa mère à DIPE. Il est au sein exclusif et vacciné. La mère est inquiète car CB régurgite plusieurs fois dans la journée et perd du poids. Le médecin pense à un reflux gastroœsophagien. Le problème de soins infirmiers de CB est

- A- Excès de vomissements
- B- Insuffisance d'apport de nutriments
- C- Insuffisance de communication entre CB et sa mère
- D- Insuffisance d'hygiène de CB

33. Au cours de l'examen du nouveau-né en salle de naissance, je recherche l'omphalocele au niveau

- A- De la tête
- B- De l'abdomen
- C- Du thorax
- D- Du cou

34. Le mélange de l'INSP d'Adjamé utilisé pour la réhabilitation nutritionnelle du nourrisson malnutri est composé de

- A- Lait+ huile + sucre
- B- Lait+ sucre+ farine
- C- Lait + farine + huile
- D- Lait + huile + sucre+ farine

35. Le nouveau-né de 3 jours de vie à l'alimentation de remplacement à droit par repas à un bol de lait de

- A- 45 ml
- B- 40 ml
- C- 35 ml
- D- 30 ml

36. Le cordon ombilical pansé selon les recommandations du Ministère de la santé et de l'hygiène publique de Côte d'Ivoire sèche au bout :

- A- 14 jours en moyenne
- B- 8 jours en moyenne

C- 4 jours en moyenne

D- 2 jours en moyenne

37. L'alimentation à la tulipe est contre indiquée chez le nouveau-né qui présente :

A- Des réflexes primaires émoussés

C- Une diarrhée aiguë

B- Des vomissements répétés

D- Une détresse respiratoire

38. La photothérapie est indiquée en cas de :

A- Ictère à bilirubine libre

D- Ictère à bilirubine semi

B- Ictère à bilirubine conjuguée

conjuguée

C- Ictère à bilirubine totale

39. GH est un nourrisson de 19 mois. Il présente des signes généraux de danger. Je surveille chez GH :

A- La fréquence cardiaque

C- Le nombre de tétée

B- La coloration cutanée

D- Le transit

40. Le nourrisson CB est âgé de 5 mois et vie avec sa mère à DIPE. Il est au sein exclusif et vacciné. La mère est inquiète car CB régurgite plusieurs fois dans la journée et perd du poids. Le médecin pense à un reflux gastroœsophagien. L'exploration de la réalité personnelle de CB comporte

A- 2 variables favorables

C- 3 variables défavorables

B- 4 variables défavorables

D- 5 variables favorables

41. Le nourrisson CB est âgé de 5 mois et vie avec sa mère à DIPE. Il est au sein exclusif et vacciné. La mère est inquiète car CB régurgite plusieurs fois dans la journée et perd du poids. Le médecin pense à un reflux gastroœsophagien. L'exploration de la réalité personnelle de CB comporte

A- 4 variable favorable

C- 1 variables défavorables

B- 2 variables défavorables

D- 3 variables favorables

42. La bonne position de l'enfant au sein est faite lorsque :

A- Le dos de l'enfant repose sur le bras de la mère et la nuque dans le pli du coude

B- Le bras de l'enfant est bien serré sous les aisselles de la mère et les fesses dans la paume

C- Le ventre de l'enfant fait face et en contact avec celui de la mère

D- La bouche de l'enfant effleure le mamelon de la mère

43. L'habitable de l'incubateur (couveuse) comprend

A- Le réservoir d'eau

C- Les zones spécifiques

B- Les hublots latéraux

D- Les secteurs non spécifiques

44. Lors de l'examen du nouveau-né en salle de naissance, je recherche comme anomalie au niveau de la tête

- A- Une cryptorchidie
- B- Un céphalématome
- C- Un spina bifida
- D- Une syndactylie

45. L'OMS recommande d'initier le sevrage du nourrisson a :

- A- 24 mois
- B- 3 mois
- C- 12 mois
- D- 6 mois

47. Nourrisson FG est nourri au lait infantile. Pour préparer son biberon, je prends une mesurette de poudre sèche de lait pour

- A- 20 ml d'eau
- B- 30 ml d'eau
- C- 40 ml d'eau
- D- 60 ml d'eau

48. Le nourrisson CB est âgé de 5 mois et vie avec sa mère à DIPE. Il est au sein exclusif et vacciné. La mère est inquiète car CB régurgite plusieurs fois dans la journée et perd du poids. Le médecin pense à un reflux gastroœsophagien. Le besoin fondamental non satisfait prioritaire de CB est un reflux

- A- Être propre soigné et protéger ses téguments
- B- Éliminer ses déchets biologiques
- C- Eviter le danger
- D- Manger et boire

49. Parmi les critères suivants, un seul traduit une bonne succion du nouveau-né au sein. Lequel ?

- A- La succion est lente, profonde et continue
- B- L'enfant fait le rot au cours de la tétée
- C- La bouche est grande ouverte et prend largement l'aréole
- D- On entend le nouveau-né déglutir le lait maternel

50. L'habitable de l'incubateur (couveuse) comprend : les hublots latéraux

- A
- B

51. Les causes suivantes favorisent la perte physiologique du nouveau-né durant les premiers jours de vie sauf une, laquelle ? C = alimentation au colostrum

- A
- B

52. Le mélange I de l'INSP d'Adjamé utilisé pour la réhabilitation nutritionnelle du nourrisson malnutri est composé de :

- A- Le mélange I : Lait (6 volumes) + sucre (2 volumes) ; + huile (1 volume)

- B- Le mélange I (621) : Lait (6 volumes) + sucre (2 volumes) ; + huile (1 volume)
- C- Le mélange II (5221) : Lait (5 volumes) + farine (2 volumes) + sucre (2 volumes) + huile (1 volume) ;
- D- La bouillie : Lait (3 c à s) + huile (1 c à c) + sucre (4 carreaux) + farine (2 c à s) (2ème temps de récupération nutritionnelle dans la MAS) ;

53. Un nouveau-né pesant 3600 grammes à la naissance perdent au maximum 720g entre le troisième et le cinquième jour de vie

A B

54. Pour déterminer la Ration de lait Journalière (ml/jour), j'utilise la formule suivante : Poids en gramme/10 + 250g Additif

A B

55. La bouillotte est un moyen efficace pour lutter contre le refroidissement

A B

56. Au cours de l'examen du nouveau-né en salle de naissance, je recherche l'omphalocèle au niveau de l'abdomen

A B

57. Au cours de l'examen du nouveau-né en salle de naissance, je recherche comme anomalie au niveau de la tête : un céphalématome.

A B

58. Le cordon ombilical pansé selon les recommandations du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique de Côte d'Ivoire, sèche au bout de 4 jours

A B

59. Dans l'exécution de soins essentiels du nouveau-né, j'explique l'importance de l'allaitement et aide la mère à mettre son enfant au sein dans les 60 à 90 minutes suivant l'accouchement.

A B

60. Parmi les critères suivants, un seul traduit une bonne succion du nouveau-né au sein, lequel ? On entend l'enfant déglutir le lait maternel.

A B

61. Le nouveau-né de 3 jours de vie à l'alimentation de remplacement a droit par repas, à un bol de lait de 40 ml.

A B

62.L'alimentation à la tulipe est contre-indiquée chez le nouveau-né qui présente : une détresse respiratoire

A B

63.Le nourrisson FG est nourri au lait infantile. Pour préparer son bol de lait, je prends une mesurettes de poudre sèche de lait pour : 30 ml d'eau

A B

64.L'OMS recommande d'initier le sevrage du nourrisson à : 6 mois

A B

65.Pour calculer la Ration Journalière de lait d'un enfant que je ne connais pas le poids, j'utilise la règle d'APPERT

A B

66.Les légumes apportent à l'enfant des sels minéraux, des vitamines et la cellulose

A B

67.La photothérapie est toxique pour les gonades et la rétine

A B

68.Les moyens physiques suivants sont utilisés pour traiter la fièvre de l'enfant. Le moyen physique dont l'efficacité est prouvée et recommandée est : aérer la pièce, selon l'OMS.

A B

69.La règle d'APPERT me donne une Ration Journalière inférieure à 750 ml de lait. Je conclue que le nourrisson a droit à 6 Repas

A B

70.La bonne position de l'enfant au sein est faite lorsque : le ventre de l'enfant fait face et en contact avec celui de sa mère.

A B

71.L'enfant âgé de 0 à 4 mois nourri au lait de substitution (remplacement) a droit à 6 repas

A B

72.LP est né avec un poids (P) de 3250 g et un périmètre crânien (PC) de 35 cm. À l'âge de 5 mois, LP a un poids et un PC respectif de : P = 6500g et PC = 43 cm ;

A

B