

EVALUATION DE PEDIATRIE N°8- INFAS NIVEAU LICENCE 3

QCD

6.JK marche à reculons et monte les escaliers en se tenant à la rampe. Il a un vocabulaire de 10 à 20 mots. Je conclus que JK est âgé de 24 mois

A. Vrai

B. Faux

7.MP est capable de tenir un objet dans chaque main. Si on lui tend un 3è, il le regarde avec intérêt. MP a les performances psychomotrices d'un enfant de 6 mois

A. Vrai

B. Faux

8.JM est capable de tendre un jouet à ses parents, mais a du mal à le lâcher. MP tient debout avec appui. JM a les performances psychomotrices d'un enfant de 9 mois

A. Vrai

B. Faux

9.L'otite moyenne aiguë et l'oto-mycose sont deux termes médicaux utilisés pour désigner la même maladie

A. Vrai

B. Faux

10.La rougeole et la prématurité constituent des facteurs favorisant de l'otite moyenne aiguë

A. Vrai

B. Faux

11.FG souffre d'une rhinopharyngite aiguë. Pour traiter FG l'agent de santé instille une solution à base d'antibiotique dans les fosses nasales.

A. Vrai

B. Faux

12.Chez le nourrisson, la rhinopharyngite est une maladie d'adaptation du système immunitaire à l'environnement

A. Vrai

B. Faux

13.QK, est âgé de 4 ans et pèse 16kg. Il est fébrile à 39°5 Celsius. La température ne se normalise pas malgré l'observation des mesures physiques. Vous décidez de lui administrer toutes les 6 heures de temps sur 24h du paracétamol en perfusion. La dose de paracétamol administrée durant les 6 premières heures de prise en charge est de 240 mg

A. Vrai

B. Faux

14.CB est âgé de 6 ans et pèse 20kg. Il est fébrile à 39°5 Celsius. La température ne se normalise pas malgré l'observation des mesures physiques. Vous décidez de lui

administrer toutes les 6 heures de temps sur 24h du paracétamol en perfusion. La dose totale de paracétamol administrée durant les 24 heures de prise en charge est de 1000 mg

A. Vrai

B. Faux

15.A l'examen avec l'otoscope, le tympan est d'aspect rouge violacé ou jaunâtre dans l'otite moyenne aiguë congestive

A. Vrai

B. Faux

16.L'otite moyenne aiguë constitue la forme anatomique la plus fréquente des otites de l'enfant

A. Vrai

B. Faux

17.GG est âgé de 6 ans et connu drépanocytaire. GG a moins de risque d'avoir une pneumonie franche lobaire aiguë

A. Vrai

B. Faux

18.GH est hospitalisé pour un paludisme. J'affirme que GH souffre d'un paludisme simple s'il a une prostration

A. Vrai

B. Faux

19.PQ est hospitalisé pour une malnutrition aiguë compliquée. J'associe des mesures adjuvantes à sa réhabilitation nutritionnelle

A. Vrai

B. Faux

20.L'endoblaste est le feuillet embryonnaire qui contrôle la formation des glandes et muqueuse du corps humain

A. Vrai

B. Faux

21.Les crevasses du sein sont favorisées par la mise au sein inappropriée du nourrisson

A. Vrai

B. Faux

22.GB est hospitalisé pour un collapsus cardiovasculaire et fièvre. Le TDR est positif à Plasmodium falciparum. GB souffre d'un accès palustre simple

A. Vrai

B. Faux

23.BJ est admis en urgence pour une fièvre associées deux épisodes de vomissements bilieux (jaunâtre). Il a un bon état d'hydratation. Le test de diagnostic rapide du paludisme est positif. Pour traiter BJ, je prescris de l'Artémether injectable en IM matin et soir sur trois jours

A. Vrai

B. Faux

24.Le vernix caseosa est abondant sur le nouveau-né eutrophique

A. Vrai

B. Faux

25. La cellule myoépithéliale assure la production du lait dans les seins

A. Vrai

B. Faux

26. Jk a accouché le 10 mars 2023 et se plaint de ne pas avoir assez de lait dans les seins. Vérifiez la technique de tétée est un point important de la prise en charge de JK

A. Vrai

B. Faux

27. GK vient de naître. A une minute de vie GK est bleu de partout, ne respire pas, ne pleure pas, est tout mou et le cœur bat à 90 battements par minute. GK est en état de mort apparent

A. Vrai

B. Faux

28. La rougeole est le boulevard par lequel mène la malnutrition

A. Vrai

B. Faux

29. Chez le nouveau-né normal, le collyre antiseptique pour prévenir une infection des yeux s'administre sur un jour

A. Vrai

B. Faux

QCM

30. BM est âgé de 22 mois et sevré à l'âge de 14 mois par la mère. Il est grognon, apathique et refuse la nourriture. BM est amaigri au niveau du thorax et a des ulcérations sur les fesses et des œdèmes au membres inférieurs. Le Z-score évaluer est à moins 3. La maladie de BM s'appelle

A. Kwashiorkor

C. Kwashiorkor-marasme

B. Marasme

D. Obésité

31. GH, sexe féminin, poids 12 kg présente des convulsions. Pour arrêter ces convulsions j'utilise du Diazépam. La dose maximale de Diazépam que je ne dois pas dépasser en une journée de traitement est de

A. 12 mg

C. 36 mg

B. 6 mg

D. 24 mg

32. JM s'habille seul et raconte des petites histoires mais JM est incapable de nouer les lacets de sa paire de tennis. Je conclus que JM est âgé de

A. 2 ans

C. 4 ans

B. 3 ans

D. 5 ans

33.LP est en position de quadri-flexion des membres et présente des mouvements anarchiques. LP sourit aux ange. Je déduis que JP a des acquisitions psychomotrices d'un enfant de

- A. 6 mois
- B. 3 mois
- C. 2 mois
- D. 1 mois

34.JK est âgé de 11 mois. La taille est de 74 cm. Le PC de JK estimée à partir de la taille est de

- A. 49 cm
- B. 50 cm
- C. 47cm
- D. 48 cm

$$\frac{T A I L L E / 2 P L U S 10}{E G A L E P C}$$

35.BH est âgé de 36 mois. Il est amené en urgence par la mère pour une diarrhée aiguë avec des selles liquides sans matière fécale. Le germe probable à l'origine de cette diarrhée est

- A. Rotavirus
- B. Shigelle
- C. Escherichia coli
- D. Vibron cholérique

36.Les facteurs de la coagulation suivants sont perturbés au cours de la maladie hémorragique du nouveau-né sauf un. Cocher cet intrus

- A. Facteur II
- B. Facteur III
- C. Facteur VII
- D. Facteur IX

37.JK est âgé de 11 mois et pèse 9kg. Il souffre d'une diarrhée aiguë à Rotavirus. JK boit avec avidité et est agité. Je réhydrate par voie orale JK en 4 heures à l'hôpital avec

- A. 450 ml de SRO
- B. 630 ml de SRO
- C. 675 ml de SRO
- D. 575 ml de SRO

38.JK est âgé de 11 mois et pèse 9kg. Il souffre d'une diarrhée aiguë à Rotavirus. JK boit est incapable de boire et est léthargique. Le pli cutané de JK s'efface très lentement. Je réhydrate par voie parentérale JK en 6 heures à l'hôpital avec

- A. 900 ml de soluté
- B. 675 ml de soluté
- C. 450 ml de soluté
- D. 1000 ml de soluté

39.JK est âgé de 11 mois et pèse 9kg. Il souffre d'une diarrhée aiguë à rotavirus. JK boit normalement et conscient. Je réhydrate par voie orale JK à domicile sur une journée avec

- A. 1000 ml de SRO
- B. 500ml de SRO
- C. 1500 ml de SRO
- D. 2000 ml de SRO

40.Les signes suivants sont en faveur d'une bronchiolite aiguë dans sa forme commune sauf deux signes. Cocher ces deux signes

- A. Respiration sifflante
- B. Otorrhée
- C. Toux sèche quinteuse
- D. Rhume

E. Adénopathie cervicale

41. Les signes suivants sont en faveur d'un marasme sauf deux signes. Cocher ces deux signes

A. Anorexie

D. Alopécie

B. Appétit conservé

E. Flotte dans sa peau

C. Œdème

42. cochez parmi les 5 propositions suivantes les trois propositions en faveur d'une bonne pratique de la réanimation du nouveau-né en salle de naissance

A. Tapez sur la plante du pied

B. Essuyer l'enfant

C. Porter un bonnet

D. Injection IM de Dexaméthasone

E. Section du cordon après 1 minute