

ÉVALUATION DE CONNAISSANCES

Sciences Infirmières, Pédiatrie & Pathologies Médico-Chirurgicales

Nom &
Prénoms :

Date :

Matricule /
Niveau :

Note :

Question 1 — QCD

+1 pt

Le principal risque d'une omphalocèle exposée est notamment infectieux.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

ÉTUDE DE CAS — CAS CLINIQUE 5

Un enfant immobilisé depuis plusieurs jours présente une rougeur persistante au niveau du talon.

Question 2 — QCM

+1 pt

Cette lésion évoque une des affections suivante, laquelle ?

Choix unique

- ☐ Une appendicite
- ☐ Une omphalocèle
- ☐ Une syndactylie
- ☐ Une escarre

Question 3 — QCM

+1 pt

Un facteur favorisant est :

Choix unique

- ☐ Le décubitus prolongé
- ☐ La marche
- ☐ L'alimentation
- ☐ La vaccination

Question 4 — QCM**+1 pt****Une mesure de prévention consiste à :****Choix unique**

- ☐ Laisser l'enfant dans la même position
- ☐ Changer régulièrement la position de l'enfant
- ☐ Ne jamais examiner sa peau
- ☐ Maintenir constamment les zones d'appui humides

Question 5 — QCM**+1 pt****L'infirmier doit notamment surveiller trois des propositions suivantes, lesquelles ?****Max 3 choix**

- ☐ Les points d'appui
- ☐ L'état cutané
- ☐ L'apparition de rougeurs
- ☐ Aucune bonne réponse

Question 6 — QCM**+1 pt****Une escarre est :****Choix unique**

- ☐ Une malformation congénitale
- ☐ Une anomalie du tube neural
- ☐ Une complication possible de l'immobilisation prolongée
- ☐ Une malformation du visage

Question 7 — QCM**+1 pt****Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas un signe habituel d'occlusion digestive ?****Choix unique**

- ☐ Vomissements
- ☐ Distension abdominale
- ☐ Arrêt des matières et des gaz
- ☐ Déformation du pied

Question 8 — QCD**+1 pt****L'application directe de glace constitue le traitement recommandé d'une brûlure récente.****Choix unique (Vrai/Faux)**

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 9 — QCD**+1 pt**

Une fracture du fémur peut être responsable d'un choc hypovolémique.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 10 — QCD**+1 pt**

La rougeur fait partie des signes classiques de l'inflammation.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 11 — QCD**+1 pt**

L'absence d'émission du méconium peut être observée dans certaines occlusions néonatales.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

ÉTUDE DE CAS — CAS CLINIQUE 1

Un garçon de 8 ans est reçu aux urgences après une chute. Il présente une douleur intense de la cuisse, une déformation et une impossibilité de marcher.

Question 12 — QCM**+1 pt**

La pathologie la plus probable est :

Choix unique

- ☐ Appendicite
- ☐ Spina Bifida
- ☐ Fracture du fémur
- ☐ Omphalocèle

Question 13 — QCM**+1 pt**

Une complication immédiate à rechercher est :

Choix unique

- ☐ Choc hypovolémique
- ☐ Fente palatine
- ☐ Pied bot
- ☐ Syndactylie

Question 14 — QCM**+1 pt**

L'examen permettant de confirmer principalement la fracture est :

Choix unique

- ☐ Audiométrie
- ☐ ECG
- ☐ Radiographie
- ☐ Spirométrie

Question 15 — QCM**+1 pt**

Le rôle infirmier avant la prise en charge comprend trois des éléments suivants, lesquels ?

Max 3 choix

- ☐ Immobiliser le membre
- ☐ Surveiller les constantes
- ☐ Évaluer la douleur
- ☐ Faire marcher l'enfant

Question 16 — QCM**+1 pt**

Parmi les signes suivants, lesquels appartiennent aux signes classiques de l'inflammation ? (Deux réponses justes)

Max 2 choix

- ☐ Rougeur
- ☐ Douleur
- ☐ Surdit 
- ☐ Myopie

Question 17 — QCM**+1 pt**

Une ag n sie des membres correspond   une des propositions suivantes, laquelle ?

Choix unique

- ☐   une anomalie de d veloppement d'un membre
- ☐   une infection d'un membre
- ☐   une fracture du membre
- ☐   une br lure du membre

ÉTUDE DE CAS — CAS CLINIQUE 3

Un enfant de 10 ans présente des douleurs abdominales, des vomissements et une douleur importante de la fosse iliaque droite associée à une fièvre.

Question 18 — QCM

+1 pt

Le diagnostic le plus probable est :

Choix unique

- ☐ Appendicite aiguë
- ☐ Pied bot
- ☐ Méningocèle
- ☐ Syndactylie

Question 19 — QCM

+1 pt

La complication redoutée est :

Choix unique

- ☐ Genu Varum
- ☐ Spina Bifida
- ☐ Péritonite
- ☐ Escarre

Question 20 — QCM

+1 pt

Avant une éventuelle intervention chirurgicale, l'enfant doit notamment :

Choix unique

- ☐ Recevoir un repas copieux
- ☐ Marcher continuellement
- ☐ Être maintenu à jeun selon prescription
- ☐ Quitter immédiatement l'hôpital
- ☐ Aucune bonne réponse

Question 21 — QCD

+1 pt

Une agénésie correspond à l'absence totale ou partielle d'un membre.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 22 — QCM**+1 pt**

Le Spina Bifida est lié à une des propositions suivante, laquelle ?

Choix unique

- ☐ Une anomalie du tube digestif
- ☐ Une affection pulmonaire
- ☐ Une fracture vertébrale
- ☐ Un défaut de fermeture du tube neural

Question 23 — QCD**+1 pt**

Le Spina Bifida est lié à une anomalie de fermeture du tube neural.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 24 — QCM**+1 pt**

Une supplémentation en acide folique participe à la prévention d'une des affections suivante, laquelle ?

Choix unique

- ☐ Du Spina Bifida
- ☐ Des brûlures
- ☐ Des fractures
- ☐ De l'appendicite

Question 25 — QCD**+1 pt**

Une occlusion intestinale peut entraîner des vomissements.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 26 — QCM**+1 pt**

Parmi les pathologies suivantes, lesquelles sont des malformations congénitales ? (Deux réponses justes)

Max 2 choix

- ☐ Spina Bifida
- ☐ Appendicite aiguë
- ☐ Omphalocèle
- ☐ Péritonite

Question 27 — QCM**+1 pt**

La méthode de Ponseti est utilisée dans le traitement d'une des affections suivante, laquelle ?

Choix unique

- ☐ Du pied bot
- ☐ De l'appendicite
- ☐ Du Spina Bifida
- ☐ De l'omphalocèle

Question 28 — QCD**+1 pt**

La cicatrisation tissulaire peut se faire par régénération ou fibrose.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 29 — QCD**+1 pt**

L'appendicite aiguë est une malformation congénitale.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 30 — QCM**+1 pt**

Une complication possible de l'appendicite aiguë est :

Choix unique

- ☐ Le pied bot
- ☐ Le Spina Bifida
- ☐ La péritonite
- ☐ Le Genu Varum

Question 31 — QCM**+1 pt**

Deux éléments peuvent être observés au cours d'une occlusion intestinale néonatale :

Max 2 choix

- ☐ Vomissements
- ☐ Syndactylie
- ☐ Pied bot
- ☐ Retard d'émission du méconium

Question 32 — QCM**+1 pt**

Dans le processus de cicatrisation, deux mécanismes sont retrouvés :

Max 2 choix

- ☐ Régénération
- ☐ Méiose
- ☐ Digestion
- ☐ Fibrose

ÉTUDE DE CAS — CAS CLINIQUE 4

Un nouveau-né présente une poche kystique au niveau lombaire. Le médecin évoque une méningocèle.

Question 33 — QCM**+1 pt**

Cette malformation appartient à une des affections suivantes, laquelle ?

Choix unique

- ☐ Aux maladies digestives
- ☐ Aux anomalies du tube neural
- ☐ Aux fractures
- ☐ Aux brûlures

Question 34 — QCM**+1 pt**

La poche d'une méningocèle contient principalement un des éléments suivants :

Choix unique

- ☐ Le foie
- ☐ L'estomac
- ☐ Les méninges
- ☐ Les poumons

Question 35 — QCM**+1 pt**

Une mesure préventive importante est :

Choix unique

- ☐ La supplémentation en acide folique
- ☐ La vaccination antitétanique uniquement
- ☐ Le calcium uniquement
- ☐ Le repos au lit

Question 36 — QCM**+1 pt**

Le rôle infirmier comprend trois des propositions suivantes, lesquelles ?

Max 3 choix

- ☐ Protéger la poche
- ☐ Surveiller le nouveau-né
- ☐ Prévenir l'infection
- ☐ Aucune bonne réponse

Question 37 — QCD**+1 pt**

Une immobilisation prolongée favorise la survenue des escarres.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

ÉTUDE DE CAS — CAS CLINIQUE 2

Un enfant de 4 ans renverse de l'eau chaude sur son bras et son thorax. Il est conduit rapidement au centre de santé.

Question 38 — QCM**+1 pt**

Le premier geste approprié est :

Choix unique

- ☐ Refroidir la brûlure avec de l'eau propre
- ☐ Appliquer directement de la glace
- ☐ Appliquer du dentifrice
- ☐ Percer les phlyctènes

Question 39 — QCM**+1 pt**

Deux éléments doivent être évalués :

Max 2 choix

- ☐ Étendue de la brûlure
- ☐ Profondeur de la brûlure
- ☐ Taille des oreilles
- ☐ Aucune bonne réponse

Question 40 — QCM**+1 pt**

Chez l'enfant brûlé, une complication importante est :

Choix unique

- ☐ L'hypovolémie
- ☐ La syndactylie congénitale
- ☐ Le Genu Valgum
- ☐ La fente labiale

Question 41 — QCM**+1 pt**

L'infirmier doit également prévenir trois des propositions suivantes, lesquelles ?

Max 3 choix

- ☐ L'infection
- ☐ L'hypothermie
- ☐ La douleur
- ☐ Aucune bonne réponse

Question 42 — QCD**+1 pt**

Le Genu Valgum correspond à une déviation des membres inférieurs en X.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 43 — QCM**+1 pt**

Dans l'omphalocèle, le risque principal est notamment :

Choix unique

- ☐ Auditif
- ☐ Infectieux
- ☐ Visuel
- ☐ Dentaire

Question 44 — QCD**+1 pt**

La syndactylie correspond à une séparation excessive des doigts.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 45 — QCD**+1 pt**

Le pied bot est une malformation qui peut être présente dès la naissance.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 46 — QCM**+1 pt**

La fente labio-palatine siège :

Choix unique

- ☐ Au membre inférieur
- ☐ Au rachis
- ☐ À l'abdomen
- ☐ Au visage

Question 47 — QCM**+1 pt**

Une complication liée au décubitus prolongé est :

Choix unique

- ☐ Le Spina Bifida
- ☐ Le pied bot
- ☐ L'escarre
- ☐ L'agénésie

Question 48 — QCM**+1 pt**

Le Genu Valgum correspond à une des propositions suivante, laquelle ?

Choix unique

- ☐ À des jambes en X
- ☐ À des jambes en parenthèses
- ☐ À une absence du tibia
- ☐ À une fracture du genou

Question 49 — QCM**+1 pt**

La syndactylie correspond à une des affirmations suivante, laquelle ?

Choix unique

- ☐ À l'absence totale d'un membre
- ☐ À une déviation des genoux
- ☐ À l'union de deux ou plusieurs doigts
- ☐ À une fracture des doigts

Question 50 — QCM**+1 pt**

Une pathologie pouvant provoquer une occlusion intestinale chez le nouveau-né est :

Choix unique

- ☐ Maladie de Hirschsprung (malformation congénitale)
- ☐ Genu Valgum
- ☐ Fente labiale
- ☐ Syndactylie

Question 51 — QCD**+1 pt**

La fente labio-palatine est une malformation du visage.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 52 — QCD**+1 pt**

L'omphalocèle est une malformation de la paroi abdominale.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 53 — QCD**+1 pt**

Une fente palatine peut provoquer des difficultés d'alimentation chez le nourrisson.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 54 — QCM**+1 pt**

La complication fréquente d'une fente labio-palatine chez le nourrisson est :

Choix unique

- ☐ Difficulté d'alimentation
- ☐ Fracture du fémur
- ☐ Escarre
- ☐ Genu Varum

Question 55 — QCD**+1 pt**

Une paralysie obstétricale du plexus brachial peut être liée à un étirement du plexus brachial pendant la naissance.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 56 — QCM**+1 pt**

Parmi les formes suivantes, laquelle peut comporter une poche contenant les méninges ?

Choix unique

- ☐ Appendicite
- ☐ Omphalocèle
- ☐ Méningocèle
- ☐ Genu Varum

Question 57 — QCM**+1 pt**

Parmi les difformités suivantes, lesquelles concernent les membres inférieurs ? (Deux réponses justes)

Max 2 choix

- ☐ Genu Varum
- ☐ Genu Valgum
- ☐ Syndactylie de la main
- ☐ Fente palatine

Question 58 — QCM**+1 pt**

L'appendicite aiguë provoque classiquement deux des affirmations suivantes, lesquelles ?

Max 2 choix

- ☐ Une fièvre
- ☐ Une douleur de la fosse iliaque droite
- ☐ Une déformation du pied
- ☐ Une syndactylie

Question 59 — QCD

La méningocèle est une forme de Spina Bifida.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 60 — QCD

Le Genu Varum correspond à une déviation des jambes en X.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux