

Correction — Épreuve Chirurgie digestive (L2)

CORRECTION ÉPREUVE DE CHIRURGIE DIGESTIVE

PARTIEL

ANNÉE ACADÉMIQUE : 2019 - 2020

Population cible : Licence 2 INF(ERES)

Date : Novembre 2020TM VERSION A TM Durée : 01 H

EXERCICE I

I. QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD) (Q1 à Q18)

Choisir : A = Vrai ; B = Faux

Une réponse exacte = + 0,5 point

Une réponse fausse = -0,5 point

Aucune réponse = 0 point

Les contusions abdominales sont des traumatismes fermés de l'abdomen. A

En cas de contusions abdominales, le traumatisme peut entraîner des lésions des viscères intraabdominaux. A

Le choc indirect dans les contusions abdominales est secondaire à une percussion et déterminant des lésions d'éclatements, de dilacération ou d'écrasement. B

Le contus de l'abdomen présente des douleurs abdominales d'apparition progressive. A

Les signes d'épanchement liquidien intrapéritonéal sont présents dans le tableau de péritonite par perforation chez le patient contus de l'abdomen. B

La ponction lavage du péritoine permet de faire le diagnostic d'un hémopéritoine avec perforation d'un viscère creux. A

Lorsque le test est négatif dans la ponction lavage du péritoine, le liquide est plus ou moins rosé, faire une NFS dans ce cas. B

En cas de contusion pariétale simple, 48 à 72 h suffisent pour libérer le malade. A

On poursuit la réanimation en post-opératoire chez le patient victime d'une contusion abdominale. A

La hernie peut être congénitale ou acquise. A

Les hernies inguinales et crurales constituent les hernies de l'aîne. A

L'abdomen est la partie médiane du tronc. B

La hernie crurale ou fémorale survient le plus souvent chez les hommes de 30 à 60 ans, obèses. B

La hernie épigastrique fait partie des hernies de la ligne blanche. A

L'arrêt des matières et des gaz est un signe fonctionnel de l'étranglement herniaire. A

La pollakiurie nocturne et/ou diurne est le premier symptôme observé chez le patient atteint d'adénome de la prostate. B

Si le résidu post-mictionnel est > 300 CC, on parle de rétention sans distension. B

Tout malade présentant une occlusion doit être hospitalisé en milieu chirurgical. A

II. QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE (QCM) (Q19 à Q30)

Choisir la ou les réponse(s) juste(s)

Une réponse juste = 1 point

Une réponse fausse = 0 point

Ces différentes positions variables sont celles de l'appendicite sauf deux (02), lesquelles ?

Retro sternale

Latéro-coecale

Sous hépatique

Entéro-coecale

Retrocoecale

Les formes évolutives de l'appendicite aigue sont en faveur (choisir les 2 bonnes réponses) :

Cholécystite aiguë

Abcès appendiculaire

Stercolithe

Pyélonéphrite droite

Péritonite appendiculaire.

Les objectifs des soins infirmiers pour le client qui doit subir une appendicectomie sont les suivants sauf un (01), lequel ?

Apporter un soulagement physique pendant la période périopératoire

Administer le traitement prescrit

Réduire l'anxiété ou le stress précédant l'opération en fournissant des informations au client sur la période périopératoire.

Dans l'appendicectomie avec drainage (choisir 2 bonnes réponses) ; il faut :

Maintenir une succion nasogastrique constante

Enlever les points de suture entre le 5ème et le 7ème jour après l'opération

Donner à manger au malade le même jour de l'opération, si son état le permet

Traiter la déshydratation

Le malade peut quitter l'hôpital 48 h plus tard, si la température est normale et s'il ne ressent pas de douleur trop forte dans la région opérée.

Parmi ces examens, deux sont demandés en cas d'occlusion intestinale aiguë :

Lavement baryté

Echographie abdominale

Abdomen sans préparation

Endoscopie digestive

Electrocardiogramme

Trois des affections citées ci-dessous, constituent les étiologies des péritonites ; lesquelles ?

Les ulcères gastro-duodénaux

Abcès du foie

Cholécystite aiguë

Cystite

Colique néphrétique droite

Appendicite rompue.

La surveillance et les soins per et post-opératoires dans les interventions infirmières en cas de péritonite consistent à (choisir les 2 bonnes réponses) :

Contrôler les constantes biologiques

Préparer le dispositif pour raccorder les drains ou sondes

Signaler la présence d'infections cutanées

Contrôler le réveil physiologique du malade

Prévenir l'hypovolémie à cause des pertes de liquides dues aux vomissements.

Ces facteurs ci-dessous cités sont des facteurs favorisant les hernies (choisir les 3 bonnes réponses) :

Travail de force

Appendicite aiguë

Constipation chronique

Cholécystite aiguë

Iléite terminale

Toux chronique

Le rétablissement de la volémie se fait avec deux des propositions ci-dessous ; lesquelles ?

Injection d'antianémiques

Par perfusion de macromolécules

Par rapport sanguin

Injection d'hémostatiques

Les signes d'anémie aiguë dans le tableau d'hémopéritoine associent (choisir 2 bonnes réponses) :

Une tachycardie superficielle avec parfois battement des ailes du nez

Une agitation

Une soif intense

Une pâleur extrême des téguments et des muqueuses

Un état syncopal

Parmi les signes ci-dessous cités, deux (02) sont des signes généraux de l'appendicite aiguë ; lesquels ?

Vomissements alimentaires

Température : 38-38°5

Langue saburrale

Constipation

Nausées

La laparotomie qui est la mieux indiquée en cas de péritonite permet (choisir les 2 bonnes réponses) :

De laver la cavité péritonéale

De calmer la maladie

D'identifier et de traiter la maladie en cause

De soulager la douleur du malade

De mettre le malade à l'abri du danger.