

ÉVALUATION EN LIGNE N°2

Discipline : Santé Publique

1. Le taux d'abandon vaccinal mesure les enfants qui n'ont jamais été vaccinés.

- A- Vrai
- B- Faux

2. La dépendance se manifeste par :

- A- Un besoin excessif de drogue
- B- Une baisse de vigilance
- C- Une hallucination

3. Le principal objectif de la chaîne de froid est de maintenir les vaccins entre +2°C et +8°C :

- A- Vrai
- B- Faux

4. La stratégie de mobilisation sociale doit être conçue :

- A- Dans un cadre participatif communautaire
- B- Par un seul expert
- C- Par le gouvernement uniquement
- D- Par les bailleurs seuls

5. La mobilisation communautaire impose des solutions extérieures :

- A- Vrai
- B- Faux

6. Les températures doivent être relevées :

- A- Une fois par semaine
- B- Une fois par mois
- C- Deux fois par jours
- D- Tous les deux jours

ÉTUDE DE CAS

Vous êtes en fonction au centre de santé de Moossou et vous décidez de faire une estimation annuelle du penta pour l'activité de vaccination de routine. La population totale en 2025 est estimée à 1 759 habitants.

Données disponibles :

- Quantité en stock de penta : 50 doses
- Données de suivi :
 - Doses sorties : 400
 - Doses administrées : 320
 - Penta 1 = 114 enfants vaccinés
 - Penta 2 = 108 enfants vaccinés
 - Penta 3 = 98 enfants vaccinés

7. Quel est l'effectif annuel des bénéficiaires de cet antigène en vaccination de routine ?

- A- 120 bénéficiaires
- B- 119 bénéficiaires
- C- 150 bénéficiaires

8. Calculer le facteur de perte en penta pour l'activité de vaccination en routine ?

- A- 1,05
- B- 1,11
- C- 1,25
- D- 1,66

9. Quel est le besoin théorique annuel en penta pour l'activité de vaccination en routine ?

- A- 380 doses
- B- 428 doses
- C- 475 doses
- D- 95 doses

10. Quel est le stock de sécurité annuel en penta pour l'activité de vaccination en routine ?

- A- 107 doses
- B- 43 doses
- C- 48 doses
- D- 95 doses

11. Quel est le besoin réel en penta pour l'activité de vaccination en routine ?

- A- 380 doses
- B- 425 doses
- C- 475 doses
- D- 535 doses

- 12. Quelle est la quantité annuelle de penta à commander pour l'activité de vaccination en routine ?**
- A- 380 doses
 - B- 425 doses
 - C- 485 doses
 - D- 50 doses
- 13. Quel est le taux d'utilisation du penta pour l'activité de vaccination en routine ?**
- A- 80%
 - B- 90%
 - C- 95%
 - D- 100%
- 14. Quel est le taux d'abandon vaccinal de penta ?**
- A- 10,05%
 - B- 14,03%
 - C- 20,01%
 - D- 25,20%
- 15. Calculez la couverture vaccinale du penta :**
- A- 80,50%
 - B- 85,96%
 - C- 100%
 - D- 81,66%
- 16. Quelle est la principale conséquence d'un taux d'abandon élevé ?**
- A- Augmentation du stock de sécurité
 - B- Baisse de la couverture
 - C- Réduction du facteur de perte
 - D- Augmentation du nombre de seringues
- 17. Dans la mobilisation communautaire, la planification doit être du bas vers le haut :**
- A- Vrai
 - B- Faux
- 18. Les relais communautaires sont les agents de santé communautaires.**
- A- Vrai
 - B- Faux
- 19. Les vaccins peuvent rester plusieurs heures hors de la glacière pendant une campagne :**
- A- Vrai
 - B- Faux

20. La mobilisation sociale permet d'éliminer les mythes sur la santé.

- A- Vrai
- B- Faux

21. La mobilisation communautaire impose des solutions extérieures.

- A- Vrai
- B- Faux

22. Le contrôle du joint de porte du réfrigérateur permet de vérifier :

- A- La température du réfrigérateur
- B- Son étanchéité
- C- Son poids
- D- Son éclairage

23. Une rupture de la chaîne de froid est sans conséquence sur l'efficacité vaccinale :

- A- Vrai
- B- Faux

24. Les facteurs favorisant l'alcoolisme incluent :

- A- Personnes timides ou angoissées
- B- Milieu social
- C- Chômage
- D- Toutes les réponses ci-dessus

25. Les acteurs de la mobilisation sociale incluent gouvernements, ONG et organisations internationales :

- A- Vrai
- B- Faux

26. Le Rotarix nécessite 3 contacts vaccinaux :

- A- Vrai
- B- Faux

27. La mobilisation sociale aide à :

- A- Créer des solutions culturellement adaptées
- B- Imposer des solutions extérieures
- C- Réduire les budgets de santé
- D- Former uniquement les médecins

28. Les bénéficiaires de la mobilisation communautaire incluent individu, famille et communauté :

- A- Vrai
- B- Faux

29. Lors du test d'agitation, un flacon congelé présente :

- A- Une dissolution plus rapide
- B- Une sédimentation plus rapide
- C- Une augmentation de volume

30. Le dégivrage est recommandé lorsque la glace atteint environ 0,5 cm d'épaisseur.

- A- Vrai
- B- Faux

31. Parmi les éléments suivants, lequel fait partie du matériel conservant le froid ?

- A- Thermostat
- B- Réfrigérateur
- C- Porte-vaccins
- D- Carnet de vaccination

32. Le tabac constitue la principale cause de :

- A- Mort évitable
- B- Vagabondage
- C- Vol
- D- Hallucination

33. La politique du flacon entamé s'applique aux vaccins reconstitués.

- A- Vrai
- B- Faux

34. Pour limiter les pertes de froid, il faut :

- A- Ouvrir régulièrement le réfrigérateur
- B- Le laisser ouvert
- C- Limiter les ouvertures
- D- Éteindre le réfrigérateur chaque nuit

35. La communication de masse ne fait pas partie des stratégies de mobilisation sociale.

- A- Vrai
- B- Faux

36. L'accoutumance oblige souvent :

- A- À augmenter les doses
- B- À réduire les doses
- C- À arrêter la consommation
- D- À changer de produit