

APPAREIL GÉNITAL MASCULIN

QCM 1

Concernant la conformation de la prostate, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Elle est de forme conique à sommet inférieur
- B. La face post est subdivisée en 2 lobes latéraux par une gouttière médiane
- C. C'est la face ant qui est touchée au TR
- D. En avant de la commissure pré-spermatique on trouve la partie vésico-urétrale de la prostate
- E. En arrière de la commissure pré-spermatique on trouve l'abouchement canaux éjaculateurs

QCM 2

Concernant les rapports de la prostate, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La loge prostatique est délimitée en arrière par la lame retroprostatique
- B. Au sommet du veru montanum s'ouvre l'utricule et de chaque côté les canaux déférents
- C. A l'extérieur de la loge, les rapports se font en avant avec l'espace de Retzius (prévésical)
- D. En bas de la loge prostatique les rapports se font avec l'aponévrose périnéale profonde
- E. A l'extérieur de la loge, les rapports se font en dehors avec l'espace pelvi-rectal sup

QCM 3

Concernant les testicules, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La vaginale tapisse la totalité du testicule
- B. Le bord postéro-sup est séparé du corps de l'épididyme par le cul de sac épидидymo-testiculaire
- C. Le Rete Testis est relié à l'épididyme par les canaux déférents
- D. L'artère testiculaire chemine en avant du canal déférent dans le cordon
- E. Elle donne 2 branches épидидymaire anastomosées avec l'artère déférentielle et l'artère crémastérique

QCM 4

Concernant les voies spermatiques, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le ligament scrotal est fixé à la jonction épидидyme / canal déférent
- B. En dedans, le canal déférent est en rapport intime avec l'artère déférentielle
- C. La portion pelvienne du canal déférent croise l'artère ombilicale de haut en bas et de dehors en dedans
- D. Le canal éjaculateur naît de l'union du canal déférent et de l'utricule
- E. Les vésicules séminales sont englobées dans l'épaisseur du cul de sac de Douglass

QCM 5

Concernant l'urètre masculin, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il est constitué d'une partie initiale antérieure et d'une partie postérieure terminale
- B. Il reçoit l'abouchement des canaux éjaculateurs à la base du veru montanum
- C. Le segment antérieur est composé de 2 ensembles : un périnéal et un pénien
- D. Le segment périnéal est englobé par le corps spongieux
- E. Sa dilatation terminale forme la fossette utriculaire

QCM 6

Concernant les bourses, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Elles sont composées de 6 enveloppes fibreuses ou musculueuses
- B. Le faisceau interne de la musculueuse est responsable du réflexe crémastérien
- C. La fibreuse superficielle est issue de l'aponévrose du transverse

- D. L'espace scrotale contient les artères honteuses internes et externes
- E. Les loges testiculaires sont séparées par l'accolement des deux scrotum

QCM 7

Concernant le conduit déférent, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. C'est un conduit épais et palpable
- B. Il relie la queue de l'épididyme à l'urètre
- C. Il est composé de 5 portions
- D. Dans sa portion funiculaire, il est accompagné notamment du pédicule vasculo-nerveux testiculaire et du ligament de Cloquet
- E. Il passe au-dessus des vaisseaux iliaques de dedans en dehors

QCM 8

A propos de l'appareil génital masculin, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le canal inguinal a une orientation ventro-caudo-médiale et repose sur le ligament inguinal
- B. Le cordon spermatique permet le passage du conduit déférent dans le canal inguinal
- C. La vaginale testiculaire est une expansion de péritoine provenant de la cavité abdominale venant couvrir entièrement le testicule et l'épididyme
- D. La loge prostatique est limitée en avant par une expansion du fascia ombilico-prévésical

QCM 9

Concernant le testicule, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Embryologiquement, il est issu de la région pelvienne
- B. Lors de sa descente dans le scrotum, il emporte avec lui du péritoine qui va le contenir entièrement
- C. La vaginale forme le sinus épидидymaire entre le testicule et le corps de l'épididyme
- D. Les fascias et muscles sont en continuité avec la paroi abdominale
- E. La peau est la seule couche commune aux deux testicules

QCM 10

A propos de la prostate, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Les canaux éjaculateurs s'ouvrent dans l'urètre prostatique au niveau du colliculus.
- B. Le lobe moyen s'étend sur toute la hauteur de la glande prostatique.
- C. En avant, la prostate est en rapport avec le prolongement du fascia ombilico-prévésical.
- D. En arrière, la prostate est séparée du rectum par le cul de sac de Douglas.
- E. L'apex prostatique est en rapport avec le sphincter strié de l'urètre.

QCM 11

A propos de l'anatomie de l'appareil génital masculin, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Les artères testiculaires naissent au niveau de L1-L2
- B. Le canal inguinal a une direction vers le dedans le bas et l'avant
- C. Au niveau de la région inguinale, la veine fémorale est située dans la lacune vasculaire, en dehors et crânialement à l'artère
- D. Le fascia de Denonvillier est rétro-prostatique, et délimite deux espace: l'espace rétro-prostatique et l'espace recto-prostatique
- E. Le muscle transverse fait partie du diaphragme pelvien

QCM 12

A propos des organes génitaux de l'homme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le testicule est une glande impaire à grand axe dorso-caudal.
- B. Les tubes séminifères se réunissent de manière anarchique dans le Rete Testis.
- C. De la superficie vers la profondeur, le scrotum est formé de la peau, du dartos, du fascia spermatique externe, du fascia crémasterique, du fascia spermatique interne, et de la vaginale.

- D. L'épididyme est accolé le long du bord postérieur du testicule sur toute sa hauteur.
- E. Dans sa portion pelvienne, le canal déférent est sous-péritonéal.

QCM 13

A propos de la prostate, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La prostate possède une face supérieure, un apex inférieur, 2 faces latérales, une face antérieure et une face postérieure.
- B. La prostate se situe en arrière du pubis, en avant du rectum et sous le sphincter strié de l'urètre.
- C. Le lobe moyen de la prostate se situe en arrière de l'urètre et au-dessus des canaux éjaculateurs.
- D. la prostate est séparée du rectum par le cul de sac de Douglas.
- E. La prostate est vascularisée par l'artère vésicale inférieure, l'artère déférentielle, et l'artère rectale moyenne.

QCM 14

A propos du testicule, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. est surmonté par l'épididyme, dont la tête est la partie la plus volumineuse (globus major)
- B. est vascularisé par les veines testiculaires, qui se jettent dans la veine cave inférieure
- C. est vascularisé par les artères testiculaires, qui proviennent de l'aorte
- D. est vascularisé par des lymphatiques remontant au niveau lombaire
- E. peut subir une torsion, appelée « orchite »

QCM 15

A propos de la prostate, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. entoure l'urètre entre la symphyse pubienne (en avant) et le rectum (en arrière)
- B. possède un sillon médian antérieur
- C. est séparée en trois lobes dans sa partie rétro-urétrale
- D. est innervée par le plexus hypogastrique
- E. est vascularisée par le plexus de Santorini

QCM 16

A propos du testicule, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le testicule gauche est physiologiquement plus bas que le testicule droit.
- B. Il est orienté caudalement et dorsalement.
- C. La vaginale est une évagination séreuse du péritoine.
- D. L'épididyme repose sur le bord postéro-supérieur et la face médiale du testicule.
- E. Les veines testiculaires droites naissent de la veine cave inférieure en L2/L3.

QCM 17

Concernant le testicule, indiquez la ou les proposition(s) fausse(s)

- A. La face médiale du testicule est longée par le canal déférent
- B. Le testicule n'est pas recouvert de vaginale au niveau de sa face latérale
- C. Les tubes séminifères contournés d'un lobule se réunissent dans le Rete Testis
- D. Le ligament épидидymaire inférieur relie le testicule avec le corps de l'épididyme
- E. L'artère testiculaire naît de l'aorte à hauteur de L1-L2

QCM 18

Concernant les organes génitaux externes, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Les différentes couches de la bourse, de la surface à la profondeur sont : la peau, le dartos, le fascia spermatique externe, le fascia intermédiaire, le fascia crémastérique et le fascia spermatique interne.
- B. Les piliers du pénis s'insèrent au bord supérieur des branches ischiopubiennes et au niveau de la partie antérieure du diaphragme pelvien.

- C. La base du gland est taillée en biseau constituant un relief : c'est la couronne du gland.
- D. L'urètre pénien s'étend du sinus bulbaire à la fosse naviculaire
- E. Le drainage veineux de la verge s'effectue surtout par la veine dorsale de la verge

QCM 19

Concernant le testicule, indiquez la ou les proposition(s) fausse(s)

- A. La vaginale est une séreuse qui correspond à une invagination du péritoine
- B. Le testicule n'est pas recouvert de vaginale au niveau de sa face latérale
- C. Les tubes séminifères contournés d'un lobule se réunissent dans le Rete Testis
- D. L'artère épидидymaire antérieure s'anastomose avec l'artère crémasterique et l'artère du conduit déférent
- E. Les veines crémasteriques se drainent dans le plexus veineux pampiniforme

QCM 20

Concernant les glandes annexes, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le lobe moyen se situe entre l'urètre et les conduits éjaculateurs
- B. Au niveau de la base de la prostate, la fente prostatique contient l'urètre
- C. L'artère vésicoprostatique vient de l'artère vésicale inférieure
- D. Le sphincter lisse entoure l'urètre à sa sortie de la prostate
- E. Les vésicules séminales sont obliques en bas, en avant et en dedans

QCM 21

Concernant la prostate, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le lobe moyen se situe entre l'urètre et les conduits éjaculateurs
- B. Latéralement, la prostate est longée par le fascia prostatique qui est une expansion du fascia pelvien pariétal
- C. Au niveau de la base de la prostate, la fente prostatique contient l'urètre
- D. L'utricule prostatique assure l'impossibilité de la miction pendant l'érection et empêche la remontée des spermatozoïdes dans la vessie
- E. La prostate est surtout vascularisée par l'artère vésicale inférieure qui donne une artère prostatique et une artère vésicoprostatique, et par l'artère pudendale

QCM 22

A propos du pénis, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le corps spongieux engaine l'urètre
- B. Le pénis comprend une racine fixe et un corps mobile
- C. Au repos, le corps du pénis est infra-symphysaire
- D. La fossette naviculaire est située au niveau du bulbe du corps spongieux
- E. Les corps spongieux et les corps caverneux sont juxtaposés

QCM 23

A propos du pénis, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le fascia spermatique profond du pénis se prolonge dans le prépuce
- B. Le ligament suspenseur du pénis s'insère caudalement sur la symphyse pubienne
- C. Le pénis est entre autre formé de 2 corps érectiles
- D. La couronne du gland surplombe le sillon balano-préputial
- E. La veine dorsale profonde du pénis s'interpose entre le fascia superficiel du pénis et le fascia profond du pénis

QCM 24

A propos de la prostate, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Elle est séparée en 3 parties par l'urètre et les canaux éjaculateurs
- B. Sa portion antérieure est la plus sensible aux cancers
- C. Sa face postérieure est creusée d'un sillon médian
- D. Elle est située entre en avant la symphyse pubienne et en arrière le rectum
- E. Elle est fixée par les fascias pubo-prostatique et vésico-rectal

QCM 25

A propos du pénis, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le corps du pénis représente sa portion fixe et invisible
- B. Les corps caverneux s'insèrent sur l'ischion et sur la partie antérieure du diaphragme pelvien
- C. Le corps spongieux se termine en avant par le gland
- D. Le gland est percé à son extrémité de l'orifice urétéral
- E. L'urètre chemine entre les 2 corps spongieux et le corps caverneux

QCM 26

A propos de la vascularisation du testicule, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'artère testiculaire est une branche de l'aorte thoracique
- B. Les artères et veines testiculaires croisent l'urètre en avant
- C. La veine testiculaire traverse l'orifice profond puis l'orifice superficiel du canal inguinal avant de se retrouver dans le scrotum
- D. La veine testiculaire gauche se jette dans la veine rénale gauche
- E. Le testicule est directement vascularisé par les branches médiales et latérales des artères testiculaires

QCM 27

A propos des voies spermatiques, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La tête de l'épididyme (globus major) coiffe le pôle supérieur du testicule
- B. Le testicule est séparé de la tête de l'épididyme par le sinus épидидymaire
- C. Le conduit déférent est rigide à lumière large
- D. Le conduit déférent se jette dans l'urètre prostatique de part et d'autre de l'utricule prostatique
- E. Le canal éjaculateur est entièrement intra-prostatique

QCM 28

A propos du testicule, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il a une fonction purement fonctionnelle
- B. On lui décrit 2 faces : antéro-médiale et postéro-latérale
- C. Le testicule droit est en contact direct avec le gauche
- D. Le conduit déférent longe la face médiale du testicule
- E. Le testicule est entièrement recouvert de vaginale

QCM 29

A propos de la vascularisation du testicule, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

A propos des organes génitaux masculins externes, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le gland est un renflement du corps caverneux
- B. La face inférieure est la verge est aussi appelée face ventrale ou face urétrale
- C. Le ligament fundiforme du pénis est une émanation de la ligne blanche de l'abdomen
- D. La fossette naviculaire est une dilatation du gland
- E. Le gland est recouvert par le prépuce

QCM 30

A propos de la prostate, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'apex prostatique est en rapport avec le sphincter lisse de l'urètre
- B. La prostate est en rapport avec le plexus veineux de Santorini en avant
- C. Le fascia rétro-prostatique est aussi appelé fascia de Denonvilliers
- D. L'artère vésicale inférieure donne une branche prostatique et une branche vésicoprostatique
- E. L'innervation prostatique dépend du plexus hypogastrique

QCM 31

A propos des organes génitaux masculins externes, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La verge possède une portion cachée fixe et une portion visible mobile
- B. L'albuginée des corps caverneux est un prolongement de l'albuginée du testicule
- C. Au niveau de la racine de la verge, la partie postérieure du corps spongieux est en rapport avec le corps périnéal
- D. Au niveau de la racine de la verge, les muscles ischiocaverneux sont latéraux par rapport au corps spongieux
- E. Les piliers de la verge s'insèrent sur les branches ischio-pubiennes
- F. La paroi postérieure de la vésicule séminale a un rapport direct avec le rectum

QCM 32

A propos de la prostate, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La prostate est en rapport avec le fascia ombilico prévésical en avant
- B. La prostate est en rapport avec le cul de sac de Douglas en arrière
- C. L'isthme prostatique se situe en avant de l'urètre prostatique
- D. Le lobe moyen se situe entre l'urètre prostatique en avant, et les canaux déférents en arrière
- E. L'apex prostatique est inférieur

QCM 33

A propos du canal déférent, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Dans son segment pelvien, le canal déférent est sous-péritonéal
- B. Le canal déférent a un calibre externe de 0,5 mm
- C. Au cours de son trajet, le canal déférent surcroise l'urètre au-dessus et en avant
- D. L'ampoule déférentielle se réunit au canal de la vésicule séminale pour former le canal éjaculateur
- E. Le canal déférent s'ouvre dans l'urètre au niveau du colliculus séminal

QCM 34

A propos de la vésicule séminale, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Si la vessie est remplie, la vésicule séminale a tendance à se positionner verticalement
- B. Si la vessie est vide, la vésicule séminale a tendance à se positionner horizontalement
- C. La vésicule séminale n'est jamais palpable par le toucher rectal
- D. La paroi postérieure de la vésicule séminale est en rapport avec le cul de sac de Douglas

QCM 35

A propos du canal déférent, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le segment scrotal est en rapport avec le septum scrotal médialement
- B. Le segment scrotal est en rapport avec le testicule recouvert de vaginale médialement
- C. Sur une coupe axiale du cordon spermatique, l'artère testiculaire est en arrière du canal déférent
- D. Le segment inguinal du canal déférent chemine de l'orifice inguinal profond vers l'orifice inguinal superficiel
- E. Dans le segment inguinal, le canal déférent est accompagné du nerf ilio-hypogastrique et des nerfs ilio-inguinaux

QCM 36

A propos de l'épididyme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le Globus Minor de l'épididyme se termine typiquement par l'Appendix Epididymis
- B. La tête de l'épididyme est en rapport en arrière avec le mésorchium
- C. Le sinus épидидymaire est un pli d'albuginée qui s'insinue entre le corps de l'épididyme et le testicule
- D. La queue de l'épididyme se prolonge par le canal déférent
- E. La queue de l'épididyme est reliée au testicule par le ligament scrotal

QCM 37

A propos des testicules, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La couche musculaire sous-cutanée du scrotum est aussi appelée le dartos
- B. Dans le scrotum, l'albuginée est comprise entre la couche vasculaire en profondeur, et la face pariétale de la vaginale superficiellement
- C. Les fibres crémastériennes proviennent du muscle Oblique externe
- D. Les artères testiculaires naissent de l'aorte, en dessous de l'origine de l'artère mésentérique supérieure
- E. Le plexus pampiniforme, au niveau du bord postérieur du testicule, permet son drainage veineux

QCM 38

A propos des testicules, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Ce sont des organes pairs qui ont une orientation cranio-dorsale
- B. La face latérale du testicule est en rapport avec l'épididyme
- C. Le testicule est entouré par la vaginale testiculaire, un vestige du fascia transversalis
- D. La fonction exocrine des testicules ne se met en marche qu'à partir de la puberté
- E. Le canal déférent remonte le long de la face latérale du testicule

QCM 39

A propos de l'embryologie de l'appareil génital masculin, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La réunion entre les deux canaux de Wolff contralatéraux se fait aux alentours de S6
- B. Le canal de Wolff rentre en contact avec le Rete Testis
- C. Le canal de Wolff ne donne que le conduit déférent
- D. Le canal de Wolff ne laisse pas de reliquats
- E. Le canal de Muller laisse notamment un reliquat : l'utricule prostatique

QCM 40

A propos de l'embryologie de l'appareil génital masculin, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'éperon uro-génital croît jusqu'à la membrane cloacale
- B. Au stade indifférencié, on retrouve le tubercule cloacal en arrière de la membrane cloacale
- C. Les plis cloacaux donnent les plis urogénitaux en avant et les plis anaux en arrière
- D. Les bourrelets génitaux donnent le scrotum
- E. La descente testiculaire n'est due qu'aux hormones mâles

QCM 41

A propos de l'embryologie de l'appareil génital masculin, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le drainage des néphrons primitifs se fait par le canal de Wolff
- B. La crête uro-génitale est à l'origine des gonades
- C. La crête uro-génitale se différencie à l'aide d'hormones après la fixation des cellules germinales primordiales
- D. Les cordons primitifs restent au contact de l'épithélium coelomique
- E. Toutes les réponses sont vraies

QCM 42

A propos de la vascularisation du testicule, indiquez la ou les proposition(s) fausse(s)

- A. Artérielle est essentiellement assurée par les artères testiculaires provenant de l'aorte abdominale à hauteur de L2-L3
- B. Veineuse forme le plexus pampiniforme dans le cordon
- C. Lymphatique est drainée au niveau lombaire
- D. L'artère testiculaire donne généralement deux collatérales : les artères épidydimaires antérieure et postérieure
- E. La veine testiculaire gauche se jette dans la veine cave inférieure

QCM 43

A propos de l'épididyme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. On le divise en trois parties : la tête, le corps et la queue
- B. Le mésorchium est le lieu de passage des ductules efférents vers la tête de l'épididyme
- C. Dans la tête de l'épididyme, les ductules efférents se rejoignent pour former le conduit déférent
- D. Le conduit déférent sort au niveau de la queue de l'épididyme pour remonter ensuite en avant du testicule.
- E. Une orchite correspond à une infection de l'épididyme

QCM 44

A propos des rapports du testicule, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il est en rapport latéralement avec l'épididyme
- B. Il est en rapport en avant avec le cordon et le conduit déférent
- C. Son extrémité supérieure est rattachée à la tête de l'épididyme uniquement par le ligament épidydimaire supérieur
- D. Le testicule est séparé du corps de l'épididyme par le sinus épidydimaire

QCM 45

A propos des couches entourant le testicule, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La couche la plus profonde est le fascia spermatique interne
- B. La vaginale testiculaire se compose de deux feuillets délimitant une cavité : la cavité vaginale
- C. Le fascia crémasterien se compose de fibres musculaires venant du muscle oblique externe.
- D. La tunique vasculaire du testicule se trouve accolée au bord interne de l'albuginée
- E. L'albuginée est une tunique épaisse qui divise le parenchyme testiculaire en septula grâce aux lobules

QCM 46

A propos du testicule, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il présente deux faces : une antérieure et une postérieure
- B. La direction de son grand axe est postérieure et caudale
- C. Le testicule n'a pas de rapports postérieurs
- D. Il est entièrement entouré de la vaginale testiculaire

QCM 47

A propos des vésicules séminales, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Sont des glandes musculo-membraneuses, paires et symétriques
- B. Sont situées entre les deux ampoules des conduits déférents
- C. Constituent un réservoir de sperme entre deux éjaculations
- D. Sont obliques en bas, en arrière et latéralement
- E. Sont innervées par des branches de l'artère vésicale inférieure

QCM 48

A propos du testicule, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il est surmonté par l'épididyme dont la tête lui est reliée par les ductules efférents
- B. Il est vascularisé par les veines testiculaires qui se jettent dans la veine cave inférieure
- C. Il est séparé du corps de l'épididyme par le sinus épидидymaire
- D. Son grand axe est dirigé vers l'arrière et le haut
- E. Sa face médiale est en rapport notamment avec le conduit déférent

QCM 49

A propos du testicule, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. C'est un organe génital externe
- B. Les testicules droit et gauche sont en rapport direct
- C. Son grand axe a une direction inféro-postérieure
- D. Son produit de sécrétion est acheminé du Rete Testis au canal épидидymaire par les ductules efférents

QCM 50

A propos du pénis, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'urètre s'abouche au niveau du col du gland du pénis.
- B. Le prépuce est un tissu cutané.
- C. L'albuginée entoure les corps caverneux et spongieux.
- D. Le frein du prépuce est un prolongement dorsal et médian du prépuce qui vient se fixer au gland du pénis.

QCM 51

A propos du pénis, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le ligament suspenseur du pénis relie la base du corps du pénis à la paroi abdominale postérieure.
- B. Le muscle bulbospongieux s'insère sur le corps périnéal.
- C. Le muscle bulbospongieux est impair comme le corps spongieux qu'il entoure.
- D. Il présente une gouttière concave en haut qui accueille le corps spongieux.
- E. Le muscle compresseur de la veine dorsale du pénis est constitué par le faisceau postérieur du muscle bulbospongieux.

QCM 52

A propos du pénis, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Les piliers du pénis se fixent sur la face latérale des branches ischio-pubiennes.
- B. Le corps spongieux présente 2 renflements : le gland (proximal) et le bulbe (distal).
- C. Les corps spongieux sont des corps érectiles.
- D. Le gland est séparé du corps de la verge par le sillon balano-préputial situé dans un plan coronal.

QCM 53

A propos de la vascularisation du pénis, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il y a une vascularisation profonde dépendante du système iliaque interne et une vascularisation superficielle dépendante du système iliaque externe
- B. Les artères profondes du pénis circulent dans les corps spongieux
- C. La veine dorsale superficielle est comprise entre le fascia superficiel et la peau du pénis
- D. L'érection est sous la dépendance directe de la vascularisation

QCM 54

A propos de l'épididyme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Est usuellement étudié en trois parties : sa tête, son genou et sa queue
- B. Est entièrement recouvert de vaginale

- C. N'est pas du tout recouvert de vaginale
- D. Possède une tête arrondie et une queue aplatie
- E. Se poursuit à son extrémité inférieure par le conduit éjaculateur

QCM 55

A propos des bourses, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La vaginale du testicule qui entoure entièrement le testicule et sa glande sus-jacente est la tunique la plus profonde.
- B. Le ligament de Cloquet est un prolongement de cette vaginale, continuité du péritoine abdominal au niveau de l'orifice profond du canal inguinal.
- C. Le septum scrotal est l'accolement médial des dartos.
- D. Le scrotum est innervé par le nerf ilio-inguinal et le nerf périnéal.
- E. La vaginale est composée de deux feuilletts (pariétal pour le testicule et viscéral pour le scrotum) et d'une cavité virtuelle.
- F. La vaginale est une cavité virtuelle qui peut devenir réelle.

QCM 56

A propos du conduit déférent, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il n'est pas palpable
- B. Il n'est pas entouré de vaginale
- C. Il est cylindrique sauf à son origine (l'ampoule du conduit déférent)
- D. Il mesure 15 à 25cm de long pour 2mm de diamètre
- E. Il s'unit au conduit de la glande séminale à sa terminaison

QCM 57

A propos des bourses, indiquez la ou les proposition(s) fausse(s)

- A. Elle est divisée par deux sillons : le raphé scrotal et le raphé du pénis.
- B. Le scrotum est constitué histologiquement de 6 plans de couverture.
- C. La peau, sur l'axe médian, comprend un septum qui délimite les deux bourses : droite et gauche
- D. Le fascia superficialis se prolonge pour donner au niveau des bourses le fascia spermatique interne.
- E. La vaginale est une invagination du péritoine et est constituée d'un feuillet viscéral et un feuillet pariétal qui adhère fortement au testicule.

QCM 58

A propos du scrotum, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le testicule est entouré de 6 tuniques successives dont la plus profonde est la vaginale, émanation du fascia transversalis.
- B. Le muscle crémaster se situe entre le fascia spermatique interne et le fascia spermatique externe, respectivement fascias spermatiques superficiel et profond.
- C. Le dartos est situé entre la peau et le fascia spermatique externe.
- D. Le vestige du processus vaginal qui entoure les fascias superficialis et transversalis est appelé ligament de Cloquet.
- E. Les testicules sont situés dans le scrotum qui est relié à la cavité abdominale par le ligament suspenseur du pénis.

QCM 59

A propos de l'union entre les voies spermatiques et l'urètre, indiquez la ou les proposition(s) fausse(s)

- A. Elle se fait au niveau de l'urètre prostatique
- B. Le veru montanum évite la miction durant l'éjaculation
- C. Les canaux éjaculateurs sont de part et d'autre de l'utricule prostatique
- D. Dans la prostate, les canaux éjaculateurs sont obliques en bas et en avant

E. Aucune des propositions précédentes n'est fausse

QCM 60

A propos du conduit déférent, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Sa portion scrotale chemine sur le versant postéro-latéral du testicule
- B. Sa portion inguinale fait directement suite à sa portion scrotale
- C. Sa portion funiculaire fait directement suite à sa portion scrotale
- D. Sa portion inguinale démarre au moment où il s'incorpore au cordon spermatique
- E. Sa portion inguinale est accompagnée des nerfs génito-fémoral et ilio-inguinal

QCM 61

A propos de la portion pelvienne du conduit déférent, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Démarre au niveau de l'orifice superficiel du canal inguinal
- B. Démarre au niveau de l'orifice profond du canal inguinal
- C. Passe au-dessus des vaisseaux épigastriques inférieurs
- D. Passe au-dessus de l'artère ombilicale
- E. Passe au-dessus de l'uretère

QCM 62

A propos de la vascularisation épидидymaire, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'artère du conduit déférent peut provenir des artères iliaque interne ou ombilicale
- B. L'artère crémasterique s'anastomose avec les artères déférentielle et testiculaire
- C. L'artère testiculaire est située en dehors du cordon spermatique
- D. La veine épigastrique inférieure donne comme collatérale la veine crémasterique, qui arrive à l'épididyme par sa queue
- E. Toutes les artères participant à la vascularisation de l'épididyme proviennent, à l'origine, de l'artère iliaque interne, excepté l'artère testiculaire

CORRECTION

1	ABD	31	ACDE	61	BCDE
2	E	32	ACE	62	BE
3	BDE	33	AD		
4	ABC	34	ABD		
5	CD	35	AE		
6	AB	36	BDE		
7	ACD	37	ADE		
8	ABD	38	BD		
9	CE	39	ABE		
10	ACE	40	ACDE		
11	BD	41	ABCE		
12	CE	42	BDE		
13	ACE	43	A		
14	ACD	44	AD		
15	ACDE	45	B		
16	ABC	46	B		
17	BCDE	47	AE		
18	CE	48	ACE		
19	ABCDE	49	AC		
20	ACE	50	B		
21	ABE	51	BCD		
22	ABC	52	A		
23	DE	53	CD		
24	ACDE	54	D		
25	BC	55	BCD		
26	DE	56	BE		
27	AE	57	ABCDE		
28	D	58	C		
29	BCE	59	E		
30	BCDE	60	CE		

FACULTE DE MEDECINE & MAIEUTIQUE
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE