

30%	(III) בצורה ניכרת, עם השפעה על המצב הכללי	(ב) כיב הקיבה או כיב התריסריון :
0%	(I) כיב שהתפתח, אין הפרעות	
***10%	(II) בצורה קלה, התקפים קצרים ונדירים	
**30%	(III) בצורה בינונית (התקפים חוזרים, ממושכים יותר)	
60%	(IV) בצורה קשה עם סיבוכים כגון : שטפי-דם, היצרות השוער, השפעה ניכרת על המצב הכללי	(ג) כיב הקיבה או כיב התריסריון לאחר ניתוח - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 14

13. מעיים

	ENTERO-COLITIS CHRONICA INCLUDING SPASTIC AMEBIC COLITIS	(1)
**0%	(א) הפרעות קלות, עצירות ושלשול לחליפין, ללא השפעה על המצב הכללי	
***10%	(ב) בצורה בינונית	
	(2) דלקת כיבית של המעי הגס	
***10%	(א) בצורה קלה עם 3-4 יציאות ביום, ללא אנמיה, ללא השפעה על המצב הכללי	
30%	(ב) בצורה בינונית עם התלקחויות לעתים קרובות	
50%	(ג) בצורה יותר מבינונית, עם התלקחויות תכופות, אנמיה, מצב תזונתי ירוד	
70%	(ד) בצורה קשה, עם חוס, אנמיה קשה, המצב הכללי ירוד מאד	
100%	(ה) בצורה חמורה, זקוק לאשפוז	
	DIVERTICULITIS - DIVERTICULOSIS	(3)
0%	(א) ללא הפרעות	
	(ב) ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (1)	
	MALABSORPTION SYNDROME INCLUDING COELIAC DISEASE, SPRUE	(4)
20%	(א) בצורה קלה, שלשול שומני, 3 או 4 יציאות ליום, ללא השפעה על המצב הכללי, בלי אנמיה	
40%	(ב) בצורה בינונית עם אנמיה, ירידה במשקל	
70%	(ג) בצורה קשה עם ירידת חלבוני הדם (HYPOPROTEINEMIA) בצקת ברגליים ואנמיה ניכרת, הפרעות באלקטרוליטים וכו'	
	(5) מחלות כגון : CROHN'S DISEASE, מחלות גרנולומטוטיות של המעיים, שחפת המעיים - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (2)	

14. פציעות וניתוחי קיבה ומעיים

	(1) מצב שלאחר פציעה או ניתוחים של הקיבה והמעיים	
0%	(א) ללא הפרעות, מצב התזונה הכללי טוב	
***10%	(ב) ישנן הפרעות קלות של מערכת העיכול, המצב הכללי טוב	
20%	(ג) ישנן הפרעות בלתי ניכרות של מערכת העיכול, המצב הכללי ירוד	
40%	(ד) ישנן הפרעות ניכרות בדרכי העיכול, המצב הכללי ירוד	
60%	(ה) מצב אחרי יותר מניתוח אחד עם סימנים של חסימה חלקית חשוכת מרפא	
80%	(ו) ישנן הפרעות קשות, אך מסוגל לעבודות בית קלות בלבד	
100%	(ז) ישנן הפרעות קשות בעיכול גם לאחר ניתוח נוסף, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד	
	(2) נצור קבוע של המעיים	
20%	(א) ישנה הפרשה קלה ונדירה של צואה	
30%	(ב) ישנה הפרשה קלה וקבועה של צואה	
80%	(ג) ANUS PRAETER NATURALIS	

14א. עודף משקל והשמנת יתר⁹²

0%	(1) BMI של 25-29.9 (עודף משקל קל)	
0%	(2) BMI של 30-34.9 (השמנת יתר, דרגה 1)	
***10%	(3) BMI של 35-39.9 (השמנת יתר, דרגה 2)	
20%	(4) BMI של 40 או יותר (השמנת יתר, דרגה 3)	

⁹² פרט 14א - נוסף בק"ת 6675, התשס"ח, עמ' 914, ת"ת 1.6.08, בנוסח דלעיל.

ראה הוראת תחולה והוראות מעבר בהערת שוליים לפרט 2א.
בק"ת 7057 התשע"ב עמ' 236, ת"ת 8.12.11, בפרט משנה (3) במקום "39.0" בא "39.9" ובסייפא במקום "משקל הגוף בריבוע חלקי גובהו" בא "משקל הגוף (בקילוגרמים) לבין גובהו (במטרים) בריבוע".
הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על מי שענינו נדון בועדה ביום 1.5.08 ולאחריו.

לעניין זה, יש לקבוע את חומרת הליקוי לפי מדד מסת הגוף - BMI(BODY MASS INDEX)
 כפי שהוא מחושב על פי היחס בין משקל הגוף (בקילוגרמים) לבין גובהו (במטרים)
 בריבוע

15. פי הטבעת

	FISSURA ANI	(1)
0%	(א) ללא הפרעות	
10%	(ב) ישנן הפרעות ניכרות	
	FISTULA ANI	(2)
10%	(א) המפרישה לסירוגין ללא הפרעות ניכרות	
20%	(ב) עם הפרשה ממושכת, תמידית או חוזרת (RECIDIVANS) לאחר ניתוח, עם הפרעות ניכרות	
	מצר - (STRICTURA)	(3)
30%	(א) בצורה בינונית	
50%	(ב) בצורה קשה	
	PROLAPSUS MUCOSAE RECTI	(4)
0%	(א) ללא הפרעות	
10%	(ב) קיימות הפרעות	
	PROLAPSUS RECTI TOTALIS	(5)
20%	(א) ניתן להחזרה	
40%	(ב) קבוע, ישנן הפרעות ניכרות	
80%	(6) איבוד מוחלט של השליטה על השוער (SPHINCTER)	
	VARICES HAEMORRHOIDALES חיצוניים או פנימיים	(7)
0%	(א) בולטים, ישנן הפרעות בלתי ניכרות	
***10%	(ב) בולטים, עם דימומים שכיחים	
20%	(ג) בולטים בצורה קשה, ישנם דימומים שכיחים עם אנמיה סקוונדרית וסיבוכים אחרים כגון FISSURA ANI או FISTULA ANI בצורה קלה	

16. מחלות הכבד ודרכי המרה

	שחמת הכבד	(1)
**20%	(א) בצורה קלה, הגדלת הכבד, צהבת מזמן לזמן והפרעה קבועה בתפקודי הכבד	
**40%	(ב) בצורה בינונית, עם הפרעות בולטות יותר בתפקודי הכבד והשפעה בולטת על המצב הכללי	
70%	(ג) בצורה קשה, עם דליות הושט, מיימת (ASCITES) עם או בלי שטפי דם, עם או בלי הפרעות חולפות במערכת העצבים	
100%	(ד) בצורה חמורה, החולה זקוק לשכיבה וסיעוד	
	מצב לאחר ניתוח דלף במחזור הדם של וריד השער	(2)
40%	(א) המצב הכללי משביע רצון, ללא מיימת וללא שטפי-דם חוזרים, אין הפרעות מצד מערכת העצבים	
70%	(ב) קיימת מיימת או שטפי-דם חוזרים עם או בלי הפרעות חולפות מצד מערכת העצבים	
	(PORTAL SYSTEMIC ENCEPHALOPATHIA)	
100%	(ג) המצב חמור, החולה מרותק למיטה או זקוק לסיעוד	
	מצב לאחר דלקת כבד זיהומית (INFECTIOUS HEPATITIS)	(3)
0%	(א) לא נשארו הפרעות	
	(ב) ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (1).	
	ECHINOCOCCUS OF LIVER	(4)
0%	(א) מסויד שאיננו גורם להפרעות, אין פגיעה בתפקודי הכבד	
0%	(ב) לאחר ניתוח, ללא הפרעות	
	(ג) נשארו הפרעות לאחר הניתוח, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף סרכות הצפק.	
	(ד) פעיל - להעריך בהתאם להפרעות, לפי סעיף קטן (1).	
	מצב לאחר ניתוח של מורסה של הכבד (ABSCCESS OF LIVER)	(5)
0%	(א) אין הפרעות	
	(ב) נשארו הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף סרכות הצפק	
	(ג) דלקת כרונית של כיס המרה עם או בלי אבני המרה	(6)
0%	(א) ללא הפרעות	
***10%	(ב) בצורה קלה, התקפים נדירים ללא חום או צהבת, עם הפרעות בעיכול	
**20%	(ג) בצורה בינונית, התקפים די תכופים ללא חום או צהבת, הפרעות עיכול בולטות	
40%	(ד) בצורה קשה, עם התקפים תכופים המלווים לעתים בחום או צהבת, עם הפרעה ניכרת במצב הכללי	

	(7) מצב לאחר ניתוח בכיס המרה ודרכי המרה
0%	(א) ללא הפרעות או הפרעות קלות בלבד
***10%	(ב) קיימות הפרעות בינוניות
**20%	(ג) POST CHOLECYSTECTOMY SYNDROME בצורה בולטת
40%	(ד) הופעות חוזרות של CHOLANGITIS עם התקפי חום מלווים בצמרמורת ולעתים צהבת

17. טחול

0%	(א) הגדלה קלה של הטחול ללא השפעה על המצב הכללי
***10%	(ב) מצב לאחר כריתת הטחול
	(ג) ⁹³ טחול מוגדל עם תלונות -
20%	(I) בלא סיבה ברורה
	(II) עם סיבה ברורה - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפריט המתאים שבשלו הוגדל הטחול.

17א. לבלב⁹⁴

	מצב לאחר דלקת או ניתוח -
0%	(א) בלא תלונות או סימנים במערכת העיכול
	(ב) עם כאבי בטן שכיחים ועליה באנזימים -
20%	(1) בלא הפרעה בספיגה
	(2) עם הפרעת ספיגה -
40%	(א) המאוזנת באמצעות טיפול תרופתי
70%	(ב) הגורמת לתת-תזונה באופן המחייב השלמת תזונה דרך פיוס
100%	(ג) המחייבת הזנת על

18. צפק

	(1) התדבקויות או תוצאות אחרות לאחר ניתוח, פציעה או מחלה בחלל הבטן
0%	(א) ישנן הפרעות נדירות וקלות
***10%	(ב) ישנן הפרעות בינוניות כגון תקופות של שלשול, עצירות או מטאוריזמוס
**20%	(ג) ישנן הפרעות כני"ל והן קבועות
30%	(ד) ישנן הפרעות קשות
	(2) שחפת של הצפק עם הופעות של חסימה חלקית (SUB-ILEUS)
100%	(א) בשלב הפעיל
	(ב) במצב לאחר השלב החרף, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סרכות הצפק, סעיף קטן (1).

19. בקע

**0%	(א) בקע המפשעה הניתן להחזרה (REPONIBILIS) חד או דו-צדדי, ישנן הפרעות בלתי ניכרות
**0%	(ב) מצב אחרי ניתוח בקע המפשעה, חד או דו-צדדי, עם תוצאות טובות
**10%	(ג) בקע גדול חד-צדדי, הניתן להחזרה (REPONIBILIS) עם הפרעות בלתי ניכרות, הדורש החזקה ע"י חגורה
**15%	(ד) מצב כמתואר בסעיף קטן (ג) דלעיל, והוא דו-צדדי
**10%	(ה) בקע חוזר (RECIDIVANS) חד-צדדי, עם הפרעות בלתי ניכרות, הדורש החזקה ע"י חגורה
**15%	(ו) מצב כמתואר בסעיף קטן (ה) דלעיל, והוא דו-צדדי
**20%	(ז) בקע גדול שאינו ניתן להחזרה (IRREPONIBILIS) או בלתי ניתן להחזקה ע"י חגורה - עם הפרעות בלתי ניכרות, חד או דו-צדדי
**30%	(ח) מצב כמתואר בסעיף קטן (ז) עם הפרעות ניכרות
**	(ט) בקע פמורלי (HERNIA FEMORALIS) - אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבעו לגבי בקע במפשעה (HERNIA INGUINALIS)

⁹³ בק"ת 7584, התשע"ו, עמ' 286, ת"ת 1.7.16, הוחלף פרט 17(ג). נוסחו היה:

"(ג) הגדלה ניכרת של הטחול HYPERSPLENISM עם הפרעות במערכת הדם המתבטאות באנמיה לבקופניה או טרומבופניה, עם או בלי הפרעות מכניות ניכרות - 30%"

⁹⁴ ראו הוראות תחילה ותחולה לתיקון התשע"ו בסוף הערת השוליים לפרט משנה 1(3) לחלק א' לתוספת. פרט 17א - נוסף בק"ת 6675, התשס"ח, עמ' 914 ת"ת 1.6.08. ראה הוראות תחולה והוראות מעבר בהערות שוליים לפרט 2א.

20. פציעות ובקעים של קיר הבטן

0%	(א) מצב אחרי פציעה או ניתוח בבטן, ללא בקע וללא התרופפות קיר הבטן
**10%	(ב) מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן, המלווה בהתרופפות קיר הבטן המצריך שימוש בחגורה אורטופדית
**20%	(ג) מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם התרופפות ניכרת של דופן הבטן ; ישנו חוסר שרירים או בקע גדול המצריכים שימוש בחגורה אורטופדית
40%	(ד) מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם EVENTRATIO גדולה
0%	(ה) HERNIA LINAE ALBAE או HERNIA UMBILICALIS קטנות וללא הפרעות
***10%	(ו) HERNIA LINAE ALBAE או HERNIA UMBILICALIS יותר גדולות או בקע בצלקת של קיר הבטן עם הפרעות בלתי ניכרות

21. גידולים

גידולים ממאירים ושפירים אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות באברים ובמערכות-הגוף השונים.

פרק שני: המערכת האורו-גניטלית

22. כליות

0%	(1) צניחת הכליות (PTOSIS או כליה נודדת (REN MIGRANS)) (א) ללא הפרעות (ב) ישנן הפרעות - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות
0%	(2) כליה בצורת פרסה (HORSE SHOE KIDNEY) (א) ללא סיבוכים (ב) ישנם סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות
***10%	(3) כריתה חלקית של כליה אחת (א) ללא הפרעות בפעולות החלק הנותר של הכליה והכליה השניה (ב) קיימים סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות
***30%	(4) כריתה כליה אחת, ללא הפרעות בפעולת הכליה השניה (א) כריתה כליה אחת, כשישנן הפרעות קלות בפעולת הכליה השניה (ב) כריתה כליה אחת, כשישנן הפרעות בפעולת הכליה השניה הגורמות להפרעות קשות בפעולות הדם והלב
***30%	(5) כליה שאינה פועלת (NON FUNCTIONING KIDNEY) (א) אין יתר לחץ דם, אין הפרעות בכליה השניה (ב) ישנם סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסיבוכים.
**0%	(6) הפרשת חלבון בשתן בצורה כרונית (א) ORTHOSTATIC ALBUMINURIA (ב) מסיבה בלתי ידועה, ללא בצקת, בלי עליות לחץ הדם וללא הפרעה בתפקודי הכליות
***10%	(7) דלקת כליות כרונית (א) הפרשת חלבון קבועה בשתן, עם גלילים במשקע, בלי בצקת, בלי עליה של לחץ הדם, ללא UREMIA (ב) כמתואר בסעיף קטן (א) עם בצקת, עם עליה קלה של לחץ הדם וללא UREMIA
50%	(ג) תסמונת נפרוטית או עליה בינונית בלחץ הדם, פגיעה בתפקודי הכליה, אוראה (UREA) בדם עד 50 מג"ר אחוז
80%	(ד) תסמונת נפרוטית בולטת עם עליה ניכרת של לחץ הדם, אוראה (UREA) בין 50 ל-80 מג"ר אחוז
100%	(ה) עם הפרעות קשות מצד הכליות ומחזור הדם, החולה איננו מסוגל לעבודה (8) PYELONEPHRITIS CHRONICA אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיף קטן (7).
***10%	(9) אבני הכליות (א) אבנים בכליה אחת, התקפים נדירים, ללא הפרעה בתפקודי הכליות או ללא פגיעה במצב הכללי (ב) אבנים בכליה אחת, התקפים תכופים עם זיהום, ללא פגיעה בתפקוד הכליה (ג) אבני יציקה בכליה אחת, עם זיהום כרוני, ללא הפרעה בכליה השניה (ד) אבני כליות דו-צדדיות, התקפים נדירים (ה) אבני כליות דו-צדדיות, התקפים תכופים עם או בלי זיהום או הפרעה הידרומכנית