Как обыгрывать аккорды «скользящими секстами»


Оглавление

1. Популярные гармонические последовательности

1.1. Быстрое решение для «трёх блатных аккордов»


Am






$Hm^{7\flat5}$





 E^7





Что здесь происходит

Сексты, из которых состоят именно Am, Dm и E, расположены не очень удобно. Но мы можем воспользоваться гармоническими заменами. Внимательно посмотрим на минорное трезвучие от ре (Dm) и полууменьшённый септаккорд от си (Hm^{7b5}) :



 ${
m Dm}$ целиком входит в состав ${
m Hm}^{7\flat5}$. Поэтому мы можем смело играть ${
m Hm}^{7\flat5}$ везде, где нам встречается ${
m Dm}$.

То же самое мы видим в случае мажорного трезвучия от ми (E) и малого мажорного септаккорда от ми (E^7):




Мы можем заменить Dm на $Hm^{7\flat5}$, а E на E^7 . После этого некоторые сексты из состава новых аккордов оказываются совсем рядом.

2. Трезвучия популярных тональностей скользящими секстами

2.1. a-moll


Am






$Hm^{\flat 5}$





\mathbf{C}






2.1. A-MOLL 6


Dm






E





Em






F

7 Глава 2. Трезвучия популярных тональностей скользящими секстами





G



