Tenofovir disoproxil Mylan 245 mg

75104595

75104595

Tenofovir disoproxil Mylan 245 mg

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Tenofovir disoproxil Mylan 245 mg

filmom obložene tablete

tenofovirdizoproksil

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
-

HR

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Tenofovir disoproxil Mylan i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tenofovir disoproxil Mylan
3. Kako uzimati Tenofovir disoproxil Mylan
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Tenofovir disoproxil Mylan
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Ako je ovaj lijek propisan Vašem djetetu, molimo obratite pozornost da se sve informacije u ovoj Uputi odnose na Vaše dijete (u tom slučaju molimo umjesto „Vi" čitajte „Vaše dijete").

1. Što je Tenofovir disoproxil Mylan i za što se koristi

Tenofovir disoproxil Mylan sadrži djelatnu tvar *tenofovirdizoproksil*. Ta djelatna tvar je *antiretrovirusni* ili antivirusni lijek koji se primjenjuje za liječenje HIV ili HBV infekcije ili oboje. Tenofovir je *nukleotidni inhibitor reverzne transkriptaze*, općenito poznat kao NRTI i djeluje tako što ometa normalan rad enzima (kod HIV-a *reverzne transkriptaze*, a kod HBV-a *DNA polimeraze*) koji su tim virusima neophodni za umnožavanje. Kod HIV-a, Tenofovir disoproxil Mylan se uvijek treba primjenjivati u kombinaciji s drugim lijekovima za liječenje HIV infekcije.

Tenofovir disoproxil Mylan 245 mg tablete su lijek za liječenje infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV). Tablete su pogodne u:
- **odraslih**
- **adolescenata u dobi od 12 do manje od 18 godina koji su već bili liječeni** drugim lijekovima protiv HIV-a koji više nisu potpuno djelotvorni zbog razvoja rezistencije ili su prouzročili nuspojave.

Tenofovir disoproxil Mylan 245 mg tablete također se primjenjuju za liječenje kroničnog hepatitisa B, infekcije virusom hepatitisa B (HBV). Tablete su pogodne u:
- **odraslih**
- **adolescenata u dobi od 12 do manje od 18 godina.**

Da biste se liječili lijekom Tenofovir disoproxil Mylan zbog infekcije HBV-om, ne morate biti zaraženi HIV-om.

Ovaj lijek neće izliječiti infekciju virusom HIV-a. I tijekom uzimanja lijeka Tenofovir disoproxil Mylan može doći do razvoja infekcija i drugih bolesti povezanih s infekcijom virusom HIV-a. Isto tako možete HBV prenijeti na druge, pa je zbog toga važno poduzeti mjere opreza kako biste izbjegli inficiranje drugih osoba.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tenofovir disoproxil Mylan

Nemojte uzimati Tenofovir disoproxil Mylan
- **ako ste alergični** na tenofovir, tenofovirdizoproksil ili neki drugi sastojak ovog lijeka naveden u dijelu 6.

Ako se ovo odnosi na Vas, odmah o tome obavijestite liječnika i nemojte uzimati Tenofovir disoproxil Mylan.

Upozorenja i mjere opreza

Tenofovir disoproxil Mylan ne smanjuje rizik od prijenosa HBV-a na druge osobe spolnim putem ili putem krvi. Da biste to izbjegli, morate i dalje poduzimati mjere opreza.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek Tenofovir disoproxil Mylan.

- **Ako ste imali bolest bubrega ili ako su testovi ukazivali na probleme s bubrezima.** Tenofovir disoproxil Mylan se ne smije davati adolescentima s bubrežnim tegobama. Prije početka liječenja, liječnik će Vam možda zatražiti krvne pretrage da bi ocijenio rad bubrega. Tenofovir disoproxil Mylan može utjecati na Vaše bubrege za vrijeme liječenja. Liječnik može zatražiti krvne pretrage i tijekom liječenja u cilju praćenja rada Vaših bubrega. Ako ste odrasla osoba, liječnik Vam može savjetovati da rijeđe uzimate tablete. Nemojte snižavati propisanu dozu, osim ako Vam je tako rekao liječnik.

Tenofovir disoproxil Mylan se obično ne uzima s drugim lijekovima koji Vam mogu oštetiti bubrege (pogledajte *Drugi lijekovi i Tenofovir disoproxil Mylan*). Ako se to ne može izbjeći, liječnik će jednom tjedno pratiti funkciju Vaših bubrega.

- **Ako bolujete od osteoporoze,** imate prijelom kostiju u anamnezi ili imate probleme s kostima.

Poteškoće s kostima (koje se očituju kao ustrajni ili pogoršavajući bolovi u kostima i katkada završe prijelomima) mogu se također javiti zbog oštećenja stanica bubrežnih tubula (pogledajte dio 4, *Moguće nuspojave*). Obavijestite svog liječnika ako imate bolove u kostima ili prijelome kostiju.

Tenofovirdizoproksil ujedno može uzrokovati gubitak koštane mase. Najizraženiji gubitak koštane mase zabilježen je u kliničkim ispitivanjima kada su bolesnici bili liječeni tenofovirdizoproksilom u kombinaciji s pojačanim inhibitorom proteaze.

Ukupno gledano, u odraslih i pedijatrijskih bolesnika su učinci tenofovirdizoproksila na dugoročno zdravlje kostiju i budući rizik od prijeloma neizvjesni.

U nekih odraslih bolesnika s HIV-om koji uzimaju kombiniranu antiretrovirusnu terapiju može se razviti koštana bolest koja se naziva osteonekroza (odumiranje koštanog tkiva zbog gubitka dotoka krvi u kost). Neki od mnogih čimbenika rizika za razvoj te bolesti mogu biti, između ostalih, trajanje kombinirane antiretrovirusne terapije, primjena kortikosteroida, konzumiranje alkohola, teška imunosupresija, viši indeks tjelesne mase. Znakovi osteonekroze jesu ukočenost zglobova, bolovi (osobito u kuku, koljenu i ramenu) te otežano gibanje. Ako opazite bilo koji od tih simptoma, obavijestite liječnika.

- **Ako ste imali bolest jetre, uključujući hepatitis, razgovarajte s liječnikom.** Bolesnici s bolešću jetre, uključujući kronični hepatitis B ili C, koji se liječe antiretrovirusnim lijekovima, izloženi su većem riziku od teških i potencijalno fatalnih jetrenih komplikacija. Ako ste zaraženi hepatitisom B, Vaš će liječnik pažljivo razmisliti o najboljem liječenja za Vas. Ako ste imali bolest jetre ili kroničnu infekciju hepatitisom B, liječnik će možda napraviti krvne pretrage da bi mogao pratiti funkciju jetre.
- **Obratite pozornost na infekcije.** Ako imate uznapredovali oblik HIV infekcije (AIDS) i imate neku infekciju, u Vas se mogu nakon započinjanja liječenja lijekom Tenofovir disoproxil Mylan razviti simptomi infekcije i upale ili pogoršanje simptoma postojeće infekcije. Ti simptomi mogu ukazivati na to da se poboljšani imunološki sustav Vašega tijela bori protiv infekcije. Obratite pozornost na znakove upale ili infekcije ubrzo nakon što započnete uzimati Tenofovir disoproxil Mylan. Ako opazite znakove upale ili infekcije, **odmah o tome obavijestite liječnika.**

Pored oportunističkih infekcija, autoimuni poremećaji (stanje koje se javlja kada imunološki sustav napada zdravo tkivo Vašeg organizma) može se također dogoditi nakon početka uzimanja lijekova za liječenje infekcije HIV-om. Autoimuni poremećaji mogu se pojaviti puno mjeseci kasnije nakon početka liječenja. Ako uočite bilo koje simptome infekcije ili druge simptome poput slabosti mišića, slabosti koja počinje u šakama i stopalima i pomiče se gore prema trupu tijela, palpitacije, tremora ili hiperaktivnosti, obavijestite svog liječnika odmah kako biste potražili liječničku pomoć.

- **Ako ste stariji od 65 godina, razgovarajte s liječnikom ili ljekarnikom.** Tenofovirdizoproksil nije ispitan u bolesnika starijih od 65 godina. Imate li više od 65 godina, a propisali su Vam Tenofovir disoproxil Mylan, liječnik će Vas pažljivo nadzirati.

Djeca i adolescenti

Tenofovir disoproxil Mylan 245 mg tablete **pogodne su** za:
- **adolescente zaražene virusom HIV-1 koji su u dobi od 12 do manje od 18 godina i imaju tjelesnu težinu od najmanje 35 kg i već su bili liječeni** drugim lijekovima protiv HIV-a koji više nisu potpuno djelotvorni zbog razvoja rezistencije ili su prouzročili nuspojave
- **adolescente zaražene virusom HBV-a koji su u dobi od 12 do manje od 18 godina i imaju tjelesnu težinu od najmanje 35 kg.**

Tenofovir disoproxil Mylan 245 mg tablete **nisu** pogodne za sljedeće skupine:
- **nisu za djecu zaraženu virusom HIV-1** mlađu od 12 godina
- **nisu za djecu zaraženu virusom HBV-a** mlađu od 12 godina.

Za doziranje pogledajte dio 3, *Kako uzimati Tenofovir disoproxil Mylan.*

Drugi lijekovi i Tenofovir disoproxil Mylan
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ako ste istovremeno zaraženi HIV-om i HBV-om, **nemojte prestati uzimati lijekove protiv HIV-a** koje vam je propisao vaš liječnik kad započnete terapiju lijekom Tenofovir disoproxil Mylan.
- **Nemojte uzimati Tenofovir disoproxil Mylan** ako već uzimate druge lijekove koji sadrže tenofovirdizoproksil ili tenofoviralafenamid. Nemojte istovremeno uzimati Tenofovir disoproxil Mylan i lijekove koji sadrže adefovirdipivoksil (lijek koji se koristi za liječenje kroničnog hepatitisa B).
- **Vrlo je važno da liječnika obavijestite ako uzimate druge lijekove koji Vam mogu oštetiti bubrege.**

Ti lijekovi uključuju:
- aminoglikozide, pentamidin ili vankomicin (za bakterijsku infekciju),
- amfotericin B (za gljivičnu infekciju),
- foskarnet, ganciklovir ili cidofovir (za virusnu infekciju),
- interleukin-2 (za liječenje raka),
- adefovirdipivoksil (za HBV),
- takrolimus (za supresiju imunološkog sustava),
- nesteroidne antiinflamatorne (protuupalne) lijekove (NSAIL, za ublažavanje boli u kostima ili mišićima).

- **Drugi lijekovi koji sadrže didanozin (za infekciju virusom HIV-a):** Uzimanjem lijeka Tenofovir disoproxil Mylan s drugim antivirusnim lijekovima koji sadrže didanozin može Vam se povećati razina didanozina u krvi i smanjiti broj CD4 stanica. U rijetkim su slučajevima zabilježene upala gušterače i laktacidoza (prekomjerna količina mliječne kiseline u krvi), koje katkada mogu uzrokovati smrt, kada su se zajedno uzimali lijekovi koji sadrže tenofovirdizoproksil i didanozin. Vaš će liječnik pažljivo razmotriti hoće li Vas liječiti kombinacijama tenofovira i didanozina.
- **Također je važno obavijestiti liječnika** ako uzimate ledipasvir/sofosbuvir, sofosbuvir/velpatasvir ili sofosbuvir/velpatasvir/voksilaprevir radi liječenja infekcije hepatitisom C.

Tenofovir disoproxil Mylan s hranom i pićem
Tenofovir disoproxil Mylan uzimajte s hranom (na primjer uz obrok ili užinu).

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

- **Pokušajte spriječiti trudnoću** tijekom liječenja lijekom Tenofovir disoproxil Mylan. Morate primjenjivati učinkovitu kontracepcijsku metodu kako biste spriječili trudnoću.
- **Ako ste Tenofovir disoproxil Mylan uzimali** tijekom trudnoće, postoji mogućnost da liječnik zatraži redovito provođenje pretraga krvi i drugih dijagnostičkih pretraga kako bi pratio razvoj vašega djeteta. U djece čije su majke tijekom trudnoće uzimale NRTI-jeve prevagnula je korist od zaštite protiv HIV-a u odnosu na rizike od nuspojava.
- Ako ste majka koja je zaražena HBV i Vaša beba je primila terapiju za sprječavanje prijenosa hepatitisa B pri rođenju, možda možete dojiti svoje dojenče, ali prvo se obratite svom liječniku kako biste dobili više informacija.
- Dojenje se **ne preporučuje** u žena koje žive s HIV-om jer se infekcija HIV-om može prenijeti na dijete kroz majčino mlijeko. Ako dojite ili razmišljate o dojenju, **morate o tome razgovarati** sa svojim liječnikom **što je prije moguće**.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tenofovirdizoproksil može uzrokovati omaglicu. Ako tijekom uzimanja lijeka Tenofovir disoproxil Mylan imate omaglicu, **nemojte upravljati vozilom, voziti se na biciklu** niti raditi s alatima ili na strojevima.

Mylan				Date of Final	-- | mm | --	Date of Issue	-- | mm | --	Page Count	1 of 2
Date/Time of Creation	03/07/24 14:00	TrackWise / GLAMS ID	3529256	Client Market	Croatia	Software / Ver. No.	Adobe InDesign 2024		
Vendor Job No.	NA	Affiliate New Code	3529256	Product Description	LIT(BOT)TENO DISO MYL TABLET 245MG HR V7				
Artwork Proof No.	1	Aff. Superseded Code	3185776						
Pharma Code	NA	Barcode Information	NA	New Material Code	75104595	Actual A/w Size	Flat - 360 X 420 mm		
Product Render ID No.	NA	MA Number	EU/1/16/1129/001	ITF Barcode		Other Sizes (if any)	Folded - 36 X 60 mm		
Main Font Type - 1	Helvetica Neue LT Pro	SAP or SPC Code	400535542	Superseded Code	75098182	Pitch After Every	NA		
Main Font Type - 2	NA	Packaging Site	Mylan Laboratories Ltd. II FDB Pithampur, Dhar Dist., M.P. - IN	Component Type	Printed Literature	Eye / Sensor Mark	NA		
Min. Font Size	10 pt	Mfg. Lic. No. / Code No.	NA	No. of Printed Colors	1	ITF Barcode Size	NA		
Reason for Revision / Issuance	Safety NA NA			Printed Colors CMYK / PMS Coated / PMS Color Bridge Coated	BLACK 100%				
				Non Printed Colors	KEYLINE				
Artwork Implementation Schedule, (✓) whichever is applicable	New Component Immediately (Stock of supperseded component to be destroyed, if applicable) After Consumption of Existing (supperseded) stock Others (specify)			Equivalent with CMYK (Pantones Ref. Code)	NA				
				Material of Construction	40gsm ITC Triveni Paper				
				Design & Style	Supply in folded form as proposed size with tape				

LABEL CONTROL / BUSINESS DEVELOPMENT / REGULATORY / MARKETING				Prepared By	Checked By	Approved By		
				Packaging Technical Services		Regulatory Affairs	Production	Quality Assurance
Sign Offs	Digital Signature	Digital Signature	Digital Signature	Digital Signature	Sign Date OR Digital Signature	Sign Date OR Digital Signature	Sign Date OR Digital Signature	Sign Date OR Digital Signature	Sign Date OR Digital Signature
Revision History	24.06.2024 - Artwork Revised Date Remarks Date Remarks			Date Remarks Date Remarks Date Remarks		Date Remarks Date Remarks Date Remarks		

Reference SOP-000459814 FORM-000644250 Version 3.0

#Note: This artwork is electronically signed through TrackWise/GLAMS, hence wet ink/digital signatures are not done/required.

Tenofovir disoproxil Mylan sadrži laktozu
Obavijestite liječnika prije nego što počnete uzimati Tenofovir disoproxil Mylan. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Tenofovir disoproxil Mylan

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza:
- **Odrasli:** 1 tableta svaki dan s hranom (na primjer, s obrokom ili užinom).
- **Adolescenti u dobi od 12 do manje od 18 godina tjelesne težine od najmanje 35 kg:** 1 tableta svaki dan s hranom (na primjer s obrokom ili užinom).

Ako imate posebnih poteškoća pri gutanju, tabletu možete smrviti vrhom žlice. Prašak onda pomiješajte s oko 100 ml (pola čaše) vode, soka od naranče ili soka od grožđa pa odmah popijte.

- **Uvijek uzimajte onu dozu koju Vam je preporučio liječnik.** To je iz razloga da budete sigurni da je lijek koji uzimate potpuno djelotvoran te da smanjite rizik od razvoja otpornosti na liječenje. Nemojte mijenjati dozu, osim ako Vam liječnik ne kaže da to učinite.
- **Ako ste odrasla osoba i imate problema s bubrezima,** možda će Vas liječnik uputiti da rjeđe uzimate Tenofovir disoproxil Mylan.
- Ako ste inficirani HBV-om, vaš liječnik Vas može uputiti na testiranje infekcije HIV-om, kako bi se utvrdilo jeste li istovremeno inficirani s oba virusa. Pročitajte upute o drugim antiretrovirusnim lijekovima, koje su namijenjene bolesniku i koje daju smjernice o načinu uzimanja tih lijekova.
- Drugi oblici ovoga lijeka mogu biti prikladniji za bolesnike koji imaju poteškoća pri gutanju; pitajte liječnika ili ljekarnika.

Ako uzmete više lijeka Tenofovir disoproxil Mylan nego što ste trebali
Ako slučajno uzmete previše Tenofovir disoproxil Mylan tableta, možete imati povećani rizik od mogućih nuspojava ovog lijeka (pogledajte dio 4 *Moguće nuspojave*). Obratite se svome liječniku ili najbližoj hitnoj medicinskoj službi za savjet. Sa sobom ponesite bočicu s tabletama kako bi lakše opisali što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Tenofovir disoproxil Mylan
Važno je da ne propustite uzeti dozu lijeka Tenofovir disoproxil Mylan. Ako propustite dozu, izračunajte koliko je proteklo od vremena kad ste ju trebali uzeti.

- **Ako je proteklo manje od 12 sati** od vremena kada ju obično uzimate, uzmite dozu čim možete, a potom sljedeću dozu uzmite u redovito vrijeme.
- **Ako je proteklo više od 12 sati** od vremena kada ste ju trebali uzeti, zaboravite na dozu koju ste propustili. Pričekajte pa sljedeću dozu uzmite u redovito vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako ste povraćali u razmaku manjem od 1 sata nakon što ste uzeli Tenofovir disoproxil Mylan, uzmite drugu tabletu. Drugu tabletu ne trebate uzimati ako ste povraćali nakon što je prošlo više od 1 sata po uzimanju lijeka Tenofovir disoproxil Mylan.

Ako prestanete uzimati Tenofovir disoproxil Mylan
Nemojte prestati uzimati Tenofovir disoproxil Mylan bez liječničke preporuke. Prestanak liječenja lijekom Tenofovir disoproxil Mylan može smanjiti učinkovitost terapije koju Vam je preporučio liječnik.

Ako imate hepatitis B ili HIV infekciju i hepatitis B zajedno (istovremena infekcija), vrlo je važno da se ne prestanete liječiti lijekom Tenofovir disoproxil Mylan, a da prije toga niste razgovarali s liječnikom. Neki su bolesnici imali krvne pretrage ili simptome koji su ukazivali na to da im se hepatitis pogoršao nakon prestanka liječenja tenofovirdizoproksilom. Možda ćete morati nekoliko mjeseci nakon prestanka liječenja raditi krvne pretrage. U nekih se bolesnika s uznapredovalom bolešću jetre ili cirozom jetre ne preporučuje prekid liječenja, jer to može dovesti do pogoršanja hepatitisa.

- Razgovarajte s liječnikom prije nego što iz bilo kojeg razloga prestanete uzimati Tenofovir disoproxil Mylan, osobito ako osjetite neke nuspojave ili dobijete neku drugu bolest.
- Liječnika odmah obavijestite o novim ili neobičnim simptomima nakon što se prestanete liječiti, osobito o simptomima koje dovodite u vezu s infekcijom hepatitisom B.
- Obratite se liječniku prije nego što ponovno počnete uzimati tablete Tenofovir disoproxil Mylan.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Tijekom terapije HIV-a moguće je povećanje tjelesne težine i povišenje razina lipida i glukoze u krvi. To je djelomično povezano s poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju lipida u krvi katkad povezano i s lijekovima za liječenje HIV-a. Vaš liječnik će obaviti provjeru tih promjena.

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Moguće ozbiljne nuspojave: odmah obavijestite svog liječnika
- **Laktacidoza** (prekomjerna razina mliječne kiseline u krvi) je **rijetka** (može se javiti u do 1 na svakih 1000 bolesnika), ali ozbiljna nuspojava koja može imati smrtni ishod. Sljedeće nuspojave mogu biti znakovi laktacidoze:
- duboko, brzo disanje
- omamljenost
- mučnina, povraćanje i bol u trbuhu.

Ukoliko sumnjate da možda imate **laktacidozu, odmah se obratite liječniku.**

Ostale moguće ozbiljne nuspojave

Sljedeće nuspojave su **manje česte** (mogu se javiti u do 1 na svakih 100 bolesnika):
- **bol u trbuhu** (abdomenu) uzrokovana upalom gušterače
- oštećenje stanica bubrežnih tubula

Sljedeće nuspojave su **rijetke** (mogu se javiti u do 1 na svakih 1000 bolesnika):
- upala bubrega, **prekomjerno mokrenje i žeđ**
- **promjene svojstava mokraće i bol u leđima** uzrokovana tegobama s bubrezima, uključujući zatajenje bubrega
- omekšanje kostiju (uz **bol u kostima** i ponekad posljedičnim prijelomom kostiju) do čega može doći zbog oštećenja stanica bubrežnih tubula.
- **masna jetra**

Ako mislite da imate bilo koju od ovih ozbiljnih nuspojava, obavijestite svog liječnika.

Najčešće nuspojave

Sljedeće nuspojave su **vrlo česte** (mogu se javiti u najmanje 10 na svakih 100 bolesnika):
- proljev, povraćanje, mučnina, omaglica, osip, slabost

Pretrage mogu također pokazati:
- smanjenje fosfata u krvi

Ostale moguće nuspojave

Sljedeće nuspojave su **česte** (mogu se javiti u do 10 na svakih 100 bolesnika):
- glavobolja, bol u trbuhu, umor, nadutost, vjetrovi, gubitak koštane mase

Pretrage mogu također pokazati:
- tegobe s jetrom

Sljedeće nuspojave su **manje česte** (mogu se javiti u do 1 na svakih 100 bolesnika):
- oštećenje mišića, bol ili slabost u mišićima

Pretrage mogu također pokazati:
- smanjenu razinu kalija u krvi
- povišenu razinu kreatinina u krvi
- tegobe s gušteračom

Oštećenje mišića, omekšanje kostiju (uz bol u kostima i ponekad posljedičnim prijelomom kostiju), bol u mišićima, slabost mišića i smanjenje razine kalija ili fosfata u krvi mogu nastati zbog oštećenja stanica bubrežnih kanalića.

Sljedeće nuspojave su **rijetke** (mogu se javiti u do 1 na svakih 1000 bolesnika)
- bol u trbuhu (abdomenu) uzrokovana upalom jetre
- oticanje lica, usana, jezika ili grla

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Tenofovir disoproxil Mylan

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na boci i kutiji iza oznake „EXP". Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.
Za boce: nakon prvog otvaranja iskoristiti u roku od 90 dana.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Tenofovir disoproxil Mylan sadrži
- Djelatna tvar je tenofovirdizoproksil. Jedna tableta lijeka Tenofovir disoproxil Mylan sadrži 245 mg tenofovirdizoproksila (u obliku tenofovirdizoproksilmaleata).
- Drugi sastojci su mikrokristalična celuloza, laktoza hidrat (pogledajte dio 2, *Tenofovir disoproxil Mylan sadrži laktozu*), hidroksipropilceluloza, koloidni bezvodni silicijev dioksid, magnezijev stearat, hipromeloza, titanijev dioksid (E171), triacetin, boja *indigo karmin aluminium lake* (E132).

Kako Tenofovir disoproxil Mylan izgleda i sadržaj pakiranja

Tenofovir disoproxil Mylan 245 mg filmom obložene tablete su svijetloplave, okrugle, bikonveksne s utisnutom oznakom „TN245" na jednoj strani i „M" na drugoj strani.
Ovaj je lijek dostupan u plastičnim bocama sa sigurnosnim zatvaračem za djecu i zaštitnom folijom koje sadrže 30 filmom obloženih tableta i u višestrukim pakiranjima s 90 filmom obloženih tableta u 3 boce od kojih svaka sadrži po 30 filmom obloženih tableta. U bocama se nalazi i sredstvo za sušenje. Sredstvo za sušenje se ne smije progutati.

Tablete su dostupne i u blisterima koji sadrže 10 tableta, 30 tableta ili 30 x 1 (jedinična doza) tabletu.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Mylan Pharmaceuticals Limited
Damastown Industrial Park,
Mulhuddart, Dublin 15,
DUBLIN
Irska

Proizvođač
Mylan Hungary Kft
Mylan utca 1,
Komarom, H-2900,
Mađarska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Hrvatska
Viatris Hrvatska d.o.o.
Tel: + 385 1 23 50 599

Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju 2024.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Mylan
3529256
75104595

Mylan				Date of Final	Dd / mm / Yy	Date of Issue	Dd / mm / Yy — Page Count 2 of 2
Date/Time of Creation	03/07/24 14:00	TrackWise / GLAMS ID	3529256	Client Market	Croatia	Software / Ver. No.	Adobe InDesign 2024
Vendor Job No.	NA	Affiliate New Code	3529256	Product Description	LIT(BOT)TENO DISO MYL TABLET 245MG HR V7		
Artwork Proof No.	1	Aff. Superseded Code	3185776				
Pharma Code	NA	Barcode Information	NA	New Material Code	75104595	Actual A/w Size	Flat - 360 x 420 mm
Product Render ID No.	NA	MA Number	EU/1/16/1129/001	ITF Barcode		Other Sizes (if any)	Folded - 36 x 60 mm
Main Font Type - 1	Helvetica Neue LT Pro	SAP or SPC Code	400535542	Superseded Code	75098182	Pitch After Every	NA
Main Font Type - 2	NA	Packaging Site	Mylan Laboratories Ltd. (F-3) Pithampur, Dhar Dist., M.P. - IN	Component Type	Printed Literature	Eye / Sensor Mark	NA
Min. Font Size	10 pt	Mfg. Lic. No. / Code No.	NA	No. of Printed Colors	1	ITF Barcode Size	NA
Reason for Revision / Issuance	Safety			Printed Colors CMYK / PMS Coated / PMS Color Bridge Coated	BLACK 100%		
	NA			Non Printed Colors	KEYLINE		
	NA			Equivalent with CMYK (Pantones Ref. Code)	NA		
Artwork Implementation Schedule, (✓) whichever is applicable	New Component						
	Immediately (Stock of superseded component to be destroyed, if applicable)						
	After Consumption of Existing (superseded) stock			Material of Construction	40gsm ITC Triben Paper		
	Others (specify)			Design & Style	Supply in folded form as proposed size with tape		

LABEL CONTROL / BUSINESS DEVELOPMENT / REGULATORY / MARKETING				Prepared By	Checked By	Approved By		
Sign Offs	Digital Signature	Digital Signature	Digital Signature	Digital Signature	Packaging Technical Services		Regulatory Affairs	Production	Quality Assurance
				Sign / Date / Digital Signature	Sign / Date / Digital Signature	Sign / Date / Digital Signature	Sign / Date / Digital Signature	Sign / Date / Digital Signature
Revision History	24.06.2024 - Artwork Revised Date - Remarks Date - Remarks		Date - Remarks Date - Remarks Date - Remarks			Date - Remarks Date - Remarks Date - Remarks		

Reference SOP-000459814 FORM-000644250 Version 3.0

#Note: This artwork is electronically signed through TrackWise/GLAMS, hence wet ink/digital signatures are not done/required.