「はじめての数論」の回答例

yassu

平成 29 年 2 月 15 日

6 第6章の回答例

6.1 (a) Step 1) gcd(6,15) = 3 であるから, 6x + 15y は 3 の倍数全体を動く. よって, 6x + 15y = 3t とおき, まず

$$3t + 20z = 1 \tag{*}$$

の解 (t,z) を探す. ユークリッドの互除法より

$$20 = 3 \times 6 + 2 \tag{1}$$

$$3 = 2 \times 1 + 1 \tag{2}$$

$$2 = 1 \times 2. \tag{3}$$

a = 3, b = 20 とおくと (1) より

$$b = 6a + 2$$
.

$$2 = b - 6a.$$

(2) より

$$a = b - 6a + 1$$

$$6a - b = 1$$
.

よって, (t,z) = (7,-1) が (*) の解の一つである.

Step 2) 次に $6x + 15y = 3 \cdot 7 = 21$ すなわち

$$2x + 5y = 7$$

は (x,y) = (1,1) を解の一つとして持つ.

以上によって, (x, y, z) = (1, 1, -1) が解の一つである.

(b) ユークリッドの互除法より

$$94321 = 9876 \times 5 + 4941 \tag{1}$$

$$9876 = 4941 \times 1 + 4935 \tag{2}$$

$$4941 = 4935 \times 1 + 6 \tag{3}$$

$$4935 = 6 \times 822 + 3 \tag{4}$$

$$6 = 3 \times 2 \tag{5}$$

であるから, gcd(94321, 9876) = 3 である.

また、(1) より a = 54321, b = 9876 とおくと

$$4941 = a - 5b$$
.

(2) より

$$b = a - 5b + 4935$$
$$4935 = 6b - a.$$

(3) より

$$a - 5b = 6b - a + 6$$

 $2a - 11b = 6$.

(4) より

$$6b - a = (2a - 11b) \times 822 + 3$$
$$(6 + 11 \times 822)b - (1 + 2 \times 822)a = 3$$
$$9048b - 1645a = 3.$$

以上によって (a,b) = (-1645,9048) は 1 つの解である.

(5) より

$$-8a + 7b = (15a - 13b) \times 3 + 1$$
$$-53a + 46b = 1.$$

よって, (x,y)=(-53,46) は一つの方程式の解である. また, $g=\gcd(105,121)=1$ であるから, 一般会は

$$x = -53 + 121k, y = 46 - 105k \quad (k \in \mathbf{Z})$$

である.