

●甜菜（直播）防除体系例

			R8体系		
時期		対象病害虫	薬剤名	使用倍率 使用薬量	使用時期 収穫前日数
5月	播種直後	除草	(0) デュアールゴールド	100mL	90日前
	本葉2葉展開後	除草	(1) ベタハーブFL+レナテン	400mL+100mL	60日前
	1回目散布後7~10日後	除草	(2) ベタハーブFL+レナテン	500mL+100mL	60日前
	1回目散布後10~14日後	除草	(3) ベタハーブFL+レナパック水 和剤+レナテン	500mL+100g+100mL	60日前
6月	10~15日	褐斑病	臨機防除（連作畑：フロンサイドSC）	2,000倍	30日前
		根腐病	ミリオネアFL	4,000倍	7日前
		ヨトウムシ	マッチ乳剤	3,000倍	14日前
	25~30日	褐斑病	フセキフロアブル	3,000倍	7日前
		ヨトウムシ・アブラムシ類	モスピランSL液剤	4,000倍	3日前
7月	上	除草	(セレクト乳剤)	75mL	30日前
	9~14日	根腐病	リンバー顆粒水和剤	4,000倍	7日前
		褐斑病	ムケツDX	800倍	21日前
		ヨトウムシ シロオビノメイガ	プレバソンフロアブル5	5,000倍	前日
	23~28日	褐斑病	グリーンペンコゼブ	400倍	21日前
		ヨトウムシ シロオビノメイガ	マッチ乳剤またはカウンター乳剤	3,000倍	14日前(マッチ乳剤) 7日前(カウンター乳剤)
			パダンSG水溶剤	1,500倍	7日前
8月	2~7日	褐斑病	グリーンペンコゼブ	400倍	21日前
		葉腐病	モンカットFL40	1,000倍	14日前
		ヨトウムシ シロオビノメイガ	プロフレア	4,000倍	7日前
	12~17日	褐斑病・葉腐病	グリーンペンコゼブ	400倍	21日前
		ヨトウムシ シロオビノメイガ	ディアナSC	5,000倍	前日
	26~31日	褐斑病	グリーンペンコゼブ	400倍	21日前
		ヨトウムシ シロオビノメイガ	プロフレア	4,000倍	7日前
9月	9~14日	褐斑病	ドイツボルドーDF	1,000倍	-
		ヨトウムシ シロオビノメイガ	ファルコンFL	6,000倍	7日前

※シロイチモジヨトウ対策としてはディアナSCまたはプロフレアSCを散布する。

● R 8年度 大豆防除体系例

時期		生育 過程	対象 病虫害	薬剤名	使用倍率 使用薬量	使用時期 収穫前日数
5月	上		種子消毒	クルーザーMAXX	8mL/種子1kg	播種前
	中		除草	トップメリットFL	300ml	播種後出芽前
		ラクサー乳剤		500mL	播種後出芽前	
		フルミオWDG		7.5g	播種後出芽前	
	デュアルゴールド	100mL	播種後出芽前			
	下	出芽				
6月	上					
	中		除草	パワーガイザー液剤	300mL	出芽直前～出芽揃
			アブラムシ	(ゲットアウトWDG)	3,000倍	7日前
	下		除草	ナブ乳剤または	200mL	イネ科6～8葉期
				セレクト乳剤	75mL	イネ科6～8葉期
7月	上	開花期	茎疫病	ザンプロDMFLまたは フェスティバルC水和剤	1500倍 600倍	7日前 7日前
	中		マメシンクイガ	プレバソンFL	4,000倍	7日前
8月	上	着莢期	菌核病・灰色かび病	ミリオネアFL	4,000倍	前日
			マメシンクイガ・カメムシ	ゲットアウトWDG	3,000倍	7日前
	中		菌核病	シルバキュアFL	2,000倍	7日前
			マメシンクイガ・アブラムシ	バイスロイド乳剤	2,000倍	7日前
	下					
9月	上	着莢期	腐敗粒	アミスター20FL	2,000倍	7日前
	中	成熟期				
	下					

※登録内容の文言は一部省略しており、実際の登録とは異なるものがありますのでご注意ください。

●R8年度 春播き小麦防除体系例


時期		生育過程	対象 病虫害	薬剤名	系統	使用倍率 使用薬量	使用時期 収穫前日数
4月	上						
	中	播種		※初冬まき栽培は越冬後、雑草発生初期～発生始期に散布			
	下		除草	ガルシアFL キタシーブFL	その他/酸アミド ピリジンカルボキサミド イソキサゾリン	200mL 100ml	小麦1～3葉期 は種後～3葉期
5月	上	出芽					
	中～下	幼形期	除草	MCPソーダ塩	フェノキシ酸系	300g	45日前
				ハーモニーDF水和剤	SU	5g	小麦3～5葉期
				※スギナが多い場合はMCPソーダ塩を混用する			
				バサグラン液剤 エコパートFL	ダイアジン その他有機	150mL 75mL	小麦5葉期 小麦2～4葉期
6月	上	6葉期	徒長防止 赤さび病	(サイコセルPRO) ミリオネアFL	ジベレリン生合成阻害 SDHI	150ml 4,000倍	6葉期前後 7日前
		止葉期	うどんこ病	カッシーニFL	ベンゾイルピリジン	3,000倍	3日前
		止葉期	徒長防止	(カルタイムFL)	ジベレリン生合成阻害	0.8～1.6L	止葉期～出穂始期
	中	開花始	赤かび病	プロラインFL	DMI	2,000倍	7日前
			アブラムシ類	エルサン乳剤または ケットアウトWDG	有機燐 ピレスロイド	1,000倍 3,000～4,000倍	7日前 21日前
				ミラビスFL	SDHI	1,500倍	7日前
		開花期	赤かび病				
	下	臨機 防除	赤かび病他	シルバキュアFL (チルト乳剤)	DMI DMI	2,000倍 1,000～2,000倍	7日前 3日前
7月	上	成熟期					
	中	収穫後	除草	(プリグロックスL)	ビピリジリウム	100～150倍	は種前又はは種後出芽前
	下						

※登録内容の文言は一部省略しており、実際の登録とは異なるものがありますのでご注意ください。

プリグロックスLのイネ科雑草種子発芽後枯殺効果
イネ科雑草にお困りの方に

●プリグロックスLがイネ科雑草に対し、
土壌表面上の種子や植物体上の種子に
付着した場合、成熟した種子がこぼれ落ちて
も新たな発生源にならずに除草効果の安定に
つながります。

※プリグロックスLには土壌処理効果はありません。
有効成分は土壌に接触後、すみやかに吸着、不活性化。



希釈倍率100倍100L/10a散布で翌年のイネ科雑草の発生を抑制！
(麦稈や稲わらが散乱している圃場は150倍の150L/10a散布がおすすめ！)

●R8年度 秋播き小麦防除体系例

時期		生育過程	対象病害虫	薬剤名	系統	使用倍率 使用薬量	使用時期 収穫前日数
9月	中～下	播種	除草	ガルシアFL	その他/酸アミド	200mL	小麦出芽直前～3葉期
				またはキタシーブFL	その他/酸アミド	100mL	播種後～3葉期
				※砂質・火山灰土壌の場合はガルシアを選択			
10月	上	出芽					
	中		除草	(ガルシアFL)	その他/酸アミド	250ml	※大豆間作小麦3～6葉期
	中～下		除草	エコパートFL	その他有機	75mL	小麦2～6葉期
	下		雪腐病 (地上防除)	フロンサイドSC ランマンFL	他合成 Qil	1,000倍 1,000倍	根雪前地上散布可能な日 根雪前地上散布可能な日
11月	中～下		雪腐病 (航空機防除)	フロンサイドSKY ランマンFL	他合成 Qil	8倍 8倍	800ml/10a 根雪前 800ml/10a 根雪前
4月	上	起生期	除草	(トレファノサイド乳剤)	ジニトロアニリン	300mL	生育期
	中			※スズメノカタビラ多発生の場合			
	下						
5月	上	幼形期	眼紋病	ファンタジスタ顆粒水和剤	Q o i	2,000倍	7日前
			倒伏防止	(サイコセルPRO)		150mL	幼穂形成期
	上～中		除草	MCPソーダ塩	フェノキシ酸系	300g	45日前
				バサグラン液剤	ダイアジン	150mL	麦の幼穂形成期
				ハーモニーDF水和剤	SU	5g	麦の幼穂形成期
	中	出穂前	赤さび病	ミリオネアFL	SDHI	4,000倍	7日前
	～下	止葉期	倒伏防止	(カルタイムFL)	ジベレリン生合成阻害	0.8～1.6L	止葉期～出穂始期
6月	上	開花期	赤かび病	プロラインFL	DMI	2,000倍	7日前
			アブラムシ類	エルサン乳剤または ケットアウトWDG	有機燐 ピレスロイド	1,000倍 3,000～4,000倍	7日前 21日前
	中		赤かび病	ミラビスFL	SDHI	1,500倍	7日前
	下	乳熟期	赤かび病	シルバキュアFL	DMI	2,000倍	7日前
				(チルト乳剤)	DMI	1,000～2,000倍	3日前
7月	上～中	糊熟期					
	中						
	下	収穫後	除草	(プリグロックスL)	ビピリジリウム	100～150倍	は種前又はは種後出芽前

※登録内容の文言は一部省略しており、実際の登録とは異なるものがありますのでご注意ください。

★秋まき小麦眼紋病に罹っていませんか？

秋まき小麦が収穫前に倒伏しているのは、肥料が多すぎたせいなのか。小麦の株元を見て判断して下さい。



←左の写真は眼紋病により倒伏している圃場です。

倒れた方向の逆手前の株本を観察します。

眼紋病は、幼穂形成期（4月下旬～5月上旬）ゴールデンウィーク頃に防除することにより、病気を軽減することが出来ます。

【防除薬剤】

ファンタジスタ顆粒水和剤2000倍

または、カンタスドライフロアブル1500倍または、プロラインフロアブル2,000倍 水量100L/10a